



BIBLIOTECA NAZ.
Vicente Emanuel II

XXVIII

F

27

VIII

7

38

##



CATALOGVS
PLANTARVM
HORTI CAESAREI FLORENTINI.

1917
MAY 10
JULY 10



7

CL. PETRI ANTONII MICHELII
CATALOGVS PLANTARVM
HORTI CAESAREI FLORENTINI
OPVS POSTVMVM
IVSSV SOCIETATIS BOTANICAE
EDITVM, CONTINVTVM,
ET IPSIVS HORTI HISTORIA LOCVPLETATVM
AB IO. TARGONIO TOZZETTIO FLOR. MED. D.
REI HERBARIAE PROF. PVB.
BIBLIOTHECAE PVB. MAGLIABECHIANAE PRAEFECTO,
ET S. R. I. ACADEMIAE NATVRAE CVRIOSORVM
COLLEGA.



FLORENTIAE. A. M.D.CC.XLVIII.
EX TYPOGRAPHIA BERNARDI PAPERINII.

CVM ADPROBATIONE.



IMPERATORI CAESARI FRANCISCO

PIO, FELICI, AVGVSTO,
PRINCIPI OPTIMO INVICTISSIMOQVE,
PATRI PATRIAE,
ADSSERTORI VIGILANTISSIMO QVIETIS
ET SECVRITATIS PVBLICAE,
GERMANIAE, ET HIEROSOLYMORVM REGI,
LOTHARINGIAE, BARRII, ET MAGNO
ETRVRIAE DVCI
cc. cc. cc.

IO. TARGIONIVS TOZZETTIVS
NVMINI MAIESTATIQUE EIVS DEVOTISSIMVS
PERENNEM INCOLVMITATEM.



*IO multumque exoptaveram
devotissimae subiectionis meae testimonium aliquod,
& gratissimi simul animi; ac fidelissimi servitii
speci-*

specimen ad Pulvinar Tuum deferre, CAESAR AUGUSTISSIME; sed ingenii mei tenuitatis conscius, non ausus sum rudibus meis lucubrationculis Tua Tempora morari, & in publica commoda peccare. Voti tandem compotem factum me gratulor, quando a Societate Botanica iussus sum ad editionem parare, & CAESAREAE MAIESTATI TUAE humillima veneratione offerre Catalogum Plantarum quibus modo confitus est vetustissimus, elegantissimusque Tuus Hortus Florentinus. Non indignum siquidem MAIESTATE TUA munusculum istud Societati visum est, eo potissimum quod Tuis Auspiciis, Tuaque Munificentia in lucem prodeat; quod Horti Tui decora exponat; quod plures Plantarum novas species Eruditis exhibeat; quod tandem Celeberrimi Michellii praecepta opera comparatum sit, qui Botanicis studiis incredibili diuturnoque labore excultis ita inclaruit, ut nemini secundus, plurimis ingenii laude, & inventorum gloria longe praestet.

*Haec igitur fiduciam mihi inspirarunt, ut provolutus ad Sacros Pedes Tuos, POTENTISSIME IMPERATOR, auderem venerabundus offerre exilia
etiam*

etiam studiorum meorum specimina Micheliano Operi adfuta, quae si Clementissima, Solitaque Tua Aequanimitate excipere non dedignaberis, CAESAR AUGUSTISIME, quemadmodum humillima, qua par est, veneratione rogo, atque supplico, praecipuum laboris mei fructum consequutum me fuisse laetabor. Addidit illud etiam mihi audendi animum, quod innumeras inter sublimesque Animi Tui Dotes, summus ut in reliquis omnes Optimas Disciplinas, ita in iucundissimam quoque, & praestantissimam Rerum Naturalium Scientiam Amor excellat. Omnis profecto aetas, quae quidem Litteras amabit, meritis laudum praeconiis efferet Comitatem illam Tuam Incomparabilem, qua summos quoslibet in Physicis studiis Viros excepisti, Diligentiam qua Philosophicis confectibus interesse voluisti, Jucunditatem qua Hortos Medicos, Musaea, & Bibliothecas visitasti in memorando illo Itinere per florentissimas Europae Provincias peracto, ut quaecumque ad Optimum Principem formandum prodesse possent observares. Profecto non sine voluptate mecum recolo quae Vir summus, & Fautor meus Hermannus Boërhaavius
ad

ad me perscripsit in Epistola d. ad d. 3. Kal. Aprilis A. 1738. qua mecum gratulatus est Etruriae sortem, cui Rex & Pater Drvino Munere paulo pridem obtigeras; postquam enim Laudes Tuas iussissimo praeconio extulit: florebut, ait, apud vos Rerum Naturalium cultus & studia, sub Principe cui a Natura, cultura, & affectu omnes Dotes insitae, quae Musageten perficiunt; subditque, coram stupefactus admirabar, quando SERENISSIMUS HEROS Domi meae ultra biborium impendit spectandis & sapientissime considerandis Rebus Naturalibus. Verum quid externis testimoniis indigemus, quum Etruria nostra universa abunde experta sit, & satis depraedicare non valeat Paternum Tuum Animum in Optimas quasque Disciplinas, & praecipue erga Naturalem Historiam? Societas quidem Botanica erit Augustae Tuae Clementiae monumentum aere perennius, quod illam Gratiissimo Patrocinio nobilitaveris, & Munificentia fulseris; quodque illi Horti Tui Florentini curam commiseris, & praeclarum munus demandaveris conscribendae Historiae Naturalis Etruriae, unde maior semper (quod
unice

unice optamus) *Sacratissimo Tuo Nomini Claritas & Celebritas, Etruriae splendor & fama, Populis tandem Tuis certum commodum atque emolumentum profiscatur.*

Quae quum ita sint, accipies spero, CAESAR POTÈNTISSIME, Sereno Vultu librum hunc, tamquam specimen sedulitatis Societatis Botanicae in Jussis Tuis implendis, ut ipsamet Societas Augusta Approbatione recreata alacrius in Horti sibi commissi curam & splendorem incumbat, brevique illum ceteris vel celebratissimis Hortis Medicis aequiparandum reddat.

Utinam vero Clementissima Aequanimitate excipere non graveris, INVICTISSIME IMPERATOR, sudiorum quoque meorum exbiles has primitias, quas venerabundus Tibi offerro! Utinam non iniucunda Tibi accadat Dissertatiuncula, qua non sine labore Horti Tui Historiam Litterariam ab oblivione Hominum, atque ab interitu vindicavi! Atque utinam in Appendice ad Catalogum Michelianum probare digneris diligentiam meam in Rei Herbariae studiis pro iniuncto Publicae Professionis munere excolendis, & curam impensam in eodem Horto Caesareo custodien-



studiendo ac locupletando, vel institutis tribus laboriosis excursionibus, tum ut Plantas rariores in ipsum Hortum deferrem, tum etiam ut Naturalem Etruriae Historiam melius addiscerem, & illustrare aliquando possem!

Si haec pro voto successerint, acriores mihi stimulos ad laudem & gloriam addi sentiam, & quum dedicata iam Tuo Iussu, Tuisque Auspiciis Bibliotheca Magliabechiana, cuius Praefecturam mihi benignissime commiseras, liberatus sim gravi labore quem per novennium impendi in digerenda, & ad publicos usus paranda ipsamet Bibliotheca, nil mihi erit antiquius, quam ut otia, quae mihi, CAESAR MUNIFICENTISSIME, fecisti, ponam omnia in studiis, & lucubrationibus. Conatibus itaque meis Benignus adspires, quemadmodum suppliciter & humillime rogo, ut Te Auctore, Te Auspice reliqua maiorisque momenti Micheliana Opera postuma, tandem Eruditorum votis expetita, edere possim, & nonnullas meas commentationes de Etruriae Naturali Historia in ordinem redigere, inque Tui Populi utilitatem exhibere aliquando valeam.

Quod

*Quod superest, DEUM OPTIMUM MAXIMUM
ardentissimis precibus oro, ac per totius Christiani
Orbis salutem & tranquillitatem obtestor, ut
SACRAM CAESAREAM MAIESTATEM TUAM simul
cum AUGUSTISSIMA CONIUGE, & REGIA SOBOLE
salvam conservet & incolumem, omnique prosperi-
tatis genere in dies magis ac magis cumulet.*

Florentiae Cal. Sextilibus A. MDCCXLVIII.





IOANNIS TARGIONII TOZZETTI
P R A E F A T I O
 QUAE CAESAREI HORTI MEDICI FLORENTINI
 HISTORIAM COMPLECTITUR.



EI Herbariae studium in Urbe no-
 stra, Bonarum quarumcumque Ar-
 tium Matre vel Altrice, Fautores
 & Amplificatores eximios semper
 invenit. Facem ei praetulere *An-
 gelus Politianus* ⁽¹⁾, & *Marcellus
 Virgilius* ⁽²⁾, exornarunt, ut de
 ceteris taceam, *Petrus Franciscus Paulus*, *Leonardus
 Lachinus*, *Iacobus Minius*, & *Athanasius Galenicæ Medi-
 corum*

(1) V. Elegantissimam eius Sylvam quam
Rufinus inscripsit in Hesiodi Virgilique
 Georgicorum enarratione pronunciatam,
 in qua magnam Agricolæ artis universæ
 peritiam ostendit. Vide sis præterea
 quæ de Cisso, Cissoque Pliniana eruditè

solideque cum Nicolao Leoniceno di-
 sputavit, & ex quæ de Gnaphalio, Gal-
 leaque Nardo ad Pandulphum Collo-
 nium conscripsit Lib. 2. & 7. forarum
 Epistolarum.

(2) Tournefort Itag. in Rem Herb. pag. 23.

corum Setae propugnatores acerrimi (3); at stabilem sedem, & domicilium certum delegit *Cosmus Medices Magnus Dux Erruriae Primus*. Hic enim inter ipsa Imperii primordia, difficillimisque temporibus, Pisanam Academiam instaurare aggressus (4), Rei Herbariae Cathedram in ea constituit, & Veneti Amplissimi Senatus exemplum sequutus (5), Publicum Hortum fundavit in quo sparsae per varia Terrarum loca, diffusaeque Stirpium species transferrentur, & colerentur, fieretque veluti quaedam universalis Plantarum epitome, atque conspectus. In ipso ornando construendoque usus est consilio *Lucae Gbini* Forocornelienfis (6), quem idcirco A. MDXLIV. (7) in Pisanam, perhonorifice, amplexuque stipendio invitavit, e Bononiensi Academia, in qua iam inde ab A. MDXXVII. Botanici praestantissimi famam sibi comparaverat.

Paucis tamen post Annis probe perspexit *Cosmus* ex unico Pisano Horto Scholasticos eam, quam secum animo proposuerat, utilitatem capere nequaquam posse. Pisani siquidem Caeli & Soli genius Plantis Alpini, Frigidarumque Regionum propriis non favet; praeterea Anni Scholastici ratio paucarum tantummodo Plantarum integram observationem Studiosis concedit, illarum scilicet, quae Verno tempore florent; at reliquarum omnium invidet Aestate, & Autumno ad maturitatem pervenientium. Eapropter, optimo sane consilio, magnoque discentium bono, alium Publicum Hortum Medicum Florentiae in Urbe Principe

-funda-

(3) V. Anonymi Dialogum qui *Barbaro-medix* sive *Medicus* inscribitur, impressusque est primo loco inter Nova Florentinae Academiae Opuscula adversus Avicennam & Medicos Neotericos, qui Galeni discipulo neglecta Barbaros colunt.

(4) Gio. Bat. Adriani lib. de' suoi tempi L. 9. pag. 185. ed. Ven. 1587.

(5) Thomasius de Gymn. Patav. 84. & Papadopolus Hist. Gymn. Patav. T. 1. 13.

(6) Pet. Andr. Matthioli Praef. in Dioscoridem suum Edit. Valgrit. in F. 1185.

(7) A. 1544. Ghio in Bononiensi Cathedra successus fuit, & praefectiones suas publicas auspiciis est Caesaris Oddus, quemadmodum per Literas certior me fecit Cl. idemque Ratinis, Joseph Montius tantorum Virorum successos.

fundavit, elegantia paucis comparandum, in quo ramquam Naturae Vegetantis compendio, Regiis sumptibus colerentur Plantae variarum Regionum propriae, & quarum frequentior usus est apud Medicos. Ita Patriae suae ornamenta auxit, & Horti Pisani inopiam abunde supplevit. Medicinae siquidem Candidati per Férias Academicas in celeberrimo Florentino D. Mariae Novae Valerudinario Clinicae sedulam operam navantes, & Chirurgi, ac Pharmacopoei saluberrimarum Artium tyrocinia deponentes, per ocium, opportuno tempore, & magno laboris compendio Fruticum Herbarumque formas, variationes, & facultates in Horto Florentino addiscere possent, & deinde in publicam utilitatem illas usurpare.

Quonam Anno facinus id exorsus sit, nondum compertum habeo: illud solummodo certum est Hortum Florentinum absolutum fuisse ante Annum MDLVII. quo Senensium Rerum potitus est *Cosmus*, & *Florentiae ac Senarum Dux* appellari coepit. In Epigraphe siquidem in supeto limine maioris Horti Portae, *Cosmus Medicus Florentiae Dux II.* tantummodo nuncupatur.

In Horto Florentino extruendo, ornandoque, *Cosmus*, quemadmodum & in Pisano fecerat, usus est consilio *Lucae Ghinii* (8) superius memorati, nullisque sumptibus pepercit, ut elegantioribus Etruriae Viridariis Hortus hic accenseri posset, quae tamen Viridariorum per diversas Europae partes tunc temporis usitatorum elegantissima erant (9).

Architecton quisquis (10) Horti ornatui praefuit, sollers certe fuit: Topiariis enim Porticibus, Sylvisque inaequalitatem Areae laterum occultavit; Aream ipsam

(8) Leopoldo del Migliore Firenze Illustrata pag. 238.

(9) Bellinus de neglecta cultura Stirpium Probl. 20. 21. & 22.

(10) Num fuit Nicolaus Tribolo nuncupatus, quo *Cosmus* in ornando Viri-

dario Regiae Villae Castellii usus est V. Vasari in eius Vita & Baldinucci Decem. 1. della P. 2. del sec. 4. num. verni Bernardus Bontalemtis, qui paulo post Regium Bobuleum Viridarium intruxit? V. Baldinuc. in eius Vita.

ipsam in spatia, ac pulvillos daedaleos variis ambula-
cris distinxit; Colossaeis *Aesculapii*, & *Dioscoridis* mar-
moreis, ac porphyreticis Protomis decoravit; Hydro-
phylacium fatis amplum, Insulamque in centro amoe-
nissimam fecit, quam Fonte, variisque Avium e rostro
aquam iaculantium marmoreis statuis ornavit, ab *Antonio*
Gini Laurentii Septimianensi ⁽¹¹⁾ affabre sculptis. Ut
aqua Plantis irrigandis opportuna, largaque copia adef-
set, *Cosmus* Mynionem fluvium ⁽¹²⁾, Lanariorum com-
moditati respiciens, intra Florentiam derivaturus, per
Hortum deduci curavit, idem quoque saturus de
Fonte uberrimo, quem e Fesulanis Collibus Floren-
tiam perducere aggressus est ⁽¹³⁾.

Nec exiguum Horto huic decus accedit, quod
haud obscuris indiciis coniecere licet ipsum constru-
ctum fuisse super aliqua parte soli, in quo immorta-
lis

(11) Giorgio Vasari Vite de' Pittori P.
3. 289

(12) Inter Sanlecolinii Actiones Cosmi-
anas pag. 53. recenseatur *Mynia Fluvius*
intra Florentiam occultis canalibus de-
ductus. F. Agostino del Riccio Trattato
d'Agricoltura Mf. T. 1. 53. ait: Il Gran-
duca Cosimo volendo condurre una gran
copia d'Acqua alla Città di Firenze, fece
fare una gran Fossata sopra il Ponte alla
Badia in Mugnone, & in far questa Fos-
sata si tenne quest' ordine, che si tagliò
il Fiume a tagliaporre, e così si entrò
in' conti di due Campi più braccia, &
fatti un Muro a traverso, e poi sopra detto
Muro profondo più che non è il letto del
Fiume, vi si fu una volta forte, che ad
ogni due braccia abbia una buca a uso di
cada di Rendine, come sono le frattate
che si fanno agli Archibuchi, ed drizzarle
ve ne' Mari, che in verso i Mari sono
strette, e in buca sua più larghe. Così
sen queste buche, che si fanno nel fondo
della volta, acciòchè l'Acqua possa pas-
sare porgate, e entrare in quella Volta,
e di quella Volta poi si mandano al Con-
dotto. = Così facevano gli Antichi Ro-
mani, e così ordinarò il suo Condotto il
Granduca Cosimo, con una Volta tante al-

ta, che vi va un Uomo, & ha del mu-
ricciuolo d'una persona. andare su su per il
Condotto due Uomini ritti, e per il mor-
za poi vi ha fatto murare le docce aperte,
che conducono per il Condotto una mezza
braccia d'Acqua. Et pag. 25. de Horto
nostro ait: Quel che più gli dà grand' or-
namento è che è abbondante d'Acqua, che
vengono dal fiume Mugnone; ma molto più
sarà quando il Condotto sarà fornito, &
l'Acque Cristalline che verranno dal fiu-
me sopraddetto Mugnone, che cominciarò
a farle venire la felice memoria del Gran-
duca Cosimo, e poi fu seguitato dal suo
Figliuolo il Granduca Ferdinando. Ma è
stato gran danno a i poveri Giardini di
Firenze, che detto Condotto non sia forni-
to, perchè è si appo la Città fatto, cioè a
tre Vasi. Il suo stato dentro a detto Con-
dotto non molto mi piace, perchè è sta-
to fatto con tanta grandezza e magnifi-
cenza, non pensando a spesa, recita,
che molte braccia appresso a tre Vasi, che
fanno certi che guastano, quei bell' ordine
delle volte tirava Messer Jacopo Biondi
Fiorentino, &c.

(13) Baccio Baldioi Vita del Granduca
Cosimo I. pag. 70.

lis *Nicolaus Uzzanius* ⁽¹⁴⁾ de Patria sua Florentia egregie meritus amplissimum Lycaeam construi supremis Tabulis iusserat ⁽¹⁵⁾.

Quamvis Hortus Florentinus quantum inter Hortos Medicos locum antiquitatis ordine sibi iure merito vindicet, post Patavinum nempe, Bononienſe, & Pisanaum; Nullam tamen de ipſo mentionem invenies apud Scriptores Historiae Hortorum Medicorum. Contigit id fortasse quia Hortus noster alicui Lycaeum additus non fuit; Demonstratorem Botanicum assidue non habuit; eius Catalogum nemo edidit; vel tandem quia *Medicorum* Principum deliciis tantummodo inservire creditus est. Scriptoribus quidem externis succensere iniquum esset, si illum non norunt; at Nostrates, & ii praesertim plurimi, qui *Cosmi I.* gesta litteris consignarunt, culpa non vacant, quod inter praeclaras illius actiones Horti Florentini fundationem non recensuerint, quae tamen, si tempora respicias, Regium plane, & summa laude dignum facinus extitit. Fortasse Scriptores hi omnes ex illorum Censorum genere fuere, quos reprae-hendit *Augustinus Riccius* ⁽¹⁶⁾, qui per ea tempora floruit, & diserte fundationis huius gloriam *Cosmo* tribuit ⁽¹⁷⁾.

†

Parum

(14) Ab Uzzano Vallis Pefanae Pago nomen Patriae huius Familiae deductum est.

(15) In Codice inscripto: *Stratto dal Libro de' Testamenti, e dal Quaderno de' Ragionieri fatto n. l. 1495. e da altri Libri dell'Arte de' Mercatanti detta di Calimala*, qui Mf. adſervatur in Bibl. Pub. Magliabechiana, Pag. 18. sub die 17. Sept. A. 1490. legitur: *Niccolò di Giovanni de' Cattani da Uzzano per Testamento laſcì una Caſa nominata la Sapienza accantata a' Servi, alla quale per ſervirla ana entrava di Fiorini 1505. per anno in reddito di Crediti di Monte del Comune di Firenze, per ſpeſare i poveri Sculari; della qual Sapienza voſſe la cura eſſe commeſſa all'Arte e Univerſità di Calimala, e che ſi faceſſero quatero Provveditori del Collegio di detta Arte, e che dari l'Officio loro a Vita. De Hereditatis huius ſaro vide ſi Leop. del Migliore Firenze Illu.*

ſirata pag. 103. & Vaſari Vita di Lorenzo di Bicci, & Vita di Filippo Brunelleſchi, & Segni ſtoria Fiorentina: lib. 6.

(16) Trattato d'Agricoltura Mf. T. 2. 16. E' grand' errore di certi, che ragionano qualche volta, che queſto Giardino dell' Stelle non rende attillò, e che biſognerebbe mettervi Pianta da Ortolani: Queſti tali non moſtrano aver caro che il Padrone di queſto Giardino, e d' altri Giardini, abbia no lede, che ancora nella Città e fuori; poichè detto Giardino è nominato, e quel di Viſa per tutto il Mondo, ſi di bellezza, ſi di abbondanza di Pianta &c.

(17) Ibid. T. 2. 330. & 331. In particolare una ſpecie di Ciliegie non generò di tempo che furono portate da Meſſer Gioſeppe Bero in caſa Fiammingo nel Semplice delle Stalle Ducale, il qual fu ſorto dal Granduca Coſimo, e poi abbellito da' ſuoi Figliuoli &c.

Parum autem erat constructioni & ornatui confu-
luisse, nisi cultui quoque & usui prospectum fuisset.
Eapropter *Cosmus* annuam dotem Horto largitus est;
rarissimas Plantas *Ghini* ductu e longinquis regionibus in
ipsum transferri curavit, ac expertis Viris stipendium
constituit, ut Studiosis Plantarum formas facultatesque
indicarent (18).

Quinam fuerint primi in Horto nostro Plantarum
Demonstratores, latet; sed quum nullum reperire con-
tingerit ad Annum usque MDLVII. quo nempe e vivis
excessit *Lucas Ghinus*, conicere licet ipsum duplici Rei
Herbariae Professoris munere functum esse, Pisis scilicet,
& Florentiae, adeout Herbarium curriculum Pisis
incohatur in Florentino Horto per Férias Academicas
absolvere consueverit; scimus enim ipsum tunc tem-
poris Florentiae in Aula plerumque commorari soli-
tum fuisse (19).

Ghino e vivis sublato, unum tantummodo Horti Flo-
rentini Praefectum Regnante *Cosmo I.* detexi; *Aloysum*
nempe *Leonium* Bellunensem, *Ghini* fortasse discipulum.
Quandiu tali munere perfunctus ille sit, non liquet;
solummodo ab A. MDLVII. ad MDLXIII. eius nomen
in Albis Familiarium Magni Ducis legitur, adscripto
titulo, *Simplicissae*, seu *Simpliciarum Generalis* (20). Reti-
cendum non est in Albis quibusdam *Simplicissam Gene-
ralem Studii Pisani* appellari *Leonium*, quamvis dubio
procul non Horti Academici Pisani, sed huius Floren-
tini, & omnium fortasse Regionum Viridariorum cura
commissa ipsi fuerit. Certe inter Academiae Pisanae
Botanicos nullatenus a *Vigna* (21) recensetur, & an-
num

(18) Migliore, Firenze Illustrata pag. 119.

(19) V. Epistolam Jo. Hess ad Matthio-
lum editam in Lib. 3. Epistoliarum Me-
dicinalium Petri Aodr. Matthioli, Lugd.
1564. pag. 324.

(20) Estratto de' Ruoli de' Salariati del
Granduca Cosimo I.

1559. Messer Luigi Lioni da Belluno
Simplicissae Generale Studi 200. l' anno.

1557 e 1559. Messer Luigi Lioni Ge-
nerale *Simplicissae dello Studio di Pisa &c.*

1563. Messer Luigi Lioni *Simplicissae
Studi 20. il Mese.*

(21) Praef. in Animadversiones in Theophr.

num stipendium satis amplum, non ex Aerario quod Pisana Academia peculiare habet ⁽²²⁾, sed ex Aerario Publico Florentino ⁽²³⁾ ipsi perfolvebatur. Quamvis nullam de *Leonio* mentionem factam invenerim apud Scriptores Botánicos; instar tamen omnium esse poterit luculentum quod de illo praebuit testimonium ipse *Magnus Cosmus: Vincentio* siquidem *Fidelio* Reip. Venetae a Secretis, & apud se Ablegati munere fungenti, *Leonii* Herbariam peritiam splendido extulit elogio, subdiditque se illum in Indiam mittere constituisse ad perquirendas deportandasque Plantas, periculum facturum ipse, an Indicae Plantae aequales cum Italicis vires ad depellendos morbos sortitae essent ⁽²⁴⁾.

Ab A. MDLXIII. ad dimidium & quod excedit *Francisci I.* Regnum, qui nam Horto nostro praefue-
rit, non liquet. *Franciscus* sane Patris exemplis insi-
stens, peculiari erga Rem Herbariam amore flagravir,
adeo ut Botanicum in Aula sua habuerit *Franciscum*
Mazzerangium Bargaeum, qui Plantarum conquiren-
darum gratia plura itinera suscepit, in quibus, praeter
cetera, *laspidis Bargaei* celebratissimi Metalla dete-
xit ⁽²⁵⁾. Italicis tamen Plantis non contentus *Magnus*
Dux, nullis impensis pepercit, ut ex omnibus fero

† 2

Terrae

(22) Vulgo *Ducato Ecclesiastico*.

(23) Vulgo *Monte Commune*.

(24) Io Codice inscripto: *Relazione di*
Maestro Vincenzo Fidele Segretario della
Signoria di Venezia ritornato dal Duca
di Ferrara (oel 1561) M. in Biblioth.
P. Magliabechiana, sic de Cosimo Magni
Duce legitur. Or chi dirà delle Erbe, &
de i Simplicii ne have Egli una grandis-
sima cognizione, e ne ha i Giardini pie-
ni, facendole Egli tener una particular
cura, con grandissima sua dilettaçione in
farli piantare, governare, & sperimenta-
re, avendo appreso di se Huomini excel-
lentissimi di quella Professione, e tra gli
altri uno di Croidal suddito dello Ser-
enità Vostra, che in ragionare di queste
cose me l'ha molto lodato, dicendo che per

la grande Scienza sua le voleva manda-
re nelle Indie, per riportare de i Simplicii
da quelle parti, per farne prena si sua
dell' istessa virtù, e se ne sono altre forti
di maggiori che non sono nelle nostre ban-
de, & in quelle de Levante.

(25) F. Agostino del Riccio Trattato del-
le Pietre Mf. Cap. 101. de Diaspri, io-
ter caetera ait: *Diaspri di Barga* son di
color rosso luio, così vi si vede vnest rosso
acceso con prezzi di Caterdoni bianchi, che
gli danno gran bellezza. Si trovano prezzi
grandi, come quelli che facevo condurre
il Granduca Francesco in Firenze: piglia-
no gran lusso, e sono sudissimi. Detti
Diaspri gli trovò Maestro Francesco Ma-
zzeranghi da Barga Simplicista del Gran-
duca Francesco.

Terrae partibus stirpes vel florum elegantia, vel fructuum suavitate, vel medicis facultatibus praestantissimas obtineret. Immenfis propterea, & undique conquisitis Naturae muneribus non tantum elegantissima Viridaria sua mirifice illustravit, sed Floram, & Pomonam Etruscam splendida accessione primus locupletavit⁽¹⁶⁾. Hortum quidem Medicum habuit cultissimum a latere septentrionali Regii Palatii, seu verius Musaei⁽¹⁷⁾ quod ad D. Marci est, cuius curam *Dominico Boschio* Hortulano expertissimo commisit: nec diu post Hortum hunc, aliumque e latere eiusdem Palatii Meridionali, rarioribus Plantis ornandum commendavit *Iosepho Casabonae* Belgae Botanico eximio. Non tamen propterea Hortum Medicum cuius Historiam atroximus derelictui habuit, & sordere passus est; quinimmo annuam Dotem ei dixit ex Aerario Aedilium Florentinorum⁽¹⁸⁾; *Casabonam* superius laudatum ipsi praefecit⁽¹⁹⁾, & pristino splendori restituere eum meditabatur, nisi haec & alia tanti Principis incoepa, mors invida abrupisset.

Fra-

(16) Idem Trattato d'Agricoltura Ms. T. 2. 359. *Messer Giuseppe Brancaschi* Fiammingo, il quale si pote dir con verità che è stato il Padre delle belle & utili Pianta, il di lui Fieri come di Pianta di Semplari, che egli ha fatti venire, e gli ha renduti per tutto la parti del Mondo dove ha potuto arrivare con gran favore del Granduca Francesco di felice memoria, il quale si dilettava di Giardini a de' Semplari, come bene si può vedere in tutti i suoi Orti e Giardini Ducali, che ne sono ripieni. Et T. 3. pag. 40. *Gelsomini* pellegrini (Talapa) che venivano in Firenze al tempo che era vivo il Granduca Francesco; passiarli a una farcina e gara a portarli Pianta vari di Fiori e Frutti, sapendo che gli facevano cosa grata. Lode è che tanto Pianta gli furono donate; altresì Egli molte ne faceva venire d'altre Provincie, a talchè ne abbiamo oggi tutti noi parterre, e ripieni i nostri Giardini di Fiori e di Compagna. Et T. 1. 125. Le prime Pianta d'aranci della China che vennero in Firenze, furono presentate al Granduca Francesco, il quale si godeva

essere molto diligente in far condurre esse Pianta nella Città. Tandem T. 2. 357. *Casagna* Cavallina: è poco tempo che è stata portata la sua Pianta in Toscana. La prima Pianta fu portata al Granduca Francesco, che egli la mise a la sua semenza che spassava Villa di Pratolino. Questa Pianta viene da Pera, che ha fatto fratto. — Poi vedere non che sia nel Giardino delle Stalle Ducali appo la sua casa inginechiata, dove il Granduca ordinando sia per suo diletto a veder girare, e maneggiare i suoi bei Cavalli. (17) Ruff. Borghini nel Riposo pag. 479. (18) Riferito di S. A. S. de' 7. Settembre 1587. Che la spesa del mantenimento del Giardino de' Semplari si alzi all'Ufficio della Corte. (19) F. Agoli del Riccio Tratt. d'Agricoltura Ms. T. 2. pag. 74. cit. Il Sig. Niccolò Galdi favori messer Giuseppe Brancaschi, Fiammingo appo il Granduca Francesco, che egli lo fece uovere il Giardino che è al Casale: non guari molto che egli ebbe il Giardino che è alla Piazza di San Marco. Così lo pose che lo custodì molto bene.

Fraternos ausus promovit *Ferdinandus I. Magnus*
Dux elegantiarum quarumcumque Fautor Eximius, &
Casabonae Opera Horti sui cultum famamque mirifice
amplificavit.

Quoniam vero Optimum *Casabonam* memoravi,
cuius obscura sit mentio apud Scriptores Historiae Bo-
tanicae, facturum me operae pretium esse putavi, si in
medium afferrem quaecumque reperire haecenus conti-
git ad eius vitam Doctrinamque spectantia, ut appa-
reat quantopere Eximio huic Viro debeat non Hor-
tus hic tantum, sed & Res Herbaria universa.

Ioseph igitur *Casabona*, vulgo *Benincasa* ⁽³⁰⁾, natione
Belga, cui nam Rei Herbariae notitiam debeat, &
qua nam de causa Florentiam appulerit non liquet. Il-
lud solummodo compertum est, usum primo eum fuisse
familiaritate & hospitio *Nicolai Gaddi* ⁽³¹⁾ Patricii Flo-
rentini D. Iacobi Equitis, qui Generis Nobilitati in-
timam pulcherrimarum Disciplinarum cognitionem co-
iunxerat, quique praecipua elegantissimae Domus
suae ornamenta esse voluerat instrumenta ad adipiscen-
dam sapientiam ⁽³²⁾. Propterea domesticum Hortum ra-
rissimis & elegantissimis Plantis ornare aggressus ⁽³³⁾, nul-
lis

(30) Sic eum ubique vocat August. del
Riccio saepius laudatus; at *Casabonam*
Hieronymus Summarium in Schedis,
& Catalogi Familiarium Francisci, &
Ferdinandi Magnorum Ducum.

(31) F. Agostino del Riccio Tract. d'Agric.
Mf. T. 1. 74. Non è da tacere che il detto
Sig. Cav. Niccolò Gaddi fu un Uomo dilli-
gentissimo, & amatore de' Virtuosi; poscia-
chè egli fu quasi il primo che dessi principio
a' Simpliciter; poichè tornò appo se il Vir-
tuoso Messer Giusepe Benincasa Fiammin-
go, che aveva cura di tutte le Pianta no-
bili, & de' Simpliciter.

(32) V. lac. Gaddi Elog. XXIX. & Carol.
Poet. 54. Baldinucci Vita di Dom. Fas-
signano pag. 141. Negri 1h. degli Scrit-
tori Fior. pag. 453. F. Agost. del Ric-
cio Istoria delle Pietre Mf. esp. 11. Di
questa Pietra (Occhio d' Antiochia)
particolarmente ne ho veduta nel bellissi-
mo Tavolino, che ha lasciato il Sig. Cav.

Niccolò Gaddi nella sua bellissima Gal-
leria a perpetua memoria, con altre nobilis-
sime Anticaglie di singolare pregio, la
quale egli lasciò eho in perpetuo da i suoi
Heredi nella sua Casa se ne facesse corte-
sio a coloro che vedere le volessero, &
massime ai Virtuosi. Fufius de Mulano
hoc agit esp. 133.

(33) Idem Tract. d'Agric. Mf. T. 1. pag.
168. ait. — Giardini del Sig. Cav. Niccolò
Gaddi, che è appo Santa Maria Nuova —
Quivi si veggono Frutti maturi buoni, che
danno le Erutte abbondantemente alla Ca-
sa — vi sono Pianta nobili, come il Cile-
gio a Grappoli, il Prenco, il Leato Regio,
la Mortella Spagnuola, l'Uva Spina; dopo
la Erumella, la Erutano, il franto che fa le
lacciano, l'Albero di Grada, & altri frutti
simplici che vi sono assai, poichè di quel
Giardino sono ascite quasi tutte le Pianta
che sono adesso negli altri Giardini de' Oculi.
Et Alibi fufius V. Gaddi Elog. XXIX.

lis pepercit sumptibus, ut e diffitis quibusque Regionibus, & vel ipsa Aegypto, novas Stirpes flore fructu commendabiles nancisceretur, & eas inusitato molimine ab Aëris inclementia defendit, summoque studio propagavit, non oblectationis suae tantum gratia, sed ut cum Amicis communicaret, & Etruscos Agros locupletaret. Nil mirum igitur videri debet, si *Gaddius Casabonam* Plantarum notitia instructissimum facile inclientelam susceperit, eique Horti sui quem tantopere adamabat curam commiserit. Egregie fundus est hoc munere *Casabona*, nullisque pepercit laboribus, ut Hortum illum novis plantis ornaret, utque *Gaddii* votis, & erga se beneficiis responderet. Iam vero *Gaddius*, ea qua erat animi magnitudine, in Hospite suo comparatum ad Rem Herbariam amplificandam ingenium admiratus, & tantam saluberrimae huius Scientiae peritiam bono publico impendendam ratus, *Casabonam Francisco* Magno Duci commendavit, quo beneficio alios quoque Eximios Sapientia vel Arte Viros cumulare consueverat (34). *Gaddii* precibus annuit *Franciscus*, & *Casabonam* Hortis quibus Regiae ad D. Marci Aedes instructae erant, deinde Horto etiam huic de quo agimus praefecit, uti superius diximus.

Memoratu dignum est A. MDLXXXVI. *Aloen folio in oblongum aculeum abeunte*, recens ex America adveclam, primum in Horto nostro ingentem caulem floribus onustum protulisse (35), inque sui admirationem omnium oculos traxisse.

Fer-

(34) F. Agost. del Riccio Tratt. d'Agric. Mf. T. 1. 46. de Gaddio inter cetera ait — Era amato ancora dagli Ultramontani ingegnosi, perchè era lui sostegno in far loro molte cortesi; & come egli aveva visto che erano virtuosi, gli dava avvisamenti buoni, mettendogli ai Lavori di sua Altità, a ognun secondo l'Arte sua;

sicchè il suo nome si spargeva per il Mondo — era il sostegno e salvezza de' poveri Artisti, che ben sovente erano l'huana pianta; lasciandogli egli colle sue Raccomandazioni tanti Virtuosi Artisti &c.
(35) Ioach. Camerarius in Horto medico & Philosophico pag. 10.

Ferdinandus I. Rerum potitus *Casabonam* Botanici sui titulo decoravit, amplexuque stipendio fovit⁽³⁶⁾; nec diu post Hortum Medicum Florentinum pristino splendore restituere, ac in usus publicos ornare volens, provinciam hanc nulli melius se demandare posse ratus est, quam *Nicolao Gaddio*, sumptus omnes, & annuam Dotem ex Aerario Aedilium Florentinorum largitus⁽³⁷⁾.

Gaddius itaque expertissimi *Casabonae* opera usus, brevi temporis spatio, & Magno Duce probante, Hortum hunc nemini per ea tempora secundum reddidit, sive Plantarum numerum, sive dispositionem spectantes⁽³⁸⁾. Solum enim universum repurgari, ac probe subigi iussit, & Areas octo in quas distributum est, a prioribus octo Alphabeti Litteris distinxit, in pulvillos variae figurae dispescuit, stellatos nempe, cordatos, rhomboidales &c. lateribus circumscriptos, & peculiar-

- (36) Ruoli de i Salarjati del Granduca Ferdinando I. Sub A. 1588 legitur. *A Giuseppe Casabona Sempliciſſa Sondi 10. il Meſe. A. vero 1589. Strudi 2. il Meſe.*
 (37) Reſcritto di S. A. S. de' 4. Febbre. 1587. ab Inc. che la ſpeſa del mantenimento del Giardino ſi aſſeſte all' Uſcio della Parte.
 (38) F. Agoll. del Riccio Tratt. d' Agric. Mſ. T. 1. pag. 74. *Venendo la morte del detto Granduca Franceſco, il ſuo Succeſſore Ferdinando ſuo Fratello volle ampliare il detto Giard. no de' Semplici per utilità e bellezza: Così impoſe al Sig. Cav. Niccolò Gaddi detta Opera laudevole, & egli con preſſenza ſua dovette il detto Giardino delle Stalle più volte aſſonare; altrovi fece fare i bei ſcrampartimenti in terra di arazzone compoſiti con belliffimo ordine, perchè ſon' otto Quadre che egli diviſe in otto Lettere del noſtro Alfabete, cioè A. B. C. D. E. F. G. H. & così in ogni Lettera, volèi grazia A, che ſon il primo Quadro, farono fare i numeri, incominciando da uno, inſino a quanti numeri erano i Quadri piccioli ſcrampartiti; così farono fare al quadro B. che farono ſignare i numeri tutti dalle Scarpellini ſopra le Mexxane Compagnate, e cominciando da uno andava inſino a ottocento e più, ſe più Oſtetrici vi*

fuſſero in quel Quadro del B. così farono fare a tutti i detti otto Quadri. E poi avevano creato un Libretto che così deſcriveva come il Giardino, in otto Lettere A. B. &c. & in numeri ogni Quadro, e così s'era ſcritto in detto Libretto tutte le Pianta Perlegirane, e uſuali, e quello il ſecundo acciò non fuſſe tolto loro le Pianta; altrovi per conto dell' ordine, per poter nominare il numero inſuſſe de' Semplici che ſi conoſceva mſſeſe Giuſeppe Benincasa Fiammingo del Regno di Caſtiglia, dove ſtette aſſai tempo, & così d' altre parti del Mondo conoſceva ſemplici e Fiori & Erbe di pregio, uſuali, e bellezze T. autem 1. pag. 198. ſubſcribit. Queſta ſi ſia per rego'a ſcriva ſtable e buona, quando vuoi uſare buoni Erbaggi, dirigeſi i tuoi Campi aſſando due braccia, come ſi fa quando ſa poni le Pigne; così per parecchi anni avrai Pomi, & Frutti &c. & alteri tutti gli Erbaggi Semplici, e Pianta di Fiori verranno di ſomma bellezza & grandezza, come s' è veduto nel belliffimo Giardino & inſuſſe Sempliciſſa, che fece dirvegliare il non mai abbazienza lodato Sig. Cav. Niccolò Gaddi per ordine del Granduca Ferdinando; perchè ho viſto tutte le Pianta e piſſe, e ſeminate, con preſſenza venir grandi.

culiari numero scalpri ope notatos. Pulvillorum sane variantes Daedaleas formas repraesentat Tabula Horri Ichnographica A. MDCCXVIII. confecta iussu Societatis Botanicae: eorum item specimen habes apud Cl. Tillium in Tabula Ichnographica Horti Pisani ab ipso met *Casabona* digesti. Singula memorata spatia peculiaribus Plantarum classibus, Acanacearum puta; Ferulacearum, Bulbosarum &c. addixit *Casabona*, eo ni fallor ordine, quem in Pisano quoque Horto deinceps distribuendo servavit. Suis sedibus collocavit *Ghinianas*, & *Leonianas* Plantas quae supererant; earum autem quae perierant iacturam compensaturus, diversa per feraciores Etruriae Provincias Itinera suscepit, inter quae memoratu dignum illud est A. MDLXXXIX. cum *Ioachimo Jungermannio* per Tyrreni Maris Littora institutum (39). Semina in Horto, excursionibusque collecta, in eleganti Spermatophylacio (40) magna cura asservabat, ut cum Amicis communicare, & Exoticarum Plantarum Seminibus permutare posset. In summa totis viribus annitebatur, ut conceptae a Magno Duce de se spei responderet, & *Gaddii* Evergetae sui praeconiis par esset.

Instauratus Florentinus Hortus, & Italicis, vulgarisque illatenus Plantis satis instructus, non explevit immensam in *Ferdinando* cupiditatem amplificandi Rem Herbariam; quin potius extimulavit, ut novarum, & Exoticarum larga accessione Hortum ipsum locupletaret. Ea propter *Casabonam*, cuius peritiam & sedulitatem saepius probaverat, Regiis sumptibus in Cretam Insulam misit, ut Plantas elegantissimas, & Europae usque dum ignotas perquireret, ac Florentiam de-

fer-

(39) Car. Clusius Rariorum Plantarum. Historia pag. 204.

(40) F. Agost. del Riccio Tratt. d'Agric. T. 2. 362. Si possino ancora conservare i Semi in uno Budivolo fatto di legname, come aveva fatto messer Giuseppe Benin-

essa Viammingo, che era alta sei braccia, e larga altrettanto, piena di Cassette piccole, che ogni Cassetta aveva le Deservizioni e i numeri, che i millisimi che quei Fiori erano stati colti, per poter vedere se erano vecchi o no.

ferret (41). Nobile hoc propositum Magnitudinem Animi tanti Principis abunde exprimit, ea praecipue de causa, quod primus omnium talia ausus sit, nullius exemplum sequutus; sed potius exemplo suo excitaverit Moderatores Patavini Lycaeii, ut A. MDCXL. *Ignatium ab Agris* in eandem Insulam mitterent, Plantarum colligendarum, & in Hortum Patavinum inferendarum gratia; Magnos deinde Reges, summosque Viros, ut certatim Europaeos Hortos Stirpibus Novi Orbis ditarent. Caeterum Creticas prae reliquis optimo consilio delegit *Ferdinandus*, cum quia elegantissimas quasdam ex ea Insula acceperat olim a Fratre suo *Lucas Gbinus* (42); tum quia Creticae Plantae ob raritatem, virtutemque singularem, in tanta semper aestimatione Gentium fuisse, ut etiamnum *Galeni* aevo Imperatores Romani Herbarios suos in Creta aluerint, qui singulis annis ad nobilium Antidotorum compositionem Stirpes Urbi necessarias subministrarent (43), persuasionemque apud eosdem processisse fateatur *Plinius*, quicquid in Creta *Iovis* Patria nascitur, infinito praestare ceteris alibi genitis.

Memorable Creticum hoc Iter a *Casabona* perfectum est A. MDLXXXX., & insequenti; nam die III. Novembris A. MDLXXXX. e Candia illius Urbe principe ad *Carolus Clusum* litteras dedit (44), & A. MDLXXXXII. semina quaedam cum eodem *Cluso* communicavit recens a se collecta in Creta Insula (45), Plurium itaque mensium spatio universam ferme illam feracissimam Insulam peragraré valuit *Casabona*, a Munificentissimo Principe praesidiis & commodis omnibus instructus, ac *Hieronymi Cappelli* Senatoris Veneti, Insulae-

† †

(41) Idem Aug. Riccius in Agricultura sua Mf. variis locis. Car. Clusius Rar. Plant. Hb. 165. & Prosper Alpinius de Plantis Exoticis in Epistola ad Lectorem.
(42) Barthol. Maranta in Methodo co-

gnoscendorum Simplicium pag. 87.

(43) Galenus Lib. 1. de Antid.

(44) Car. Clusius in Rariorum Plant. Hb. pag. 165.

(45) Idem ibid. XXV.

sulaeque Provisoris Generalis Patrocinio commendatus (46). Discrimina vero, & incommoda longae, difficilisque peregrinationis alacriter superavit iuventutis robore, & vehementissima qua flagrabat Plantarum observandarum cupiditate. Uberem propterea, laetumque laboris fructum tulit innumeras pulcherrimas ignotasque antea Stirpes, quas redux Florentiam advexit, quasque omnes in Horto Florentino satas fuisse, certissimus testis est *Augustinus Riccius* (47), non in Pisano, quem admodum perperam asserunt *Alpinus* (48), & *Vigna* (49). Non exiguum proinde decus Horto nostro accedit, quod ex ipso, tamquam e penu ditissimo, prodierint omnes fere Creticae Plantae, quas *Casabona* cum Amicis Botanicis communicavit, quasque ipsi in editis Libris Orbi Erudito proposuere.

Quum iam *Casabona* Horti nitore satis prospexisset, utilitati quoque Studioforum consulere voluit: propterea Catalogum Plantarum omnium ibidem cultarum confecit in octo partes divisum, quarum singulas ab octo prioribus Alphabeti Litteris denominavit, singulis Horti Spatiis seu Arcis respondentibus (50). Dolendum maximopere est periisse, vel in Bibliographia aliquo latere Catalogum hunc, quem *Augustinus Riccius* vidisse, pluriesque manibus usurpasse se adfirmat. Utinam vero *Casabona Stephani Rosselli, & Augustini Ric-*

(46) Prosper Alpinus in Praef. ad Libros suos de Plantis Exoticis.

(47) Trattato d'Agricoltura Mf. T. 2. pag. 74. de alibi passim.

(48) Loco superius laudato.

(49) Praef. in Animadversiones suas in Theophrastum.

(50) V. adnotata superius n. 38. Idem Aug. Riccius Agriculturae suae T. 3. pag. 14. ait: Chi fusse desideroso d'aver molti più fiori che io non ho nominato, vada al bellissimo Giardino delle Stalle Ducale in Firenze, altronè al Giardino della Città di Pisa, quali Giardini furon ordinati dal non mai abbastanza lodato messer Giuseppe Benincasa Fiammingo, posli e custoditi p-

ne alla sua morte, o consideri i fiori che in quelli vi sono, o per saperne i nomi loro si faccia mostrare il Libro detto il Repertorio, che chiama ciascuna Pianta per ordine; perchè il Giardino tante volte nominato delle Stalle è diviso in otto Quadre. — Et io ho più volte avuto il detto Repertorio nelle mie mani con mia comodità. Et T. 2. 371. ma chi vuol vedere, si faccia prestare al Giardinere delle Stalle Ducale la Lista, o Libretto di Messer Giuseppe Benincasa, o dal Figliuolo suo che sta al bellissimo Sempliceria di Pisa, o potrà vedere quante siano quelle Pianta che non è solito che siano state condotte, quella Città di Firenze.

Ricci (51) consiliis usus, Hodoeporicon suum Creticum litteris consignasset, & typis edidisset! Quanta exinde Naturali Historiae accessio facta fuisset! Saltem Auctori suo inventorum gloria integra remansisset; nec Botanici quidam, Cornicis Aesopicae in morem, alienis pen- nis superbirent. Ego quidem veritatis, & illustrandae Historiae Litterariae studio, conatus sum undecumque decerpere Catalogum Plantarum fere omnium ab ipso inventarum, ac in Florentino primum, deinde in Pi- sano Horto cultarum, quem fortasse aliquando in lu- cem proferam. Inde profecto patebit eas fere omnes Creticas Plantas, quae a Scriptoribus Rei Herbariae Saeculi XV. exeuntis, & XVI. incipientis exhibentur; *Casabonae* laboribus, & *Ferdinandi I.* Magni Ducis mun-ificentiae deberi, si aliquas excipias ab *Honorio Bello* Vicentino in Creta Medicinam faciente paulo pridem repertas, sed plerumque easdem cum *Casabonianis*.

Duobus circiter annis post *Casabonae* e Cretica Peregrinatione reditum, Magnus Dux Horti Pisani se- dem cum elegantiori, ac commodiori, in qua ad nostra usque tempora conspicitur, permurare decrevit, eique operi praesse voluit *Casabonam* (52), qui brevi temporis spatio, summaque diligentia Hortum novum Pisenum ea methodo disposuit, qua adhuc dum viget, a Celeb.

† † †

Michaële

(51) Idem Riccio T. 2. pag. 378. Post- quam de Aemone, seu Ranunculo flore pleno rubro verba fecit, addit. Ma non dirò di che Provincia si sia; perchè quel virtuosio Semplicista che lo portò alla no- stra Città, che fu Messer Giosepe Benin- casso, del quale si è fatta menzione spesso e meritamente, non volse scrivere l'In- ventario, che sarebbe stato tuoto utile a tutti gli amatori delle Piantie nobili e belle. Imperocchè fu molte volte pregato da me, e da Messer Stefano Rosselli Firen- tine, ed egli forse pensava di farlo; ma la malavoglia Parca gli tagliò il filo, ed essì furono costati prima di molti anni di Piantie rare, sì nostrali, come peltigrine.

(52) Idem T. 2. pag. 75. Qui potrei dire che il detto Messer Giosepe Benincasso fu

mandato dal Granduca Ferdinando alla Città di Pisa, a creare un bello e vago Giardino tutto di Semplici, e Piantie di gran Virtù, ed egli il fece con gran pro- fessione, come si vede che oggi è. Et pag. 77. E tempo così, che noi torniamo a ragio- nare di Messer Giosepe, il quale dicvamo che aveva posto al Semplicista delle Stalle, e dopo questo fu mandato a porre il gran Semplicista alla Città di Pisa, il quale fu scompartito e posto con grand' ordine e diligenza, e in mentre andava in mano cercando di provvedere nuove Piantie, e Semplici rari, si fu impelle- to il suo bel pensiero dalla morte, che cor- rendo a noi Fiorentini l'anno 1595. se lo tolse.

Michaële Ang. Tillio descriptus, & Horti Florentini Plantas nobiliores, Creticas praefertim, in ipso propagavit. Scientia propterea, & sedulitate sua promeritus est *Casabona*, ut a Magno Duce Custos Horti ipsius renunciaretur; quo tamen munere, in Pisana Academia tunc primum instituto, non nisi ab A. MDLXXXIII. ad MDLXXXV. fungi potuit. Vehementi siquidem perquirendarum Plantarum amore incensus, ac corporis robore & aetatis vigore nimium abusus, nova itinera suscepit, inter quae memorabile unum est, quo ex Agro Tyburtino *Styracis* Arborem Pisas detulit (53): assiduis propterea exanthlatis laboribus, morbi vehementissimi labe suscepta, Morti succumbere coactus fuit A. MDLXXXV. Aerae Florentinae. Eius mors calamitosa admodum fuit Rei Herbariae Studiosis; tum quod aditum ei obstruxit ad nova praeclara inventa; tum praecipue quod frugiferam aliquam eius Commemorationem nobis invidit. Credere siquidem fas est *Casabonam*, si senectutem adeptus esset, quum ob virium infirmitatem non ultra ipsi licuisset edita Montium iuga conscendere, & labores Botanicarum Peregrinationum comites tolerare, animum ad scribendum applicaturum fuisse. Quod autem secum decrevisset aliquid in posterum commentari, conicere licet ex eo, quod, teste *Augustino Riccio*, Pisas accersiverit *Danielem* quemdam Popularem suum Piorem egregium, illique iusserit, ut Plantas Horti Pisani integras, & flore fructuque onustas, in Charta maxima nativis coloribus repraesentaret (54),

Mo-

(53) Dom. Vigna in *Animadvert.* in *Theophrastum* pag. 105.

(54) Trattato d' Agric. M. T. 2. 75. *Messer Girolamo Brancusa* per voler dare la maggior satisfazione all' onorato Studio Pisano, chiamò un suo compatriotto *Fiammingo* *Messer Danielem* mio carissimo, e gli dette ordine che dipignesse, anzi minuisse tutti i Simplicii, e Pianta rara del Giardino in fogli Imperiali, ma le dipignesse

quando erano fiorite, e colle foglie e Cipolle loro, accorchè si cognoscessino da tutti quelli che erano in Pisa, e da altri per i tempi avvenire: Opera che, se si fosse, sarebbe nominata, e meritamente per tutto il Mondo. Num *Daniel* iste *Flosche* cognominis fuit? quo usus est *Riccio* in *Marmorum* figuris repraesentandis, quemadmodum facietur ipse in *Historia delle Pietre* M. cap. 118.

Mores *Casabonae* quod spectat, nil aliud comper-
tum habeo, nisi quod nonnihil difficilis, & nimium
parcus fuit in scientia propaganda. Eapropter pau-
cos in Re Herbaria Alumnos reliquit Florentiae, per
quos tamen *Augustinus Riccius* plurimum se profecisse
fatetur (55). Perpetuus atque constanti Principis Gratia
floruit, ab Eruditis Etruscis laudem, & favorem pro-
meritus est; extra Etruriam vero nominis sui famam
propagavit, & Amicos, admiratoresque sibi paravit
Botanicos quosque praestantissimos, quibuscum littera-
rium commercium coluit, & femina Plantarum a se re-
pertarum communicavit (56). Verosimile est *Casabonam*
Medicinae Doctorem renunciatum fuisse: *Vigna* siqui-
dem (57), & *Riccus* in eo nominando, honorificum *Ex-
cellentissimi*, aliumque vernaculum titulum, quo Do-
ctores indicabantur, usurpant. Saltem *Alpinus* (58) illum
fuisse asserit in simplicium Medicamentorum studio
maxime versatum, & *Georgius Hieronymus Velschius* (59)
Quartanam Ostruthio a *Casabona* curatam refert.

Eius opera quod spectat, praeter *Catalogum Plan-
tarum Horti Florentini*, & *Icones Plantarum Horti Pisani*
a *Daniele* Belga expressas, *Riccus* subinnuere videtur
Catalogum quoque *Plantarum Horti Pisani* a *Casabona*
huncscriptum fuisse (60), qui fortasse ille idem est, quem
Hieronymus Summarius in Bibliotheca sua asservabat
A. MDCXXIII., simul cum fasciculo *Epistolarum* eius-
demmet *Casabonae* (61); nullum tamen opus, quod
sciam,

(55) Idem Agric. T. 2. 378. de *Casabona*
ait. *E' ben vero, che io ho preso molti
nomi da lui, e da' suoi Discepoli, ancora
che fossi alquanto tenace in comunicarli,
che più presto lo rendeva più grato agli
Uomini virtuosi: ma se per sorte egli fosse
stato della mia natura, amarevole in pas-
sare i suoi segreti agli altri a vicenda, sareb-
be stato più utile all'autorità, che avrebbe
fatto più Discepoli che non ha fatto.*

(56) Sunt hi Carolus Clnsius, Ioachimms
Camerarius, Caspar, & Iohannes Bau-
hini.

(57) Animadv. in Theophr. pag. 105.

(58) Praef. ad Libros suos de Plantis
Exoticis.

(59) Exoticarum Curantium & Obser-
vationum chiliad. 1. 664.

(60) V. Adnotata superius n. 50.

(61) Hieronymus a Summaris Patric. Flor.
& Pisani Athenaei Moderator vigilan-
tissimus in Catalogo quodam Codicum
Mf. Bibliothecae suae, qui Mf. asservatur
in Bibliotheca Magliabechiana, inter co-
teros Codices recenset: *Libro del Simpli-
cissima Casabona del 1595. coperto di Cartape-
pera. Lettere del Casaboni in un mazzo.
Quindici del quadro de' Veneti in bianco.*

sciam, typis editum prostat. Effigies tanti Viri conspicitur Pisis in vestibulo Horti Academici.

Liceat modo ab oblivione hominum, atque a silentio vindicare merita Optimi Viri, & praecipui *Cassabonae* Amici, cui Agricultura Etrusca, Hortusque noster plurimum debent. *Augustinus* is est e Florentina Patricia *Ricciorum*, vulgo *del Riccio*, Familia, qui Dominicanorum coetui sese addixit, & suavissimis moribus multiplicem Doctrinam coniunxit. Potissimum autem sese devovit Agriculturae Studio, in quod per triginta circiter Annos roto animo incubuit, latifundiis Coenobii sui D. Mariae Novellae praefectus. Iamvero praecepta theoretica, quae diuturna observatione collegit, & crebra experientia comprobaverat, in publicam utilitatem proferenda ratus, vastum Opus Geoponicum conscribere orsus est A. MDLXXXV.; sed ad umbilicum perducere non valuit, & in adversariis reliquit, nam Actatis A. LVII. e vivis sublatu est A. MDLXXXVIII. die XVIII. Decembris. In Moniro ad Lectorem ait se Opus illud in quatuor partes secare, proposuisse, quarum prima *Agriculturam Praedicam*, altera *Theoricam*, tertia *Florilegium*, quarta *Pomarium*, complecteretur. Prima, *Agricultura* nempe *Experimentalis*, seu *Practica*, ad dimidium fere usque perducta, exhibet Alphabeti serie digesta Praecepta Geoponica universalia, historiam & rationem culturae plurimarum Plantarum, ac descriptionem instrumentorum, quibus Agrorum & Hortorum cultura nitorque procurari possit. Theoremata sane continet secunda, praxes, & cautiones Etrusci Soli Coelique genio accommodatas; verum scriptionis genus adeo prolixum, adeo incompletum est, ut Lectoribus fastidium subinde creare possit. Accedit quod *Riccus* tam crebro dicendorum feriem parergis plerumque incongruis abruptit, & levissima qualibet occasione abrepta narrationes praelongas

gas interferit, quibus plurima sane scitu digna, nec adnotata uspiam alibi posterorum memoriae consignavit; sed de illis merito dici potest: non erat hic locus. Ego tamen parergis *Riccianis* plurimum me debere profiteor Historiae huius Horti Florentini causa, tum quod e *Riccio* tantummodo hauserim ea fere omnia, quae de Magnorum Ducum munificentia, de *Gaddii* vigilantia, & de *Casabonae* doctrina & laboribus superius retuli; tum etiam quod luculenter didici, maximos, & fere incredibiles progressus fecisse per ea tempora in Eruria nostra Rem Geoponicam, & Hortensem, quod peculiari Dissertationi olim fortasse usui erit. Altera pars operis *Ricciani*, seu *Agricultura Theorica*, est Catalogus & ratio Operum Rusticorum & Hortensium, per Anni Temporum, & Mensium seriem digestus, praeceptis & cautionibus optimis respersus. Harum duarum partium Antigraphum coevum, a Cl. *Michelio* olim comparatum, modo Bibliothecam meam ornat, simile Antigraphi alterius, quod in Bibliotheca Regii Nosocomii D. Mariae Novae adservatur. Utinam vero duas reliquas partes educere licuisset e tenebris Bibliotaphii cuiusdam, in quo, ut fama fert, delitescunt! Tertia quidem volumen erat in charta maxima, in qua *Riccus* a *Vincentio Dorio* ⁽⁶²⁾ pingi curaverat nativis coloribus Plantas omnes floris venustate commendabiles, quae Magnorum Ducum Munificentia, & Optimatum Florentinorum sedulitate ex diversis Orbis parti-

(62) Riccius ipse Tract. d'Agrie. T. 2. p. 582. Qui potest advertire gli Amatori di lei & leggaderi fiori, che se vogliono quelli Encomi deffrirti da me, si degnino vedere il Libro che ho fatto dipingere di tutti i Fiori d'Italia, e quivi vedrà tutti gli Encomi salutarî bene con i propri colori — & questo Libro l'ha dipinto Messer Vincenzio Dori Fiorentino: con grand' amore, e studio, e lo stesso l'ha fatto il magnifico Sig. Girolamo Summi, & il Libro è suo, e l'ha fatto per compiacere-

mi. Et T. 3. pag. 9. Nel Libro che ha dipinto Messer Vincenzio Dori Fiorentino per l'Illustre Sig. Girolamo Summi, ove si frugano tanti bellissimi fiori, opera veramente degna d'un tal Signore, nel quale tengo anch'io, e per mia soddisfazione e contento ha fatto dipingere tal onorato Libro, che in vero è il primo che si sia fatto nella Città di Firenze, sebbene tuttavia si sono incominciate a dipingere più Carte da altri; e questo è servito come debbe stare, che è l'anno 1596.

partibus delatae, Hortos Agrosque Etruscos ornabant A. MDLXXXVI. Digesserat illas *Riccus* iuxta seriem mensium quibus singulae florere solent, adiunxeratque brevem descriptionem. Sumptus operi ministraverat *Hieronimus Summarius Ioannis* Fil. Patric. Flor. *Riccii* Amicus & Fautor, & apud ipsum adservabatur Liber iam absolutus A. MDLXXXVI. Quarta tandem pars complectebatur Icones Fructuum omnium, quibus Pomona Etrusca tunc temporis superbiebat: non tamen compertum habeo an perfecta, & ad umbilicum perducta ab Autore fuerit.

Florilegii memorati iacturam aliquatenus mihi supplevit aliud splendidissimum *Riccii* Opus, quod modo adservatur in Bibliotheca DD. *Del Turco-Rosselliorum* Patricior. Florent. repertum in Hereditate Familiae *Rosselliae*. Codex est Chartaceus Elephantinus paginis constans VICC., in quibus CCVI. Plantarum Icones nativis coloribus ab eodemmet *Vincenzio Dorio* repraesentatae fuere, nullo tamen servato ordine, nulloque nomine adscripto, si CXVIII. priores excipias: *Riccus* idem pluribus locis Agriculturae suae superius memoratae⁽⁶³⁾, asserit se in hoc ipso Codice, sumptibus Amici sui *Stephani Rossellii*, repraesentari ad vivum curasse Plan-

(63) Præfettim T. I. pag. 76. ait. Così potrà esser messa in luce la bellissima Opera fatta da Messer Stefano Rosselli Uomo molto virtuoso, e la Città di Firenze gli ha da avere un grand'obbligo, poichè è stato la cagione della salvezza di molti co' suoi Segreti veri che ha fatti nella sua Bottega, che a volergli amminare farei troppa lunga, ma solo voglio dir qui un utile e bel suo pensiero, che egli ha desiderio che si faccia un'Orto romano, che sia abbondante di tutte le Piante curate e utili e che riteneansi per un Strupicizia per salvezza della Città — Voglio dire quattro parole in nome di Messer Vincenzio Dori Pittore Fiorentino, che molto lodevolmente s'è affaticato a dipingere le Piante Medicinali per Messer Stefano Rosselli: ha preso le Piante del soprannominato Giardini della Stalle quando erano

forite, con le Bark e Radici loro, & in ottimi fogli bianchi le ha ritratte co' suoi colori proprii — E nell'ultima del Libro si farà un Repertorio a uso di Scento, che nominerà tutte le Piante dipinte: Opra non men bella, che utile, e vaga. Similmente non sarà men bello e utile il Libro che ho fatto dipingere de' Fiori dal detto Messer Vincenzio Dori. Egli ha tenuto il medesimo ordine laudabile che ha fatto per Messer Stefano Rosselli, poichè abbi dipinto tutte le Piante, e i suoi fiori, e Vaglie verdeggianti, e altri con le Cipolle, e Barke — Io non solo ho fatto ritrarre una Rosa, ma dieci sorte di Rose co' suoi colori proprii e naturali, & il detto Libro è quasi finito, che sarà fra quattro Mesi in circa, lo porterò al Padrone che ha fatto sì laudabile spesa per compiacermi.

Plantas fere omnes, quae in Horto hoc Medico Caesareo colebantur, & eas potissimum quas *Casabona* e Cretica Peregrinatione attulerat. Quum A. MDCCXL. pretiosum hunc Codicem bis, at per sex circiter horas tantum contemplari mihi licuerit, non satis admirari potui pulchritudinem & veritatem Imaginum illarum, statimque venit in mentem facturum me operae pretium, si nomina Plantarum in ipso Codice repraesentatarum ab oblivione revocarem. Adnotavi igitur raptim quaecumque potui, & Catalogum attexui fortasse aliquando edendum. Futurum autem fore confido ut Aequi Lectores exinde colligant quantopere dives fuerit Hortus noster, & quatenam sint verae *Casabonianae Creticae Plantae*, quas varii Scriptores suppresso *Casabonae* nomine pro suis venditarunt; quamvis in hoc *Rosselliano* Libro non omnes prorsus contineantur, quemadmodum ex alio subnexo Catalogo apparebit. Nobilissimos tamen Cimelii huius Possessores etiam atque etiam rogatos velim, ut ausus meos aequi bonique consulant, praesertim quum e furto hoc nonnisi decus ipsis accedat. Ceterum reliqua *Augustini Riccii* opera ad Rem Herbariam, ad Lithologiam, & ad Mnemonicen pertinentia, quae Manuscripta apud me, & in variis Florentinis Bibliothecis adservantur, silentio praeteream, illa adnotasse contentus, quae ad Horti nostri Historiam illustrandam opportuna visa sunt.

Postquam *Casabona* Pisas sese contulit, incertum est quid Horto nostro contigerit, & quisnam ipsius curam adsumpserit. Compertum solummodo est, Regnantem *Cosmo II.* Magno Duce, Horti Medici formam, famamque retinuisse (64). Equidem Magnus Dux die XXIV. Iunii A. MDCIX, illius curam commisit *Benedicto Puntiae* (65)

† † †

Se-

(64) V. Thomae Dempsteri *Etruriam Regalem* T. 2. pag. 366.

(65) Registro d' Arruolati di Palazzo dei Pitti 1609. *Meffer Benedetto Puntia* in Ruolo per godere i Privilegi, a ciò abba in cura del Giardino de' Semplici della Cavalleria-

zin a San Marco, del quale al presente ha cura Pietro Giardiniero, come per Patente, Copia autentica del Signor Viceroy Mag. giore de' 24. Giugno. Ex Adnotatis Equitis Ant. Franc. Marmii, quae in Biblioth. Pub. Magliabechiana adservantur.

Senensi, *Dominici Filio*, Equiti Aurato, Comiti Palatino, *Christianae Lotharingicae Magnae Ducissae* a Medicina. Mentionem de ipso inveni tantummodo in Epistola quadam *Cassiani a Puteo ad Marcum Aurelium Severinum* (66), & apud *Puccinellium* (67). Ceterum animi dotes, & virtutum praemia quibus inclaroit, luculenter indicat Elogium, quo eius Sepulchrum Florentiae in Templo D. Proculi ornatum est (68).

Hortulani munere interea functus est *Petrus Maecetius* ab Anno usque MDCIX. (69), cui circa A. MDCXXV. successus est *Ioannes filius*, *Botanici* postmodum titulo decoratus (70). Retiendum non est reperisse me in *Albis familiarium Cosmi II.* descriptum A. MDCIX. *Franciscum Casabonam Botanicum*; sed nescire an *Iosephi Filius* fuerit. Certe *Riccus* (71) pag. 704. Agriculturae suae diserte asserit, Filium quemdam *Iosephi Casabonae Horto Pisano* praefuisse iam ab A. MDLXXXVI., quo *Iosephus* e vivis excessit. Praeterea *Hieronymus Summarus* Pisani Lycaeii Moderator, in Catalogo (72) Codicum manu exaratorum Bibliothecae suae, recenset Rationem quamdam impensis & expensis a *Casabona* A. MDCVII. Num hi *Casabonae* unus idemque sint *Iosephi Filius*, & num Pisani, num vero Florentini Horti curam habuerint, non liquet; praesertim quum inter Pisanos Botanicos a *Dominico Vigna* (73) coaeva nullatenus recenscantur. Verosimile tamen est *Franciscum* superius memoratum Florentino solummodo Horto addidum fuisse, quum stipendium non ex Aerario peculiari Academiae Pisanae, sed ex Regio Florentino perciperet.

Inter

(66) Extat apud Severinum in *Vipera Pythia* pag. 504.

(67) D. Placido Puccinelli, *Vita del Principe Ugo* pag. 63.

(68) V. Puccinelli, *Memorie Sepolcrali* pag. 52.

(69) Hieron. a Summaria Pisani Athenaei Moderator in *Schedia variis*, quae Mss. adservantur in Biblioth. Magliab. adnotavit inter cetera: *Petrus Maecetius Giur-*

diniero alle Stalle di S. A. in Firenze 1615. e 1618.

(70) Ruolo de' Salariati del Granduca, Ferdinando del 1625. Segnato R. Giovanni di Piero Maecetii *Scampicella*, Scudi 78.

(71) V. Adnotata superius N. 50.

(72) Adservato in Biblioth. Magliab. *Libretto di Conti del Casaboni* 1607.

(73) Praefat. in *Animadv. suas in Theophrastum*.

Inter rariores elegantioresque Plantas, quibus Hortus Noster per ea tempora superbiebat, memorandae sunt *Calamus Aromaticus Officinarum*; *Thymus capitatus*, qui *Dioscoridis*; & *Helleborus niger flore roseo*, e Creta & Belgio delatae, quae tamquam indubia exempla *Acori*, *Thymi* & *Hellebori nigri Dioscoridis* proponuntur in *Antidotario Florentino* editionis quartae A. MDCXXIII.

Ab excessu *Benedicti Pundae* nullum invenimus Horti Praefectum ad Annum usque MDCLIV., quo *Angelus Donninius* Flor. Med. D. illius, aliorumque Regionum Viridarium curam sumpsisse adparet, & ad Annum usque MDCLXVIII. ad minus continuasse. Anno sane MDCLIV., *Bocconius* Panormo ipsi transmissit semina *Tblaspeos Leucoii folio latifolii platycarpi Siculi semper virentis, & semper florentis* (74); Ab A. MDCLVII. ad MDCLXVI. in Albis Familiarium *Ferdinandi II.* Magni Ducis descriptus reperitur, titulo *Viridarium Praefecti Generali* (75). Immortalis *Franciscus Redius* in Epistola ad *Petrum Natium* data d. XXIII. Ianuar. A. MDCLXVII. (76) scribit misisse se ad *Donninium* plures radices *Solani Tuberosi esculenti* C. B. vulgo *Batate*, & *Glandes* aliquot *Quercus latifoliae*, quae Magno Duci ex Mauritania Tingitana missae fuerant, ut in Regio Boboleo Viridario, & in Horto Medico de quo agimus ferendas curaret. Tandem *Angelum Donninium* recenseret inter Fautores suos *Bocconius*, in *Epistola ad Studiosos Rei Herbariae*, impressa ad calcem *Catalogi* cuiusdam *Seminum Plantarum quae venui exposuit* A. MDCLXVIII.

Donnini igitur vigilantia, & *Ferdinandi II.* Magni Ducis, ac *Ioannis Caroli Principis Medicei* S. R. E. Cardinali Amplissimi Munificentia factum est, ut Hortus

† † † 2

Me-

(74) Paolo Boccone Museo di Pianta. Rare pag. 6.

(75) *Giardinier Generale, Studi* 6. il Me. fr. Ruoli in Segreteria Vecchia, e gli

Eratti di essi nell' Archivio Segreto.

(76) Impressa est inter Redii Epistolas Tom. 5. Operum omnium pag. 44.

Medicus Florentinus rarissimis, & undique conquestis Plantis refertus, ceteris similibus Hortis longe praestaret. In eo siquidem primitus delatae sunt ex Indicis oris Plantae plures elegantissimae, & ex eo *Donnini* illarum semina cum Amicis, *Iacobo Zannonio* praefertim, *Io. Baptista Triumphetto*, *Paulo Bocconio*, & *Ant. Scarellio* (77) primus communicavit. Quasdam e Plantis in Horto nostro cultis recensuit ipsemet *Donninius*, in *Catalogo Plantarum Florentinos Hortos ornantium*, quem A. MDCLXII. typis edidit, Appendicis instar ad *Thomae Bellucci Catalogum Plantarum Horti Pisani*. Sed ex sterili Catalogo illo aestimari nolim cultum, & splendorem Horti Florentini per ea tempora. Si enim advertas plures e Plantis a *Zannonio*, *Triumphetto*, & *Bocconio* relatis, a *Donnino* praetermitti, facile colliges plurimas alias, non minus speciosas, in Horto cultas *Donninium* posteris invidisse. In infelicibus hisce Catalogis Plantas plures ab aliis Botanicis illatenus non descriptas, primi quidem *Belluccius*, & *Donninius* indicarunt; sed genericis, vel brevissimis tantummodo nominibus, adeo ut arduum modo sit in immenso Plantarum cognitarum numero eas expiscari. Si autem exactam ipsarum descriptionem subiungere, vel saltem praecipuas differentias nomine, seu definitione includere non detrectassent, Libellus ille utilitatem aliquam nobis adferret, & ipsi inventorum gloria non parum incla-
ruissent.

Reticendum non est Anno circiter MDCLII. *Christianum Mentzelium* in ipso hoc Horto Florentino primum observasse (78) *Cannam vel Arundinem totam niveam & foliis, & caule; Urticam item minime urentem,*
quae

(77) V. Zannoni 18. 20. 69. & 191.
Bocc. Mus. P. I. 76. 148. 78. 111. 129.
137. 150. 151. Raf. 12. 31. 52. 73.
Triumphett. Observ. 96. Scarelli Possibile

ad alcuni capi della Storia Botanica di
Giacomo Zannoni 17. 23. 36. 57.

(78) V. Eius Pugillum Rariorum Plantarum.

quae an *Donnini* solertiae debeantur, ignoro: Certe demonstrant per ea tempora Hortum nostrum magno in precio habitum fuisse vel ab Exteris Botanicis, qui longis peregrinationibus alios celebratissimos Europae Hortos inviserant.

In Albis Familiarium Magni Ducis A. MDLVII. descriptum inveni *Ferdinandum Donninium Regiis Viridariis Praefectum*, *Angelo* fratri adiunctum. Vir hic multiplici doctrina ornatus, variis peregrinationibus per nobiliores Europae Provincias, in quibus militaverat non sine gloria, politioris Agrorum & Hortorum culturae praecepta addidit, & in Etruriae usus transtulit. Anno MDCLXXX. Instructionem quamdam Typis *Petri Martinii* edidit, de serendis, plantandis, atque putandis Moris, qui canon maioribus occultus, atque invisus fuerat (79).

In partem laudis cum *Angelo*, & *Ferdinando Donniniis*, venit tertius Frater *Philippus* Med. D. (80) & ipse Rectorum Viridariarum Praefectus, qui plurium novarum, & elegantissimarum Plantarum semina cum *Zannonio* (81) communicavit, praesertim vero e Perside & Syria delata ab *Augustino Tanio* Flor. Ordinis Praedicatorum. Ceterum *Philippi Donnini* labores Botánicos fusc inferius prosequemur.

Interim animadversione digni sunt Codices duo chartacei in folio, manu exarati, qui errori ansam praebere possent. Unus in Bibliotheca Pub. Magliabechiana adservatur, ab Anonymo quodam circa initium Regni *Ferdinandi II.* (ut videtur) concinnatus, mendacem titulum praefereens: *Trattato di diverse Erbe che nascono*

NO

(79) Dom. M. Mannius de Florentinis Inventis 31. & Mich. Ang. Tillius Catal. Horti Pisani.

(80) *Philippus Donninus* Flor. Viridariis Regiae Cels. Praefectus, qui Plantas in Baldo Ferone Montis crescentes legit, & enumeravit. Tillius Praef. ad Catal.

Horti Pisani. Iacobus Zannonius in. Historia sua Botanica pag. 20. & 192. Philippum Donninum appellat Soprintendente delli Giardini del Serenissimo Granduca.

(81) V. Gise. Zannoni Historia Botanica variis locis.

no nel Giardino de' Semplici di San Marco, e in altri Giardini di questa Città di Firenze, colle sue Figure. Tyronis cuiusdam labor improbus est, qui e Dalechampii, & Molinaei Historia Generali Plantarum Gallice edita Lugduni A. MDCXV. figuras omnes Plantarum, ipsarum quoque Marinarum, & Corticum etiam, radicum, ac fructuum exoricorum officinalium abscidit, chartae agglutinavit, singulisque subscripsit nomen, locum natalem, formam, & facultates, ea fere methodo, qua Cameraarius usus est in Matthioli Epitome. Eundem falsum titulum recentius additum, nempe: *Figure dell' Erbe tirate dalle naturali Piante, che sono in Fiorenza nel Giardino de' Semplici, detto delle Stalle, di S. A. S. praefert Codex verustior in folio, qui Ferdinandi Ughellii* (edita Italia Sacra, aliisque doctrinae monumentis Illustris) dono accessit Bibliothecae Monasterii sui Florentini Cisterciensium A. MDCLIV. Revera continet infelices quasdam Plantarum figuras, in singulis paginis singulas, easque non e vivis in Horto cultis Plantis desumptas, sed e verustiori aliquo Herbario descriptas, quorum plura saeculis XI. & XII. confecta in variis Bibliothecis adservantur. Rudium illorum temporum proculdubio fetus est, exhibetque Plantas monstrosas & chimericas, quales ferme in ineptissimo *Horto Sanitatis Ioannis Cubae* spectantur, qualesque non Hortus noster, sed malefanum Auctoris cerebrum protulit.

Munificentiam *Ferdinandi II.* sensit etiam *Paulus Bocconius* Panormitanus, de universa Naturali Historia egregie meritis, qui aliquandiu in Etruria vixit *Botanici Regii* titulo decoratus⁽⁸²⁾, eamque ferme totam perlu-

stra-

(82) Ipse Bocconius in Epistola ad Cosmum III. Magnom Etruriae Ducem Nuncio. patoria Libri sui inscripti *Recherches & Observations naturelles*, ait: *J'ay eu l'honneur pendant quelques années d'être l'un des Herboristes du feu Monseigneur Vostre Père.* In Epistola autem ad Studiosos Rei Herbariae, quae impressa habetur in cal-

ce Catalogi Seminum Plantarum venum ab ipso expositorum A. 1668. se Pius Magno Duci intervisse asserit, & Amicorum suorum Philobotanorum infinita humanitate animi, ac liberalitate, Botanici Magni Etruriae Ducis Lauream condecoratum fuisse.

stravit. Non quidem Horti nostri (Praefectis, ut diximus, instructi) curam peculiarem habuit *Bocconius*, sed pro iniuncti muneris ratione, ad ipsum locupletandum detulisse videtur Plantas quaslibet novas, rarioreque in Botanicis suis excursionibus repertas. Certe eius Epistolam quamdam se vidisse mihi retulit Vir Nobilis & fide dignus, qua *Bocconius* ad scribit, misisse se Plantas plures in usum Horti Medici Florentini, oratque ut expensas referri sibi curet ex Aerario IX. Virorum Florentinae Ditionis Conservatorum, quibus id oneris incumbere satis sciat.

Cosmus III, Magnus Dux, ut peculiari semper erga Rem Herbariam amore flagravisset, & Etruriam novis floribus fructibusque ornare studuit; ita quoque Horti sui Florentini cultum & nitorem cordi habuit. Propterea ipsum locupletari curavit rarissimis, novisque Plantis, petitis ex omni Regione, insignium eius aetatis Herbariorum opera usus, praecipue *Philippi Donninii* Regionum Viridariorum Praefecti superius memorati, cui iussit ut Baldum Agri Veronensis Montem inviseret plantarum colligendarum gratia. Strenue *Donninus* Principis iussa perfecit, quumque diu seduloque Montem illum feracissimum perlustrasset, plures rarissimas Plantas redux deportavit, ac ne laborum, inventorumque suorum memoria interiret, conscripsit *Hodoeporicon* absolutissimum, quod apud illius *Heredes* adservari aiunt⁽⁸³⁾. Fortassis autem luce publica indignum non esset, & Descriptionibus eiusdem Montis a *Calceolario*, *Pona*, *Passerinio*, & *Martinio* conscriptis, aequiparari posset.

Usus quoque est *Cosmus* in Horto suo locupletando opera *Pauli Bocconii*, qui tunc temporis Cisterciensium Ordini addictus in Florentino Monasterio degebat, in

(83) Pet. Ant. Michellius in Epistola Nuncupatoria Partis I. Novorum Generum Plantarum.

(84) V. Boccone, Museo di Pianta Rare pag. 41.

in eoque A. MDCLXXXIV. peculiarem Hortum Plantis a se conquisitis instruxerat, ut Medicis ac Pharmacopoeis ipsarum formas demonstraret. Pluribus sane novis per Etruriam Botanicis Excursionibus Hortum Regium Florentinum *Bocconius* auxit, & Libris, quos *Cosmi* Munificentia adiutus conscripsit, nova decora conciliavit.

Plantas rariores, quibus postremis *Ferdinandi II.*, & primis *Cosmi III.* Magnorum Ducum Imperii Annis, Hortus Florentinus nitefcebat, describere constituerat *Petrus Natius* Iunior Flor. Med. D. *Petri Natii*, qui *Cosmo I.* Magno Duci a Medicina fuit, Abnepos, *Thomae Bellucci* Discipulus, & in Pisana Cathedra successor. *Erat animus* (sic ait ipse) ⁽⁸⁵⁾ *sub una Phytologica Observationis Epigraphæ omnigenas Plantarum species in Hortis Florentinis repertas, diuque subsæcivis temporibus a me observatas, multorum ad exemplar, onomastico ordine recensere; & si quæ simul paralipomena in eodem genere existissent, cuncta in unum volumen reclusa publici iuris aliquando facere, non alium in finem, nisi ut Indigenæ uno fere intuitu Stirpes, quas colere Florentia didicit, probe nossent, & Advenæ illas, quæ forent a nobis expetendæ, numquam ignorarent. Hoc mecum dum commentabar Opusculum, & animo manus congruebant, Iconesque multas aere iam incisas, & huic rei comparatas reservabam &c.* Insignem hanc collectionem revera molitum esse *Natium*, & propterea figuras aliquot Plantarum, aeri incidi curasse, testis ego esse possum, qui oculis usurpavi singularia exempla quindecim, ni male memini, Tabularum ænearum ad hoc ipsum *Natii* Opus pertinentium, in unum volumen formæ quartæ compacta, apud Cl. *Micheli*um adservata. *Micheli*us quidem ex archetypis *Natii* Tabulis exemplum hoc expressisse

con-

(85) *Petrus Natius* in Florentina Phytologica Observatione de Mælo Limonia

—*Citrata*—*Aurantia*, Florentiæ vulgo la *Bizzarria*, in Monito ad Lectorem.

contentus, illas transtulit in usum Libri sui *Novorum Generum Plantarum*, figurasque inibi suas incidendas curavit, abrais veteribus *Natii* figuris, eo potissimum quia Plantae illae novitatis gratia spectatoribus sese commendare non amplius valerent, a pluribus Scriptoribus dudum publici iuris factae; quod sane non contigisset, si *Natius* ipse supremam manum operi imponere, illudque edere prohibitus non fuisset a luctuosa caecitate, qua diu confictatus est. Ceterum inter Plantas a *Natio* representatas, memini tantummodo *Floris Cardinalitii*, seu *Rapuntii maximi coccineo spicato flore Col. in Rech.* 888. Fructus *Pyri* foliosi monstrosi, & *Convulsi* exotici cuiusdam; nequaquam enim volumen illud ad manus meas devenit cum reliquis Michelianis Libris. Notari tamen meretur, *Natium* in Iconibus hiscé exprimendis usum esse Pictore, & Sculptore parum peritis, nec ullatenus comparandis *Balthasari Francschinio* cognomento *Volaterrano*, & *Hallucchio*, quibus Icon *Mali Limoniae-Citratae-Aurantiae* debetur.

Aliud praeclarum monumentum Plantarum Florentinum Hortum ornantium, vidi ego adhuc puer in Bibliotheca Viri Cl. *Brunonis Tozzii*, dum in Florentino Sancti Pancratii Monasterio degeret. Codex erat Chartaceus in folio maximo, seu Regio, ut vocant, exhibens plurimas figuras Plantarum, quas vivis coloribus, miraque arte exprimi curaverat *Ioseph Baldius* Flor. Med. D., qui exeunte Saec. XVII. multiplici doctrina, ac Rei Herbariae potissimum studio inclaruit. Cimelium hoc modo adservatur Londini in Bibliotheca *Guilielmi Sberardii* Botanici dum viveret praestantissimi⁽⁸⁶⁾.

Non ita pridem coemi Libellum formae quartae manu exaratum, & ita inscriptum: *Index locupletissimus Plantarum omnium, quae in Viridario Botanico, a Iosepho*

††††

Baldio

(86) Pet. Ant. Michellius in Syllabo Auditorum, quorum nomina brevioribus

|| notis compendii causa citata sunt in P. L. Novor. Generum Plantarum.

Baldio Medico Physico Florentino spatia 36. Annorum elaborato, continentur: Prior numerus paginam, secundus cuiuslibet Plantae appositum numerum demonstrabit; uberioris tamen doctrinae gratia, ad habenda omnium Plantarum Synonyma, indicabitur quo loci a Casp. Bauhino in Pinace Theatri Botanici ipsa Planta reperiatur, &c. Terminatum hoc opus A. D. MDCLXXXVI. &c. Adversaria haec sunt autographa ipsius Baldii, lituris scatentia, continentque Catalogum Alphabeticum Plantarum, nescio an Horti cuiusdam sicci, an vero Codicis Sherardiani superius memorati.

Duobus ab hinc annis coemi alium quemdam Catalogum Horti Nostri, Vernacula Lingua a Studiofo aliquo, circa *Philippi Donnini* tempora, conscriptum, & recensentem Plantas plures elegantissimas, praesertim Syriacas, Creticas, Montis Baldi &c. Sunt eae CXX. numero constatae in Fideilibus intra, & circa Insulam dispositis; CXXII. in Area prope Regium Hippotrophium; LXI. in Area a Sambuco denominata; CXIX. in Area Hippocastani; V. in Area Plantarum Venenatarum; & XIX. in Fideilibus per Hortum sparsis.

Aliud tandem luculentum testimonium cultus Horti Nostri per ea tempora, esse potest ditissimus Hortus siccus, quem nuper vidi, inscriptus: *Erbario di Filippo Buontempi Speciale di Sua Altezza Reale*, in duo ampla volumina divisus, complectensque sceleta plurima Stirpium rarissimarum Chartae Regiae agglutinata. Volumen primum inchoatum fuit A. MDCLXII. absolutum A. MDCLXXXV.; Alterum vero inchoatum eo ipso Anno, absolutum fuit A. MDCCV.

Post *Donninos*, nullum peculiarem Horti Praefectum constitutum fuisse certum est; sed Hortulanos tantummodo ipsius curam habuisse. Hi sane Florilegio potissimam navantes operam, despiciatui habuere, & paulatim interire passi sunt reliquas omnes Plantas, quae

quae Floris venustate sese nullatenus commendarent. Talem labem frustra sustinere conatus est Vir in hoc studiorum genere summus *Petrus Antonius Michellius*, Magni Ducis Botanicus renunciatus d. XVIII. Octob. MDCCVI., & Plantas in Hortum hunc, Pisanumque deferre iussus.

Variis quidem ille per Italiam Botanicis excursionibus novas Plantas in Hortum transtulit, aliarum item exoticarum semina ab Amicis obtinuit; sed omnes ferme Cultorum socordia periire.

Ut varia, at breviora Italica *Michellii* Itinera, Magni Ducis sumptibus peracta, sileam, Horto Nostro immensam accessionem factam fuisse credendum est ex Itinere illo, quod peregit A. MDCCX. plurium mensium spatio per Agrum Romanum, perque Apuliam, variasque alias Regni Neapolitani Provincias, ut inter cetera, Plantas a *Fabio Columna* descriptas suis in locis observaret. Memini sane *Michellium* fateri solitum, plura se uno hoc Itinere addidicisse, quam decem aliis. Id autem hoc argumento confirmari potest, quod MCCCXLI. Plantarum species a se observatas recensuerit in descriptione primi istius Itineris Apuli, quam litteris consignavit, quamque publici iuris facturus ego sum, cum reliquis multis Michelianis Operibus Postumis, quum ocium, & aes suppetet. Non minori, nec minus splendida Plantarum peregrinarum messe Hortum hunc locupletavit *Michellius* A. MDCCXII. & insequenti, quibus per sexdecim menses, Magni Ducis iussu, Tyrolin, Austriam, Bohemiam, Borussia, Silesiam, Thuringiamque perlustravit. Verum praeclari isti omnes Regiae Munificentiae, & *Michellii* laborum fructus, tam multae, tam venustae Plantae, Cultorum socordia, ut aiebam, periire. Factum proinde est, ut Horti sui tantum dedecus indignatus Magnus Dux, *Societatis Botanicae Florentinae* precibus benigne annue-

†††† 2

rit, .

rit, ipsique Hortum eundem pristino nitore Regiis sumptibus restituendum commiserit.

Quoniam vero *Societatis Botanicae* Magni Etruriae ornamentum mentio incidit, opportunum visum est brevem Historiam originis, & instituti ipsius attexere, ut inde constet quam late modo pateat in Urbe nostra Naturalis Historiae Studium.

Praecipua institutae *Societatis* laus debetur Io. *Sebastiano Franchio* (87) Luccensi Med. D., qui in Urbe nostra, vel adhuc Iuvenis, praestantissimi Polyatri famam existimationemque sibi comparaverat, & multa ac assidua familiaritate cum *Michelio* coniunctus, Rei Herbariae Studium summo opere semper dilexit. Squallente, ut diximus, Horto Publico, *Franchius* Clinicae occupationibus detentus, nullibi melius observationes Botanicas instituere poterat, quam in Hortulo Medico Nosocomii D. Mariae Novae, qui ab ipso *Marcello Virgilio* (88) memoratus, proculdubio vetustissimus inter Hortos Medicos censeri debet. In hunc igitur *Franchius* a *Michelio* transferri curavit Plantas plures indigenas, auctorque fuit *Nicolao Gualterio* tunc Medicinae Candidato, postmodum Archiatro celebratissimo (89), ut ex Horto Pisano Exoricas aliquot deportaret, quae tamen omnes Hortulanorum socordia citissime perire. Quum igitur illam, quam secum animo proposuerant, utilitatem ex Horto Nosocomii non consequerentur *Franchius*, *Michelius*, & *Gualterius*, cui sese adiunxit amicissimus *Ioseph Caietanus Monilia* I. C. & Prof. Pub., Hortulum aliquem domiciliis suis proximiorum parare constituerunt, in quo tamquam in portu confugere, & suavioribus Musis litare possent. Propterea die I. Octob. A. MDCCXVI. conduxerunt Hortum, & inferiorem par-

(87) V. Micheli N. P. G. P. s. pag. 14.

(88) V. Marcelli Virgilii Comment. in Diofcor. Lib. 4. cap. 36. de Eupatorio.

(89) V. Novelle Letterarie di Firenze dell' A. 1744. Fog. 9. e 10. de' di 12. Febr. e 6. Marzo.

partem Domus cuiusdam in ea Urbis Regione, quae *Boffi* vulgo nuncupatur, adscitisque in societatem *Iosepho Suaresio de la Concha* Pat. Flor. D. Steph. Eq. & Metrop. Ecclesiae Canonico, nunc *Miniatensium Praefule Meritissimo*, ac *Cercbio Cercbio* Senat. Flor. & D. Steph. Eq., inter se convenerunt, ut *Michelius* Plantas in Hortulum defetret, & apta cultura educati curaret; ipsi sumptus omnes in eam rem suppeditarent. Paulo post Homileticen hanc Eruditam ad Academicæ formam evexerunt, adiunctisque in societatem Studiorum Viro Cl. *Philippo Bonarota* ⁽⁹⁰⁾ Senat. Flor., *Baribol. Gornia* Archiatro, & *Cypriano Antonino Targionio* ⁽⁹¹⁾ Polyiatro celeberrimo, constituerunt die X. Iul. MDCCXVII. *Franchium* Directorem, *Suarezium* Provisorem, *Monilium* a Secretis, *Gualterium* Custodem, *Michelium* tandem Rei Herbariae Professore, & Plantarum Investigatorem. Interea Horti solum probe expurgatum ac subactum, & in quatuor spatia divisum, *Suarezii* & *Cercbii* munificentia aptatum, ac fidelibus plurimis auctum, Plantis a *Michelio* delatis conferere coeperunt; Domum item universam conduxerunt, & erudita supellexile ornaverunt, Libris praecipue Philosophicis & Botanicis, quos *Monilia* e Bibliotheca Avi sui *Io. Andreae* Archiatri suppeditavit.

In Hortulo Aestate A. MDCCXVII. *Michelii* societia iam satis culto, satisque instructo, Academici conveniebant quoties a muneribus quique suis vacarent, & vel eruditis colloquiis, ac Plantarum observatione animum recreabant, vel lectione, aut meditatione, prout cuique libitum esset, tempus fallebant. Ipsorum certe institutum collaudavit *Guilielmus Sberardus* Anglus, Botanicorum sui Aevi facile Princeps, quod novo conatu, Academicorum Studiorum materiam edidit:

(90) V. Io. Lamii Memorabilia Italorum &c. T. 1. pag. 7.

(91) V. il F. 16. delle Novelle Letterarie di Firenze del 1748. 18. Giugno.

ditissimo Rei Herbariae penu delegerant. Smyrna ille redux, in Horto Boffiano plures Michelianas novas Plantas non sine voluptate observavit, Academicorum eruditius colloquiis, ac Sympofis interfuit, & ftimulos ipfis addidit, ut propofitum illuftrandae Rei Herbariae alacrius urgerent. Summi itaque huius Viri approbatione freti Academici, maiores quotidie progreflus habuerunt, & brevi Civium fuorum laudes promeriti funt; adeo ut plures Viri Docti, & elegantiarum amatores, cum ipfis in partem ftudiorum & laudis venire poftularint. Impetrarunt autem *Pandolphus Pandolfinus*, & Comes *Ferrantes Capponius*, Senatores Flor.; *Carolus Th. Strozza* Patr. Flor.; *Benedictus Brefcianus* (92) Ser. M. Ducis a Secretis & Bibliotheca; & *Io. Bapt. Felicius* Comes, & Med. D. in *Barthol. Gorniae* demortui locum adfcitus, qui omnes in Leges dudum fancitas iurarunt d. III. Febr. MDCCXVIII. Horum itaque omnium collata opera Hortulus Boffianus tanta Plantarum accelfione locupletatus in dies fuerat, ut iam DXXV. diverfas fpecies ftudiofis exhiberet; quumque propterea locus novis Plantis deeffet, Academici ampliorem ftudis fuis fedem quaerere coacti funt.

Opportune interea, uti fuperius diximus, cogitaverat Magnus Dux Hortum fuum Florentinum priftino fplendori reftituere, qui Cultorum focordia adeo fquallebat, ut non plures LXXXIV. Plantarum fpecies contineret, aut ad fummum CLX. fi Arbores fructiferas includas. Eapropter Societatis Botanicae precibus facile annuit Magnus Dux, & Clementiffimo Diplomate d. XXXI. Octob. A. MDCCXVIII. ipfi Medicum Regium Hortum cuftodiendum, exornandumque annua dote CCCL. Aureorum conceffit. Regia Munificentia recreati Academici, ftimulos fibi ad laudem addi fenferunt, & ut Principis iuffa perficerent, varias Leges fan-

(92) V. Lami Memorab. Ital. T. 1. pag. 47.

sanxerunt, quibus Horti culturae & nitore prospiceretur. Praeerat Societati Vir summus *Philippus Bonarota* electus d. VIII. Sept. & Director Culturae Plantarum erat *Michelius*, qui spartam sibi commissam strenue ornavit. Quatuor enim Horti spatia Camporum in morem squallentia subigi curavit, in pulvillos parallelogrammos Buxis tonsilibus circumscriptos dispescuit; duo alia spatia Arboreto destinavit pulvillis in quinquecem distributis; pulvillosque alios in Sylvula prope maiorem Horti portam Plantis Alpina paravit.

Paucissimas deinde, quae supererant, Plantas Casabonianas, & Donninianas ab interitu vindicavit; illas quas in Hortulo Boffiano coluerat transtulit, ac permutatione sceletorum Plantarum a se in Italia primum inventarum, obtinuit A. MDCCXIX. a Cl. *Vaillantio* semina CCXXIV. Exoticarum, quibus praecipue Immortalis *Tournefortius* ex Orientali suo Itinere Regium Parisiensem Hortum ditaverat.

Rebus ita constitutis, Socii Botanici, suadente *Michelio*, decrevere non Exoticas tantum Plantas, sed rariores etiam Italicas, ac praesertim Etruscas in Horto colendas esse: Maxime siquidem proficuum Studiosis, & pergratum Advenis fore crediderunt, si uno in loco observare possent Stirpes quascumque pulchriores Italia Tellus profert. Accessit quod seminum ipsarum permutatione, facilius Exoticas Plantas, quibus Hortus locupletaretur, obtinere se posse sperarunt. Huic muneri destinarunt *Michelium*, qui perquirendarum Plantarum amore inflammatus libentissime impositum onus suscepit, & quaesitum ivit eas in nativis locis a *Casalpino*, *Anguillara*, *Columna*, *Barrellerio*, & *Bocconio* indicatis, ut archetypas tantorum Virorum Plantas tunc nancisceretur. En brevem Catalogum Itinerum Botanicorum, quae *Michelius* iussu Societatis Botanicae peregit Regnante *Cosmo III.*. Inter prima recensebo unum insti-

institutum per Ilvam Insulam, per Montem Argentarium, aliaque Orae Maritimae Etruscae loca. Secundum per Mugellanam Praeturam, Alpes Iugi dictas, Agrum Bononiensem, rursus per Alpes Mugellanas, Pistorienses, Mutinenses, & Apuanas, Agrum Petrasanctanum, & Oram Maritimam Lucensem: in huius Descriptione ad CLXXXX. Plantas a se observatas recenset. Tertium per Vallem Arni inferiorem, Agrum Paludemque Blentinatem, Montes Pisanos, Planitiem Pisanam, Oram Maritimam Liburnensem, Lucensem, & Massensem: in Descr. Obs. Pl. N. LXXXVI. Quartum A. MDCCXXII. per Urbem Romam eiusque Agrum, per Oram Maritimam Hostiensem, Centumcellanum, & Crassetanum: in Descr. Obs. Pl. N. LXIII. Quintum eodem Anno cum Cel. Io. Hieronymo Zannichellio Amico suo per Venetorum Insulas, praecipue illam Pordelio dictam: in Descr. Obs. Pl. N. CCXIV. Semina collecta in Itineribus hisce *Michelius* permutavit cum Amicis, plurimaque Exotica obtinuit a *Vaillantio* A. MDCCXX. XXII., & XXIII.; a *Boerhaavio* LVII. A. MDCCXXII., & a *Sherardio* CXL. collecta in *Horto Fratris* A. MDCCXXIII. Mirum proinde dictu est quam facile revixerit, & quantopere postremis Regni *Cosmi III.* Annis enituerit Hortus, Societatis Botanicae vigilantia, & *Michelii* laboribus, ut brevi antiquum decus famamque recuperarit. Vivunt sane plurimi oculati testes instaurationis huius, quae aestimari etiam posset ex variis Catalogis Plantarum Horti ipsius, quae inter *Micheliana* Manuscripta adservantur. Post *Bonarotam* Praefides Societatis fuere *Pandulphus Pandulphinius* Sen. Flor., & *Petrus Capponius* Marchio, qui nonnulla circa Leges pro opportunitate variarunt, & Societatem Viris omni doctrinae genere spectatissimis auxerunt.

Parum de splendore suo amisit Hortus Regnante *Ioanne Gastone* Magno Duce, Moderantibus Societatem
Bota-

Botanicam Viris Amplis. *Petro Franc. de Riccis* a San-
 ctioribus Consiliis S. C. M. Sen. Flor. Equestris Ordinis
 D. Steph. Praefide, ac Pisani Athenaei Moderatore, &
Scipione Capponio Marchione, quamvis plurimae sese
 obtulerint difficultates, quas referre non vacat. *Miche-*
lius solito investigandarum Plantarum amore incensus,
 praeter breves excursions per Agrum Florentinum,
 iussu Societatis libentissime perfecit Itinera sex Bota-
 nica, quibus Hortum mirifice locupletavit. Primum
 fuit Mense Octobri A. MDCCXXIV. Per Alpes Falte-
 ronae, Camalduli, & Alverniae: in Descr. Obs. Pl.
 N. LXXXIII. Secundum A. MDCCXXV. cum D.
Io. Hieronymo Zannicbellio superius laudato, per Iapi-
 diam (93). Tertium A. MDCCXXVIII. a d. XX. Nov. ad
 XV. Dec. per Castrum Florentinum, Collensis Urbis, &
 Volaterrarum Agrum, Dynastiam Gheradescam, Oram
 Maritimam Populoniensem, Plumbinatam, Campilia-
 nam, Vadorum Volaterranorum, & Liburnensem: in
 Descr. Obs. Pl. N. XLII. Quartum A. MDCCXXIX.
 Mense Julio diebus duodecim per Agrum Arretinum,
 Alpes Montis Acuti, Sextini, Saxi Simeonis, Carpi-
 nae, Alverniae, & Vallis Umbrosae: in Descr. Obs. Pl.
 N. LXII. Quintum A. MDCCXXX. per Apuliam, ut in-
 vestigationem Plantarum a *Fabio Columna* descriptarum
 absolveret, & observationes in alio Itinere per easdem
 ferme regiones habito A. MDCCVI. inchoatas recen-
 seret. Alterum hoc Iter Apulum perfecit iussu, & sum-
 ptibus partim Societatis Botanicae, partim Moderato-
 rum Academiae Pisanae, comitem adsumpsit V. Cl. *Tho-*
mas Perellium Med. D. nunc in Pisano Lycaeo Astro-
 nomiae Prof. Pub., & immensa Plantarum accessione
 Hortum hunc Florentinum, & Academicum Pisanum
 ditavit. A die igitur VIII. Maii ad XXII. Iunii, ingenti

+++++

labore

(93) V. Io. Hier. Zannicbelli Opuscula Botanica Postuma pag. 9.

labore perlustravit Vallem Arni superiorem, Agrum Arretinum, Cortonensem, Assisianum, Fulginatem, Pedivallensem, Nursinum, Aquilanum, Sulmonensem, Populensem, Pettoranensem, Castropignolensem, Volturnariensem, Foggianum, Ciriniolensem, Hortanum, Montem Garganum, Agrum Manfredonensem, Sancti Joannis Rotundi, Serranum, Campimarini, Tremitanum, Piscalancianensem, Piscariensem, Anconitanum, Ariminensem, Bononensem, Apenninum, & Praeturam Mugellanam tandem: in Deser. Obs. Pl. N. CCCIII. Sextum iter illud est, quo Aestate eiusdem Anni a die XVIII. ad XXVIII. Aug. cum *Brunone Tozzio* Abb. Valumbrosi. Rei Herb. Prof. Cl. Agrum Pistoriensem, Alpes Apuanas, Agrum & Oram Maritimam Petrasanclanam ac Lucensem invisit: in Deser. Obs. Pl. N. XLIV. Silentio praetereundum non est *Brunonem* ipsum *Tozzium* Mense Sept. A. MDCCXXVII. Societatis Botanicae iussu, iter per Alpes varias Etruscas peregrisse, indeque LXXV. Plantarum species in Hortum deportasse. A. MDCCXXIV. *Michelius* nova Exoticarum Plantarum semina a *Vaillantio* accepit, & duobus insequentibus annis alia a Fautore suo summo *Herm. Boerhaavio*.

Feliciores illuxere dies Societati Botanicae A. MDCCXXXI; Praefide namque *Ferrante Capponio* Comite, & Senat. Flor., amoris sunt obices plures, ipsique Hortum universum pro lubitu excolere licuit. *Michelii* igitur suasu Spatium Quintum, seu Orientale superius, rite subactum, distributum fuit in Areolas LVII. margine lapideo circumscriptas, ac peculiaribus numeris scalpri ope notatas; ipsis deinde Areolis *Michelius* Plantas sextae, & septimae Classis Tournefortianae conferi curavit, & ut ipsarum Classium inopiam suppleret, tria itinera peregit. Primum fuit Mense Octobri A. MDCCXXXI. per Alpes Pistorienses: in Deser. Obs. Pl. N. LXV. Alterum A. insequenti, me sibi comite, adsci-

adscito, a d. XXI. Oët. ad II. Nov. per Vallem Arni
superiorem, Agrum Arretinum, & Cortonenſem: De-
ſcriptionem ipſe confeci. Tertium A. MDCCXXXIII.
a d. XXII. Maii ad XXI. Iunii cum *Io. Bapt. Mauua-*
ſonio Med. D. per univerſam ferme Provinciã Senen-
ſem, Comitatumque S. Florac: in Deſcr. Obſ. Pl. N.
CCL. Silentio prætereundum non eſt, *Io. Domini:um*
Civininiũ Med. D. die XIX. Aug. eiſdem Anni, in
conſeſſu Societatis pronunſiaſſe Diſſertationem ſuam
de Natura & Viribus Malorum Limoniarum, Citriarum,
& Aurantiarum, quam deinde publici iuris fecit (94).

Ferranti Capponio ſuffeſſus fuit d. IV. Sept. A.
MDCCXXXIII. *Vincentius* e Marchionibus *Capponiis* Ec-
cleſiæ Metropol. Flor. Canonicus, qui incomparabili
ſedulitate Horti nitorem, & Societatis decus promove-
re annifus eſt. Sociorum etenim quorundam, *Michelij*
præſertim, Gualterij, & Ant. Cocchij conſiliis uſus, qui-
bus unica Horti cultura exiguum nimis, nec ſatis di-
gnum munus Inclſyta Societate viſum eſt; materiem
ſtudiorum & exercitationum Academicarum ex uni-
verſa Phyſica Scientia delegit, in qua tot Eruditorum
Virorum ingenia expatiari libere poſſent, & Socie-
tatem, novis præclaris Sodalibus auſam, non amplius
Botanicam, ſed Philoſophicam Florentinam appellari ma-
luit. Propterea novas Leges, quibus Studiorum &
munerum ratio definiretur conſcribi curavit, in quas
irarunt Socii d. XV. Ian. MDCCXXXIV. St. com.

Hanc ſuam Inſtaurationem ſolemni panegyri ce-
lebrandam decrevit Societas, idque onus commiſit ſuo
a Secretis V. Cl. *Antonio Cocchio* ſuperius memorato,
Med. D. Phil. Nat. & Anatomes Prof. Pub. S. C. M.
Antiquario, & Regiæ Londinenſis Societatis Sodali,
qui ſtrenue perfunctus eſt munere ſuo, & novum So-

++++ 2

cic-

(94) *Della Storia degli Agrumi: Lezione.*
Accademica di Gio. Domenico Civinini

|| *Scio dell' Accademia Botanica Floren-*
tina. In Firenze 1734. in quarto.

cietatis Institutum pro dignitate, laudavit Oratione publice pronunciata d. II. Sept. A. MDCCXXXIV. in Aula Veteris Palatii, in frequenti Civium Exterorumque confesso. Eam Orationem, quae Societatis propositum luculenter exprimit, ipse Cl. *Coccius* mecum perhumaniter communicavit, & ut in calce Praefationis huius ederem permisit.

Novis Legibus sancitum erat inter cetera, ut statis diebus publici Academici Confessus haberentur, in quibus Socio cuilibet nova in Physicis observata proferre, & Dissertationes de variis Physicomedicis argumentis perlegere liceret.

Primus itaque publicus Confessus habitus est die XX. Sept. A. MDCCXXXIV. apud Io. *Gualbertum Francesebium* Patr. Flor., eique praeter ceteros interfuit Vir Ampl. *Martinus Folkes* Anglus, modo Regiae Societatis Londinensis Praeses meritissimus. *Michelus* duas *Hippocassani* species distinxit, a Botanicis illatenus sub uno *Hippocassani vulgaris* nomine compraeensas. Prima fructum profert spinis raris, brevibus, & rectis armatum, ac seminibus setum rotundis; Altera spinis crebris, longis, & uncis munitum, semina autem oblonga continentem: Utriusque specimina recentia obrulit ex Regio Castellii Viridario, & ex Horto de quo agimus. Obrulit quoque, & descripsit Folia, Flores, & Fructus *Yuccae Indicae* in hoc Catal. descriptae pag. 101., notas characteristicas Generis *Yuccae* ab Auctoribus propositas emendans. Io. Bapt. *Felicius* Comes & Med. D. ostendit & descripsit Calculos plures a se in Cystide Fellea Cadaveris Humani repertos. Ego exhibui figuram, & descriptionem Stratorum Argillaceorum & Arenaceorum, quibus Solum Vallis Arni superioris constat, & ex quibus deducitur feracissimam illam Etruriae Provinciam, quae modo ab Arno, Riviisque in ipsum defluentibus mire corroditur ac devastatur, donum olim fuisse ipsius

ipſius Arni, quum ſaxeo ingenti obice apud Rinianum, & inferiori apud Inciſam ſtagnare cogeretur. *Io.* tandem *de Baillou* Eques excitavit plures, mirasque Fermentationes, permixtione variorum Liqueurum Chimi-
cae exquiſitionis ope eduſtorum.

Secundus publicus confeſſus habitus eſt d. VIII. Junii MDCCXXXV. in Muſaeo V. Cl. *Nicolai Gualterii*. *Micheliuſ* communicavit obſervata ſua varia circa nova Teſtaceorum Genera. Primum eſt *Crepidula*, Teſtacei Genus monotomum, non turbinatum, patellae-
forme, thalamo quodam inſtruſtum, quod deinde ab ipſo *Gualterio* deſcriptum fuit nomine *Patellae ſtruſtura peculiari donatae*, & repraeſentatum in *Indice Teſſarum Conchyliorum Muſaei ſui* Tab. 9. 69. H. Alterum, *Tubulus Vermicularis polythalamuſ* ab eodem *Gualt.* Deſcr. Tab. 10. LL. Tertium *Pholas polytoma Gualt.* Tab. 105. Quartum *Balanoides*, ſeu Balani vulgaris ſpecies fundo mobili. *Cocceiuſ* perlegit Hiſtorias morbi, & ſectio-
nis Cadaverum trium Inedia ab Oeſophago ocluſo mortuorum. In Femina quadragenaria, quae obiit die undecimo inediae, duae Piſciſ Salmonis ſaliti verte-
brae cavitatem Oeſophagi obturarant, & acutis proceſ-
ſibus ipſius tunicae firmiter adhaeſerant. In Femina alia, quae duodecimo inediae die occubuit, Glandulae Dorſales tumefactae partim ſcirrhoſae evaſerant, partim ſup-
puratae ulcuſ ſordidum fecerant, quod Oeſophagum & Aſperam Arteriam adhaerentem corroſit, & alimentis viam obſtruxit. In tertio tandem Aegrotto, qui decimo-
tertio Inediae die occubuit, Glandulae eadem Dorſales, ſimul cum Oeſophagi portione contigua prope quin-
tam Dorſi Vertebram ſuppuratae, cicatricem duram & calloſam efformarant, quae cavitatem Oeſophagi peni-
tus occluſerat. Omnes autem viribus gradatim immi-
nutis, pulſu minori & crebriori ſenſim facta, tandem
tenui & frigido ſudore erumpente, mente integra,
placi-

placidissime extincti sunt. Cadavera dissecta, praeter occlusiones Oesophagi, ostenderunt viscera omnia arida, ramificationes venarum elegantissimas, & argenteos muscularium fibrarum fasciculos, quemadmodum *Redius* in Brutis fame enectis observaverat. Postremo *Io. Genzilius* Med. D. communicavit Historiam Febrium Scatularum, quae Florentiae A. MDCCXXXIV. populariter grassatae fuerant; & observationes plures recensuit circa curationem Leucophlegmatiae, quae Febribus hisce succedere consueverat.

In tertio confesso ibidem habito d. XI. Aug. infrequentis, *Michelius* demonstravit Flores & Semina *Androsacis Marinae*, & *Calbam* in hoc Catalogo descriptam pag. 20. & 122.. Cl. *Cocchius* perlegit elegantissimam Dissertationem de *Vermibus Cucurbitinis*, qui rarius quam ceteri Vermes in Humanis Intestinis vivunt, & propterea a Scriptoribus Pathologicis non satis accurate examinati fuere. Pluribus rationibus evicit Vermes hosce, figura plerumque semina Cucurbitae aemulantes, quandoque contractos, globosos, vel incurvos, fere semper solitarios, & discretos, una extremitate (vel capite nempe, vel cauda) firmiter adhaerere tunicae Ventriculi, vel Intestinatorum, ea ferme ratione, quae *Hirudines* cuti (vel, si mavis, *Polypi minimi palustres*) variis

(95) Obiter adnotabo reperisse me duas horum *Polyporum* species, supra *Cusferum* in Rivo *Hurri* ostam, Mense Aprilis A. 1745. quarum una maiuscula, carnei coloris, altera minima, coloris elegantissimi smaragdini; ambae autem per Microscopium prorsus similes *Polypi* a D. *Bacher* descriptis apparere, duplici brachiorum corona circa os infunditae, quae Cochlearum oculos aemulanda, sed velocissima contractione aemulabantur. Ant. macula haec, aliaeque minuta in Aquis palustribus degentia, pluries, & multas fecit; sed nunquam tam felici mihi esse licuit, ut eorum membra dissecta viderem reviviscere, & in novum Animal integro simile evadere. His tantummodo mihi videntur vidisse ex ovulis abscisso Matris membro, seu fructu pe-

nitus mortui, & putrescenti adhaerentibus (utpote quae a vivente iam explosa fuerant, & mucro quo velluntur Matris cuti sese agglutinaverant, ut frequenter in Othracodermatis accidit) & semel ex ovo io lateriori parte mortui membri Matris clauso, erupisse nova Animalcula Matris similia, a cuius tamen membris adhuc dum mortuis, & putrescentibus diversa erat. Pari ratione ex ovulis in *Pulicis* occisae diffracto Alvo remanentibus, vermiculos, qui deinde in *Pulicem* mutantur, prodire vidi, & semina *Melorum Limosiarum*, & *Aurantiarum* in ipso fructu viventi & clauso germinant. Confer *Levrahechi* Epist. 2. & 6. ad Ant. *Magliabechium* a me editas in T. 1. *Epistolarum Clarorum Belgarum*, &c. pag. 349. & 359.

variis aquaticis Herbis) sese applicant; quemadmodum *Wefferus* in *Cannum* tantummodo, & *Redius* in *Feltum* Intestinis antea observant. Quotiescumque vero humor in Ventriculo, & Intestinis contentus, vel liquida in vasis tunicae ipsorum circulantia (ob Alimenti, vel Pharmaci alicuius miscelam) *Cucurbitinis* ingrata, vel noxia evaserint, putavit solere illos, vel escae salubrioris quaerendae, vel fuga se a molestia praeripiendi causa, aliis *Cucurbitinis* praelonga serie, seu catena coniungi, ut unus anteriori parte seu ore, posteriori seu caudae alterius firmiter adnectatur. Longissimas horum fugitivorum Vermium Catenas, quae peculiari nomine *Taeniae* nuncupantur, in quibusdam Aegrotis se observasse referunt varii Scriptores Medici: Duas autem praelongas ostendit *Cl. Cocchi*, partim in Spiritu Vini adservatas, partim supra chartam caeruleam arefactas, quas per eos dies Aegroti duo excreverant, simul cum variis *Cucurbitinis* solitariis, vel binis. *Taenia* una sesquialnalis, *Cucurbitinis* constabat fere CXX. maiusculis, & validioribus; altera minoribus & gracilioribus: utraque autem spectatoribus abunde monstravit *Taenias* nil aliud esse, quam Catenas plurimorum *Cucurbitinorum*, quemadmodum coniectura assequuti fuerant prisca aliquot Medici nostrates, *Thadaeus summus Physicus*, *Nicolaus Faluccius* cognomento *Florentinus*, ac *Antonius Benivenius*, & quemadmodum accuratis observationibus evieit *Cl. Vallisnerius*; non vero peculiare aliquod Lumbrici genus esse, ut perperam asseruit *Daniel Clericus*, deceptus a lacera portione corporis *Cucurbitini* unius, quam *Taeniae* universae caput esse credidit. Praeternaciem, quam corporibus in quibus hospitantur producunt *Cucurbitini* (ob meliorem Chyli partem subtraham) excitare plerumque solent Ventriculi spasmos, Cardialgiam, Globum Hysterico similem, Aphoniam, Stupiditatem, Lipothymiam, aliasque multiformes Ner-

vorum Affectiones. Has omnes oriri posse credidit *Cocchi* a vellicatione, & irritatione, quam Bestiolæ hæc in magno sæpe numero, excitant in Tunica nervosa Ventriculi, eiusque insignibus Nervis. Inter Remedia quum Tunicam Ventriculi obsident, commendavit portiones Vini meracioris, aut Spiritus Vini Aromatibus conditi; quia odor & contactus horum Liqueorum *Cucurbitinis* molestus, eos cogat e Ventriculo in Intestina præcipiti fuga secedere, & in Catenas, seu *Tænia*s coniungi; quod ipsis exitio est, quum facilius, & maiori in copia sub *Tæniæ*, quam solitariorum *Cucurbitinorum* forma excerni soleant. *I. D. Cuvinius* perlegit Historiam sectionis Cadaveris Feminae cuiusdam, in quo tumor pondo librarum XV. in Ovario sinistro repertus fuit, & ruptura Venæ Pulmonaris, causa immediata mortis. *Felicius* tandem exhibuit Spiritum e Saccharo eductum, coloris obscuri, sapore acri empyreumatico, & Chemicam quamdam Sacchari præparationem, quæ incensa tota in flammam caeruleam avolabat.

In quarto denique publico Confessu ibidem habito die VII. Septembris insequentis, *Michelius* obrulit ac descripsit *Aurantium*, *Pomum Adami dictum*; *Limonem* seu *Pomum Paradisi* *Ferr. Hesp.* 305. & *Citrcum Calyce longo, crassissimo, & quinquepartito* Catalogi huius H. Flor. 27. Lapides item duos Idiomorphos in Alpibus Saxi Simeonis repertos, ad Ferri venas reducendos, quorum unus Linguae Bovillae similis, alter granulis Lini seminum similibus compactus videtur. *Felicius* communicavit sectionem Anatomicam Cadaveris, in quo viscera situ contrario disposita erant; & *Gentilius* Observationes varias Medicas circa Molas. Ego tandem obtuli & descripsi *Silicem aculeatum Mercati Metalloth. Vatic.* 270. Cornua item Cervorum, Dentes ignotorum Animalium, & Offa Elephantum petrefacta, quæ repereram in Valle Arni superiori, & per se satis ostendunt multo antiquiora

quiora Annibalis aetate esse, tum ratione profunditatis Stratorum Argillaceorum e quibus erui; tum etiam ob varias aetates, & diversam amplitudinem Ossium ipsorum, quae Maximos Elephantos, seu Indicos, & Minores, seu Numidicos, plurium saeculorum spatio in his locis vixisse demonstrant.

Quamvis Societas Philosophicis hisce Exercitationibus potissimum sese devoverit, non tamen Hortum derelictum habuit; quinimmo ipsius splendorem & culturam provexit. Propterea *Michelius* tria Itinera peregit; primum A. MDCCXXXIV. a die XVII. ad XXIII. Iulii per Vallem Arni Inferiorem, & Umbronis, ac per Alpes Pistorienfes: in Deser. Obs. Pl. N. CLII. Alterum Autumno eiusdem Anni per Agrum Bononiensem & Ravennatem, Oram Maritimam Piceni, & Alpes Cantiani. Tertium A. MDCCXXXV. a die X. ad XXI. Iunii per Oram maritimam Pisanam ac Liburnensem, & Montes Pisanos: In Deser. Obs. Pl. N. CVII.

Felicibus interim Societatis inceptis, & *Capponii* Praefidis conatibus averfus afflavit ventus, adeo ut vela statim contrahere necesse fuerit. *Capponius* propterea sponte abdicavit d. XXV. Sept. MDCCXXXV., eique successus fuit *Antonius* e Marchionibus *Niccoliniis*, qui cunctando rem restituere annisus est. Plantas igitur, quae in Horto tunc temporis colebantur servare studuit; & *Michelio* iniunxit ut ipsarum Catalogum conficeret typis edendum. Operi manus statim admovit *Michelius* & A. MDCCXXXVI. Catalogum conscripsit, quem modo publici iuris facimus. Continet hic, ut verum fatear, vix decimam partem Plantarum, quae ab eo tempore, quo Magni Duces Horti curam Societati Botanicae commiserunt, cultae inibi fuere, a *Michelio* assidue peregrinationibus, vel permutatione cum Amicis Botanicis congestae; reliquae enim omnes ob Hortulanorum socordiam, vel ob propriae sedis, culturaeque

§

defe-

defectum perierant. Ingentem hanc tamen iacturam aliquatenus compensavit *Michelius* accurata ipsarum Plantarum descriptione in reliquis Operibus Postumis exhibita. Magna sane vis frigorum Plantas plures Orientales & Maritimas, & maximi Aestivi Calores Alpinas enecant quotannis in Horto nostro Hypocaustis, & Vaporariis, Umbraculis pariter, & crebris Hydrophylaciiis nondum instructo. Annua haec Horti detrimenta refarcire consueverat Societas frequentibus *Michelianis* Excursionibus; fecitque pariter A. MDCCXXXVI. sumptibus partim suis, partim Academiae Pisanae, & *Michelum* a d. IV. Sept. ad XXX. Nov. peregrinatum misit per Agrum Bononiensem, Ferrariensem, Patavinum, Veronensem, Montem Baldum, & Veneras Insulas. Amplissimam inde messem retulit *Michelius*, & non Hortos tantum Pisani, & Florentinum, sed & Opera sua Postuma mirifice locupletavit. Verum non ipsi solum *Michelio*, sed & Orbi quoque Erudito fatale fuit hoc Irer, tempestate nimis varia & frigidiuscula, ingenti velocitate, ac immenso labore peractum; utpote quod viam stravir dirae Pleuropneumoniae, qua magno Amicorum luctu occubuit d. II. Ianuar. MDCCXXXVII. St. Com.

Gravissimam sane iacturam passa est Societas Botanica praecipuo Parente orbara; & ut aliqua ex parte conceptum dolorem mitigaret, tanti Viri memoriam, Funebri Laudatione consecrandam esse decrevit. Id oneris libentissime suscepit Cl. *Cocchi*, & Amici merita laudesque pro dignitate prosequutus est Oratione, quam habuit die VII. Aug. MDCCXXXVII. coram letissimum Civium Exterorumque Concessu; quamque postea Typis evulgavit (96).

Michel-

(96) Elvira di Pietro Antonio Micheli Botanico dell' A. R. dal Serenissimo Granduca di Toscana, e Fondatore della Società Botanica Fiorentina, letto pubblicamente nella Sala del Consiglio di Palazzo Vecchio il

di 7. Agosto 1737. da Antonio Cocchi Medico fiorentino, e fouda. Presidente della medesima Società l' Illustrissimo Signor Abate Marchese Antonio Niccolini. In Firenze 1737. in quarto.

Michelio in Horti Custodia Societas benigne subrogavit d. VII. Ianuar. MDCCXXXVII. me longo proximum intervallo, voluitque inter cetera, ut *Catalogum* hunc *Michelianum* ad editionem pararem. Non multum sane promovere potui Horti nitorem, minantibus adhuc adversis Societatis temporibus. Plantas solummodo quas inibi cultas repereram, magna cura servare annisum, & plurium Exoticarum accessione ipsas supplere, quarum semina variis temporibus obtinui a Viris Cl. Io. Bapt. Lib. Barone de Baffand. S. C. M. Archiatro, & Botanico Eximio; Io. Jac. Dillenio Rei Herb. Prof. P. Oxoniensi; Io. Ammanno Prof. Petropolitano; Iulio Pontedera Prof. Patavino; Angelo Attilio Tillio Prof. Pisano; & Petro Collinson Philobotano Londinensi. Spatium praeterea tertium, quartum, & sextum, quae squallebant camporum in morem (quemadmodum in Tabula Horti Ichnographica in aes tunc temporis incisa apparet D. E. G.) in Areolas parallelogrammas distinxī, Buxis circumscriptas, aliorum ad instar, quae ibidem sub B. C. repraesentantur. Tandem quotannis Vere, & Aestate Plantas Officinales Studiofis demonstravi, & varia observata adnotavi, quibus *Catalogum Michelianum* Appendice supplere possem.

Illuxit tandem faustissimus Societati dies VI. Iul. MDCCXXXIX. quo FRANCISCI Caesaris Invidissimī Paternus in Optimas quasque Disciplinas Animus, Gratiissimū Diplomate Societatem Botanicam ab interitu quodadmodo vindicavit, & Augusta Munificentia erexit. Clementissimo siquidem Patrocinio eam nobilitare dignatus est; Horti huius Caesarei curam, annuadote CCC. Aureorum, ipsi commisit; & praeclarum munus demandavit conscribendae Historiae Naturalis Etruriae suae.

Tantis itaque Auspiciis recreata Societas, alacrius in Horti sibi commissi curam incubuit, & ut Plantas su-

terioribus Annis deperditas suppleret, mihi iniunxit Autumno A. MDCCXLII. ut Etruriam Maritimam perlustrarem, & non tantum Plantas in Horti usum perquirerem; sed & in commentaria referrem quaecumque ad illustrandam Naturalem Etruriae Historiam opportuna obiter observare contigisset. Accesserunt Benigna Iussa Viri Amplissimi Nobilissimique *Emmanuelis* Comit^{is} *de Richcourt* S. C. M. a Sandioribus & Etrusci Regiminis Consiliis, Regionum Vccligalium Praefidis &c., qui me voluit una eademque opera investigare, atque examinare plurima & varia Metalla, quae in illis Regionibus Medio Aevo effodiebantur. Duorum itaque Mensium spatio, qua maiore potui diligentia, peragravi universas fere Provincias Pisanam, Liburnensem, Volaterranam, & Massae Vaternensis. Pari consilio perlustravi Mense Octobri Anni insequentis Alpes Bargeses, Lucenses, & Apuanas, ac Provinciam Petrasanctanam, non Plantis tantum, sed & Metallis, ac Lapidicinis celebratissimis refertam. Mense tandem Martio A. MDCCXLV. a superius laudato Patrono meo Summo D. Comite *de Richcourt* iussus sum inviscere, & accurate examinare Aluminis Fodinas quae in Agro Montisrotundi prope Massam Vaternensem paulo pridem reclusae fuerant. Tribus hisce Peregrinationibus non tantum Plantas plurimas in Hortum intuli; sed & innumera ferme Physica Cimelia mecum reportavi. Ut autem pro virili symbolam ad illustrandam Etruriae Naturalem Historiam conferrem; praeter Descriptiones, & observata circa usum Metallorum, conscripsi Hodoeporica, Physica, Medicis, Antiquariis, & Historicis observationibus referta, & olim fortasse edenda, quorum ideam exhibui in Praefatione ad Tomum II. *Epistolarum Clarorum Belgarum ad Antonium Magliabechium nonnullosque alios* (97),

Ac3-

Academicas Exercitationes quod adinet; d. XXXI. Aug. A. MDCCXL. *Ioseph M. Xaverius Bertinus* Med. D. in Confessu Societatis perlegit Historiam sectionis Cadaveris *Francisci Marchionis Puccii*, cuius epitome, edita deinde fuit in *Novis Litterariis Florentinis* (98); in alio autem Publico frequentissimo Confessu habito d. . . Sept. MDCCXLIV. in Schola Magna Lycaeii Florentini, perlegit elegantissimam Dissertationem de *Hydrargyri usu in Medicina*, quam deinde Typis evulgavit (99). Tandem *Io. Dom. Civinini* Med. D. Aestate Anni insequentis, in alio Confessu recitavit Historiam sectionis Cadaveris Feminae cuiusdam, in quo tumor insignis cerebri-formis in Ovario dextro repertus fuerat.

A. MDCCXLV. novae Leges sancitae fuere, in quas iuratur Socii; & *Antonio Niccolinio* Praefidi, qui sponte abdicavit, successus fuit *Io. Gualbertus Franceschini* Patr. Flor.

Studioforum interea commoditati ego inserviens; & Horti nitori, ac utilitati prospiciens, Plantas universas humi confitas in Arcolis sex Spatiorum B. C. D. E. F. G. iuxta Tournesfortianarum Classium seriem distribuere orsus sum, methodo in Horti descriptione inferius adnotanda; opportunis locis *Hippocastanos*, & *Aceres Platanoides* interferens, ut Plantis subiectis, & exilioribus, Solis ardores melius defenderent. Bibliothecae demum Pub. Magliabechianae Praefectura, & crescentes quotidie Clinicae occupationes ocium mihi ad accuratam, assiduamque Horti Custodiam ademerunt, & Botanicis Peregrinationibus vacare amplius non permiserunt, pedem Urbe efferre prohibentes. Accesserunt aliae quaedam causae, quae a suscepto munere abstinendum mihi esse monuere; quapropter honestam missionem a Societate postulavi Aestate.

A.

(98) Fog. 38. de 16. Sett. 1740.

(99) Dell' uso esterno, e interno del Mercurio: . ||

Disserto di Giuseppe Maria Xaverio Bertini Fiorentino. In Firenze 1744. in quarto.

A. MDCCXLV., & vix Maio insequenti obtinui, meum in locum suffecto *Xaverio Ferdinando Manettio* Med. D., qui Autumno A. MDCCXLV. Boranicum Iter egerat per Provinciam Mugellanam, & aliud egit Autumno insequentis Anni per Alpes Vallisumbrosae, Camalduli, Alverniae, Montis Acuti, perque Provincias Perusinam, Cortonensem, & Arretinam; tandem A. MDCCXLVII. *Catalogum* edidit *Seminum Plantarum* quatumdam *Horti huius, cum exteris Botanicae Cultoribus commutandorum* (100).

Ut finem huic nimis fortasse longae Historiae imponam, subiungenda est brevis descriptio Horti ipsius, quam illustrabit adnexa Tabula Ichnographica; Scenographia item, Horti universi, expressa (non tamen satis feliciter) in fronte Praefationis huius; & Scenographia Insulae in centro Horti sitae, conspicua in fronte Catalogi Micheliani.

Universa igitur Horti planities, figurae ferme quadratae, in octo Spatia dividitur, & octogonam amplamque in medio Insulam A. habet Piscina pariter octogona circumscriptam, & proceris Platanis, Cupressisque obumbratam. Amoenissima Ambulacra pressis tonsisque *Buxis*, & Ficilibus *Mala Limonia*, *Aurantia*, aliaque Exotica Arbuscula substinentibus ornata; Pergulae, item *Laurocerasis*, *Myrtis*, aliisque perpetua fronde vi-
rentibus Plantis contextae Spatia distinguunt. Spatium quodlibet in Areolas plures dividitur plerumque parallelogrammas, margine lapideo, vel *Buxis* circumscriptas, & intervallis, seu semitis distinctas. In marginis fronte insculptus est numerus, quo Arcola ipsa a ceteris eiusdem Spatii differt: singulae vero Areolae octo plerumque diversis Plantis constatae sunt, peculiari numero

(100) *Catalogus Plantarum huiusmodi Horti Academiae Physico-Botanicae Florentinae, quarum semina hoc Anno 1747. ad publicam utilitatem collecta, exteris Botanicae Cultoribus in commercium exponuntur.*

100, ut totidem vocis, ac exoticis permixtae, a *Xaverio Manettio Medicino, & Botanico Professore, eiusdemque Horti Curatore.* In l. expanso.

mero margini inculpro indicatis. Ipsa inter se Spatia situ distinguuntur; Primum scilicet Occidentale inferius *B.* Plantis constitum Classis Tournefortianae I. II. & III. Secundum Occidentale superius *C.* Plantis Cl. IV. V. & parim VI. ornatum: Tertium Boreale dextrum *D.* Plantis Cl. VI. reliquis, & Cl. VII. constitum: Quartum Boreale sinistrum *E.* Plantis Cl. VIII. IX. X., & XI. destinatum: Quintum Orientale superius *F.* Plantis Cl. XII. XIII. & XIV. replendum; Sextum Orientale inferius *G.* Plantas Cl. XV. XVI & Graminifolias, eorumque affines expectat: Tandem Septimum Meridionale dextrum *H.* & Octavum meridionale sinistrum *I.* Arboribus & Fruticibus in quincuncem dispositis constituta sunt, Quatuor Horti Anguli Silvulas (7) *Ilicibus*, *Lauris*, similibusque Arboribus constantes, & Plantis Alpinis, Frigidarumque Regionum propriis destinatas habent. Horti Parietes *Malis Aurantiis*, *Citreis*, *Limoniis*, aliisque Pomiferis Plantis; scandentibus item, ac praesertim *Vite quinquifolia Canadensi*, *Periplocis*, & *Clematitibus* variis vestiuntur. Iuxta Occidentalem Parietem fluit largus ac perennis Aquae Rivus (4) a Mynione deductus, qui Piscinam uberi proventu supplet, & Plantis irrigandis inservit. In interiori & exteriori Piscinae margine, quemadmodum & in subfelliis secus Rivum (4) & Borealem Parietem (5) ad MCC. Vasa Fictilia digesta sunt peculiaribus numeris notata, variisque Plantis constituta, praeter alia plurima & maiora secus Ambulacra, perque Insulae solum sparsa. Tandem in Insulae, totiusque Horti centro *A.* Fons est perennis, quem circum Plantae plures Palustres in Fictilibus non perforatis dispositae sunt. Numerus 1. Maiorem, N. 3. minorem Horti Portam indicat; 2. Custodis domicilium, 8. Seminarium, quod olim *Malis Citriis* constitum erat. In extremitate Ambulacri 5. situm est Hibernaculum, nimis amplum, adeoque non satis tepidum.

Iis

Iis praemissis, quae ad Horti historiam pertinent, aliqua modo subnectenda sunt ad Michelianum hunc Librum spectantia. Prima eius pars, Catalogus scilicet Plantarum quae in hoc Horto colebantur A. MDCCXXXVI a *Michelio* conscriptus, iam ab A. MDCCXXXIX. typis expressa iacet. En vobis, Rei Herbariae Studiosi, unam e magno Naufragio Tabulam, en Vobis, opusculum quod Cl. Auditor praepropera heu! nimis morte interceptus absolvere non potuit. Quum enim quotidie immensis, & maioris momenti Operibus insudaret, ut Publico prodesse quae privatus invenerat, & ut fidem Orbi Litterario datam perfolveret, in Aestatem insequentem distulerat observationes plurimas, sine quibus Catalogus hicce perfici non poterat. Hoc Vos scire oportuit, ut aequius iudicium ferre possitis de Viro Optimo, cui Urbs nostra, & Resp. Litteraria universa plurimum debent.

Hoc Ego Opusculum ad editionem parare iussus a Societate Botanica, perpaucis tunc Libris instructus, & Clinicae Studiis, ac Bibliothecae Magliabechianae cura distractus, operam omnem impendi, ut minus squallens, minusque incomptum in publicum prodiret. Subsecivis itaque horis lacunas plures, quibus antigraphon scatebat, complere conatus sum, institutis, continuatisque iisdem observationibus, quas memineram Immortalem *Michelum* sibi perproposuisse perficiendas. Nomina item CL. circiter ex iis Plantis, quibus in ultimo suo Itinere per Veneram potissimum Ditionem instituto collectis Hortum diraverat idem Praeceptor meus Amantissimus, suis locis subinde interservi; ac nonnullas rariores Plantas descripsi, & in aes incidi curavi. Commodis denique Tyronum inserviens, adieci nomina in Officinis Pharmaceuticis, & apud Vulgus usitatiora. Consului potissimum Opus Botanicum Celebris *Caesalpini*, qui Etruscas Plantas in natali sede a se

se observatas graphice describit, multa ad Philologiam & Medicinam pertinentia eleganter discurit; Plantas a *Dioscoride*, ceterisque Veteribus Botanicis memoratas illustrat; tandem nomina in Officinis nostris adhuc dum trita subnectit. *Antidotarium Florentinum*, & *Petri Andreae Matthioli Commentaria in Dioscoridem* Edit. Italic. Valgrif. in f. cum magnis figuris, quae Pharmacopoeorum nostrorum manibus teruntur, evolvenda mihi necessario fuere, ut suis Plantis manca illa, & vaga nomina adiungerem.

Haec autem nomina (lubens faveo) fortasse non omnino propria nonnullis Plantis erunt, in quibus praefertim minutas, at constantes, & aeternas differentias *Michelius*, ea qua praeditus erat oculorum acie, observavit. Huic incommodo mederi non poterimus, nisi quando, magno Reip. Litterariae emolumento, edita sint reliqua Micheliana Opera Postuma, in quibus Vir ille Eximius, inter cetera, Plantas a *Casalpino*, & reliquis Italis Botanicis descriptas illustrare conatus est, diuturna observatione, & sedula natalis loci inspectione. Interim frui tuto potestis hoc qualicumque labore in eum tantum finem a me suscepto, ut Plantas indicarem, quarum frequentior est, aut esse potest usus in Medicina: Repetita siquidem observatione compertum est minutas hasce, & technicas differentias, parum aut nihil mutare vires Medicas, quae plerumque aequales sunt in omnibus fere Speciebus Generis alicuius Plantarum.

Reliqua Officinalia, & Communia nomina, ex variis Scriptoribus decerpta, si cui minus congrua videantur, & pluribus toto genere diversis Plantis communia, is non fidem, diligentiamque meam repraehendat, sed potius Scriptorum incuriam, qui secundum minus, & minus constantem Naturam existimantes, non adeo solliciti fuere in exacta Plantarum ab ipsis obser-

vatarum descriptione conficienda, insignes quasdam differentias culturae varietati, & Naturae oscitantiae tribuentes. Altera, & potissima ratio est, quod iis temporibus, quibus reviviscere Bonae Artes coeperunt, Clarissimi Rei Medicæ & Herbariæ Scriptores in eo potissimum insudarunt, ut Plantas circiter septingentas ab *Hippocrate*, *Theophrasto*, *Galeno*, *Dioscoride*, *Plinio*, ceterisque veteribus Botanicis nomine plerumque tenus descripras, seu potius adumbratas, pervestigarent, hasque se reperire posse putarent in ipsa Europa, & eius præsertim regionibus, quæ nullam solis, vel Coeli temperiei similitudinem habent cum locis, in quibus præci Materiae Medicæ Descriptores Medicinam fecerunt, vel peregrinari sunt. Quam recte ex voto res hæc illis cesserit, ignorare non potest quicumque Celebriorum Botanicorum, qui Sæc. XV. XVI. & XVII. inclauere, scripta pervolverit. Hinc acres illæ, & ingloriæ disceptationes magno Medicinæ detrimento subortæ sunt, singulis toto Cælo diversas Plantas pingentibus, & singulis illas quas pingunt, veras, genuinas, & legitimas *Dioscoridis* ostentantibus. Tertiam, & potissimam ambiguitatis huius causam esse puto, quod Veteres illi Scriptores in censum familiamque Vocabulorum Medicorum assumpserunt vaga quædam, & absurda nomina ab imperitis Agriculis, Mulierculisque superstitiosis temere imposita.

Fateor quidem in his congerendis aprandisque, molestissimi laboris pætaesum fuisse me, præsertim aliis curis distractum; propositum tamen urgere placuit eo potissimum nomine, ut ostenderem Rei Medicæ Candidatis, quantopere necessarium sit Plantas nominibus technicis, propriisque addiscere, & æquivoca illa atque absurda nomina, maiore Generis Humani commodo, oblivioni tradere. Verum Cl. Præceptoris Scripta interpolare, & pannum purpuræ adsuere religio mihi

mihî fuit; quapropter ea quae ipse adieci asterisco distinguenda curavi.

Unum adhuc monendi supersunt Aequi Lectores, quod nempe si videant *Michelium* in conficiendo Catalogo hoc, exactissimas Clarorum Botanicorum recentiorum, *Vaillantii* praesertim, *Boerhavii*, ac *Dillenii* observationes sequutum, in nonnullis Plantis describendis a novis eorundem Methodis discessisse, & vetustiora *Tournefortii* nomina usurpasse, id non *Michelii* inconstantia quadam admissum putent, vel quod ipse parvi fecerit labores Doctissimorum Virorum, quibus plurimum se debere lubens fatebatur; sed potius propter studii tribuant, ac spei cuidam ultimae manus operi admovendae. Ego autem de iis variandis non adeo sollicitus fui, tum ut quam minima mutatio in antigrapho fieret; tum etiam quia non plane tunc memineram, an aliquid super his peculiariter observasset ac adnotasset *Michelius* in reliquis suis Operibus, in quibus characteres etiam Novorum quorundam Generum Plantarum in hoc Catalogo subinde constitutorum graphice descripserat; quemadmodum in *Appendice* fufus adnotavi.

Quum interea A. MDCCXXXIX. *Michelii* universam Physicam supellestem, Bibliothecam, & Manuscripta coëmerim, ac evolvere inceperim, facile animadverti Catalogum hunc *Michelianum*, typis paulo pridem descriptum, mendis nonnullis scaterere, veritusque sum ne macie sua Lectioribus parum sese commendaret, & Auditore suo minus dignum videretur. Quapropter recensendum, & rursus ad incudem revocandum ratus, *Appendicem* ei attexere constitui A. MDCCXL., qua vulnuscula sanarem, & inopiam supplerem; & qua, fateor, sperabam posse me specimen aliquod dare profectus, quem habueram in Rei Herbariae studiis *Michelio* duce per octo Annos excultis. Obstitit tamen votis

meis dira Arni Inundatio, quae Florentiae contigit d. III. Decemb. eiusdem Anni, & Bibliothecam meam misere vastavit, quemadmodum in Dissertatiuncula de *Ephemervis* ⁽¹⁰¹⁾ narraui: corruptit siquidem Sceletra varia Plantarum accuratius examinanda, & Schedas plurimas, in quibus Vere & Aestate praegressa, assiduo labore, adnotaveram nomina, descriptiones, & analyses microscopicas aliarum Plantarum. Accesserunt plures aliae causae, quibus *Appendicis* editionem ad hunc usque diem differre coactus sum, & quas fufius exposui in Praefationibus ad Tom. I. & II. *Epistolarum Clarorum Belgarum ad Magliabecium nonnullosque alios* ⁽¹⁰²⁾ ut Crambem recoquere opus non sit. Utrum vero officio & proposito meo fecerim satis, iudicium esto penes Benevolos Lectores, quos ut ausus meos aequi bonique faciant etiam atque etiam rogatos velim.



(101) Lettera di Giovanni Targioni Mediceo del Collegio di Firenze, e Professore Pubblico di Botanica, all' Illustrissimo Sig. Duomo Gio. Batista de' Bassani Archiatro dell' Altezze Reale del Serenissimo Francesco III. Duca di Lorena e Bar. Granduca di Toscana, Re di Gerusalemme &c. &c. sopra uno

numerossimo Specie di Vasefale vedute in Firenze sulla metà di Luglio 1741. In Firenze 1741. nella nuova Stamperia di Gio. Batista Brustagli e Compagni. 104.
(102) Prodigium Florentiae A. 1745. ex Typographio Io. Bapt. Zanopoli ad insignes Apollinis in 8.

D I S C O R S O
DI ANTONIO COCCHI
MUGELLANO

SOPRA L'ISTORIA NATURALE

LETTO DA LUI PUBLICAMENTE IN FIRENZE
IN OCCASIONE DEL RISTABILIMENTO

DELLA
SOCIETÀ BOTANICA FIORENTINA
IL DI' II. DI SETTEMBRE MDCCXXXIV.



*OBILE ed antica questione fu
sempremai ed è tuttavia tra' fi-
losofi, se l'uomo per la sola
sua naturale inclinazione sia
portato a bramare la compa-
gnia degli altri uomini, ovvero
se solamente di se medesimo in-
namorato ed altrui invidioso e*

*molesto goda della solitudine e della contenzione e della rapina.
Io confesso che essendo avvezzo a sciogliere i dubbi che mi si
presentano colla sperimentale osservazione, mi sento costretto
a riconoscere nel cuore umano un certo senso di benevolenza
dal quale dipende il diletto che noi veggiamo che la maggior
parte ha nel giovare altrui, ove il proprio interesse non s'in-
ter-*

terponga. Dal vigore e dalla delicatezza del qual senso interno di spontanea benevolenza par che misurare si debbano e non d'altronde i piccoli ed i grandi eroi.

Un illustre argomento di questa natural forza che senz'altro motivo conduce l'uomo a procurare il bene di molti da lui nemmen conosciuti, e la cui gratitudine ei non ispera talora, sicuramente può trarre il mondo da quest'istessa vostra adunanza, poichè non per altro avete voi voluto celebrare con essa questo giorno ed a me comandato avete che da questo augusto luogo io parli, se non per render palese a tutti l'eroica intenzione vostra di formare una Società filosofica per ampliare ed accrescere e spargere quanto si possano comunemente le più recondite verità delle scienze che an per oggetto la contemplazione dell'eternie immutabili leggi della natura. E poichè questo nobil pensiero nato in voi dal solo natural genio benefico può aver molte utilissime conseguenze e per voi medesimi e per tutta la città nostra, non dee parere inopportuno il considerarle ora alquanto, non solo acciocchè voi dagli stimoli della prudenza incitati con maggiore alacrità conduciate a fine una sì nobile impresa, ma acciocchè esponiate alla riflessione d'ognuno l'importanza, più facilmente da voi s'otenga la comune approvazione, la quale suol essere più d'ogni altro premio bramata dall'anime grandi.

Per ben comprendere quanta influenza aver possa nella publica felicità questa vostra generosa risoluzione, pare necessario primieramente il riflettere che gli uomini colla sola natural forza della loro mente non sono abili a far lor-pro od a fuggir lor danno, senza l'aiuto de' materiali strumenti non solo del corpo loro, ma degl'innumerabili altri corpi che gli circondano. Le potenze poi e le operazioni dell'uno sopra l'altro di tutti questi corpi ubbidiscono con maravigliosa costanza ed esattezza alle medesime leggi sempre invariabili, le quali perciò an dovuto gli uomini con diligentissimo esame intraprendere ad indagare. Ed essendo i sensi nostri deboli ed
ottusi

artusi e la composizione della materia infinitamente varia, è stato necessario il raccogliere istoricamente le osservazioni e le scoperte particolari sopra ciascun differente genere di corpi, onde resulta l'esperienza, sulla quale tutte l'arti nostre sono fondate.

Dalla molteplicità e dall'eccellenza delle quali arti dipendono principalmente i comodi tutti e le delizie della vita, e quella beatitudine di cui l'uomo s'osserva esser tanto bramoso, e che consiste nella facoltà di esequire buona parte delle sue voglie. Onde è manifesto che le naturali e scientifiche ricerche le quali discoprono le necessarie affezioni della materia e le forze di ciaschedun corpo contribuiscono più di tutti gli studi all'umana felicità, e che moltissime e pubbliche e private sventure non d'altronde bene spesso an potuto aver origine che dall'ignoranza di qualche fisica verità. E siccome le combinazioni delle cose sono infinite alcuna verità naturale peravventura non vi è cotanto minuta e particolare che d'innumerabili prodigiose conseguenze non possa esser seconda.

Chi mai per esempio creduto avrebbe che il non osservare una per altro facilissima a conoscersi semplice e costante proprietà d'una pietra che in moltissimi luoghi si truova comunemente, e di cui alcune altre forze più potenti erano state con diligenza grande scoperte e celebrate dovesse privare gli antichi del commercio colle più remote nazioni e della sperimentale cognizione della grandezza e figura e parti ed abitanti della terra, onde i loro scritti ripieni sono di tante false e ridicole relazioni ed ipotesi favolose? Ognun s'accorge che io intendo di quella insigne efficacia della calamita, per cui ella dimostra il settentrione e'l mezzogiorno, e che essendo stata felicemente osservata da' moderni diè loro l'ardire di metterfi per l'ampio mare aperto ond'ei poterono al più remoto termine dell'Africa navigando intorno riconoscere i lidi orientali dell'Asia di così dubbia fama, e dirigendo a ponente il lor corso poterono ritrovare le affatto ignote terre d'America. Le
confe-

conseguenze delle quali navigazioni come ancora di quelle ai lidi settentrionali dell' istessa nostra Europa che prima erano cotanto oscuri voi ben le sapete, e forse non passa giorno che qualche godimento o ne' cibi o nelle vesti o nella varia suppellettile non ne sentiate.

Perniciosa sembra essere stata in ogni tempo al genere umano la guerra, ma pure chi ha bisogno di difendersi con essa, di vincere e d'espugnare, e d'acquistarsi con sì efficace mezzo la pace, non potrà non riconoscere l'immenso vantaggio che all' arte militare ha prodotto l'uso di quella polvere di potentissima esplosione che quel Tedesco contemplativo come dicono vi applicò il primo, e non potrà s'io non m'inganno senza qualche maraviglia riflettere come una così importante invenzione aver potesse origine da una particolare esperienza che due secoli avanti innocentemente e per suo diletto fece sopra le facoltà del nitro il sommo naturalista de' secoli barbari il Francescano Bacone, imitando col' accendere quella sua nota mescolanza nell'aria aperta l'effetto del tuono e del fulmine.

E chi può mai ridire tutte l'utilità di quell' unica e bellissima osservazione del moto circolare del sangue negli animali? Del qual moto qualche confusa idea sembra che avessero ed Empedocle ed Ippocrate, come si vede in quell' insigne frammento che del filosofico poema del primo ci ha conservato Aristotele, ed incontrandosene alcuni indizi negli scritti del secondo. E benchè molto più chiaramente l'indovinarono in parte servendosi più che d'altro del loro ingegno e Michele Villanovano, e il Colombo, e il Cesalpino, tutti però inutilmente ne parlarono finchè non ne diede al mondo intera sicurezzza l'Harveo servendosi delle sezioni de' cadaveri e de' vivi animali, e dell' osservazioni degl' insetti col microscopio, e portandosi in quel suo ingegnoso libro da sagace ed accuratissimo naturalista. La quale scoperta ha tra gli altri quel sì grand' effetto prodotto ch' ella ci ha costituiti abili a distinguere tutto ciò che

che di buono e di vero si ritruova nelle memorie di ben due-
mil'anni sopra la medicina dal molto falso e fantaslico che in-
sieme vi fu mescolato. Onde al presente rigettando tutto ciò
che ne' libri degli antichi risguarda la spiegazione de' feno-
meni del corpo umano, che per mancanza di quella sola noti-
zia totalmente è fallace, possono i dotti e savi medici ritrarre
ed usare le istoriche osservazioni sul corso de' mali e sugli ef-
fetti de' rimedi delle quali osservazioni moltissime pur ci sono
state fin da' secoli più remoti da quei buoni e valenti nomi-
ni trasmesse.

Degna altresì di somma lode fu la diligenza usata prin-
cipalmente dal nostro Redi sulla generazione degl' insetti la
quale ha spogliato il mondo di quella ridicola e vanissima
opinione, che i corpi organici dell' innumerabili razze di quelli
animali tanto più maravigliosi quanto più son minuti non se-
guistassero come gli altri le loro specie, ma che da poca e ina-
nimata materia senza veruna costante legge con istrana mu-
tazione si formassero, e da un non inteso moto che putredine
chiamavano vita prendessero. Opinione che oltre all' essere
assurda teneva ognuno nel continuo dispiacere di credere im-
possibile il difendere o i cibi o le vesti od altre cose fatte in
uman uso dall' invasione di quelle minutissime bestie immaginate
di spontaneo nascimento, e i medici fanno di quanti altri er-
rori nell' esercizio della lor arte ell' era cagione. E tanto era
difficile il non lasciarsi preoccupare o per semplicità o per
inavvertenza da questa allor comune credenza ch' io non so che
alcuno anco eccellente filosofo fuori di Pitagora s' accorgesse
mai della sua falsità, onde non senza compassione s' osserva che
non ne furono esenti nemmen l' Harveo ne il Galileo che fur-
del mondo sì gran maliscalchi.

Uopo non è ch' io parli di quell' altra pur singolare os-
servazion naturale che nobilita molto la nostra patria ov' ella
per la prima volta fu fatta, io intendo la scoperta della
gravità dell' aria, poichè tali ne sono state le conseguenze,

che per mezzo di essa anno gli uomini appresa l'arte non solamente a' intendere ma in molti casi ancora di regolare i moti occulti che si fanno dentro la nostra atmosfera. Che se all' utilità d' alcune poche sciolte e nuove cognizioni s'aggiunga quella che producono le diverse serie di esse innumerabili e coll' esperienza di più secoli stabilite onde resultano le varie parti della fisica, voi ben vedete che nulla forse può tanto meritare la pubblica gratitudine quanto il promuovere e coltivare le scienze naturali. Il che facendosi vengono per necessità a vendersi comuni le matematiche, la meccanica, l'astronomia, l'istoria naturale, l'anatomia, e la chimica, e molti altri bellissimi studi, nella non curanza de' quali principalmente consiste la barbarie delle nazioni.

Ed al contrario ove i lumi di queste scienze discendono fino agli artisti, quivi necessario è che si trovi l'abbondanza la magnificenza e l'eraudito lusso e che vi si cercino le ricchezze di tutti gli altri beni produttivi. Io parlo de' maestri principali dell'arti più ingegnose, non della servil condizione de' subalterni ed infimi operarii, i quali dovendo sempre ciecamente altrui ubbidire, la stupidità e l'ignoranza, come os servò leggiadramente Omero, è a loro dono di Giove.

Ma se all' eccellenza di tutte l'arti contribuiscono principalmente le cognizioni naturali, come ne ha mostrato l'esperienza in questi ultimi secoli, la medicina che tralle arti tiene senza contrasto il primo luogo, deve onninamente a questa sorta di studi quella chiarissima luce nella quale ella si trova al presente collocata, nulla volendo in contrario l'esempio di quei che pur medici sono e che tutto giorno introducono nel sangue de' miseri mortali tante straniissime materie, non solo senza sapere quali mutazioni elle debbano soffrire ed a quali termini pervenire nel lungo e da lor non interso viaggio de' canali del corpo umano, ma senza averle nemmeno mai vedute ne lessane la minima descrizione negli storici naturali, non che indagare la natura colle proprie ricerche.

Quan-

Quando poi oltre agli artefici e a' medici le naturali notizie pervengono, come non è impossibile, fino alle menti de' grandi, a' quali la fortuna suol porre in mano il governo de' popoli, è manifesto che ei fanno allora molto meglio giudicare della publica felicità ed opulenza, e stabilire i mezzi di mantener l'erario e il commercio, e possono per se medesimi più comodamente fare le prudenti osservazioni ne' loro viaggi, e dirigere con maggiore applauso la loro magnificenza, difendendosi così dalla sazietà e dalla noia, per mezzo della rara e sommamente stimabile arte del godere. Nè fincero godimento alcuno par che esser vi possa per chi è privo del bene dell'intelletto, cioè della facoltà di conoscere il vero.

E perchè la verità e l'assurdità di qualunque cosa proposta si conosce dalla coerenza o contraddizione colle precedenti certe e sicure notizie, nè nulla vi è di più certo tra gli uomini dell'esperienza, è manifesto che è più idoneo a discoprire le fallacie altrui e perciò meno soggetto all'inganno e all'errore chiunque di maggior numero di sperimentali verità è fornito, e questi se ben si considera altri esser non può che l'ingegnoso naturalista. Quindi è, che in quelle nazioni ov'è più scarsa e più negletta la natural sapienza, quivi più frequenti s'incontrano anco in questo lucidissimo secolo gli esempi di quelle vergognose e sventurate illusioni che prodursuole non solamente nel piccolo e stolido volgo, ma tra i nobili ancora, la vanità de' cabalisti, degli astrologi, degl'alchimisti, de' cavatefori, de' ciarlatani, e se altri vi sono simili perniciosi impostori.

Meno dannosa è per lo più ma non però senza qualche vergogna e senza biasimo la semplicità di coloro che pieni a' errori popolari dan fede a tutte le favole di cui abbondano i libri de' filosofi plebei, che ad ogn'ora propongono esperimenti che non succedono, del qual vizio infetti sono molti istorici ed oratori e poeti per altro assai riguardevoli, e solamente liberi ne sono coloro che qualche perizia anno della

vera naturale istoria, e della sperimentale filosofia. Della quale altresì bisogna essere affatto privo per lasciarsi vincere dagl' ingannevoli discorsi d' alcuni tanto più pericolosi quanto ci son propagati con qualche apparenza d' ingegno e di dottrina, che spargono negli animi de' giovani semi di disprezzo per gli studi più belli.

Creda pure altri che inutil sia lo studio del Greco nol crederà già il dotto naturalista il quale non solamente vede che quasi tutti i nomi che s' adoprano nelle scienze anco i modernamente impossibili sono di quella lingua, ma si è di più accorto che dall' esatta e critica intelligenza de' passi difficili che s' incontrano ne' più antichi osservatori che Greci furono, infinite bellissime notizie dell' uso d' alcune materie ci sono state scoperte dal Colonna, dal Salmasio, dal Raio e da alcuni altri, e molte ancora vi restano a schiarirsi, senza le quali la vecchia tradizione nell' istoria naturale di quel popolo si glorioso e si grande sarebbe stata interrotta.

E come non potrà maravigliarsi il fisico sperimentatore che un simil fato d' esser predicata inutile da alcuni de' nostri creduti sapienti abbia avuto l' analisi, quale ella oggigiorno per tutto s' adopra per mezzo dell' arimmetica universale i cui metodi anno prodotto i maravigliosi progressi che l' età nostra ha fatti nelle matematiche e nella fisica sopra le antiche?

*Ed altri studi pur vi sono che tanto meno meritavano d' essere vilipesi quanto più avevano contribuito alla fama e alla fortuna di chi gli deprime, e per esser eglino diretti alla conservazione della sanità e al prolungamento della vita principal fondamento dell' umana felicità. Io intendo di quegli studi che costituiscono la medicina, la quale non posso dissimulare che tra di noi riceve non piccolo oltraggio da una sparsa tra molti incredulità della sua efficacia. Non voglio qui ricercare l' origine di questa opinione, potendo ella forse non essere altro nella nostra città di parlare avida, come osservò
il*

il nostro istorico, che una mera repetizione del particolar parere d'alcuni spiegato con fasto d'ingegno e di lettura contra quella a loro mal nota professione. Sarebbe facile il dimostrare le loro fallacie se or fosse opportuno, poichè l'esercizio castrense ed urbano di quest'arte tra numeroso popolo e principalmente ne' più insigni spedali, l'apertura frequente de' cadaveri, le cognizioni anatomiche e fisiche, la lettura de' libri antichi e moderni, e le scienze del moto, fanno toccar con mano la verità di queste due proposizioni. La prima fi è che vi sono alcune infermità di lor natura incurabili, di cui però l'accorgersi al primo loro apparire è effetto della somma eccellenza nell'arte. La seconda che molte altre infermità possono con sicuro metodo curarsi, e neglette e abbandonate al natural corso senza verun discreto aiuto finiscono per lo più nella morte o passano in altre peggiori od incurabili.

A questa erronea incredulità dell'efficacia della medicina non si può sperar che si oppongano se non gli amanti della naturale istoria e filosofia, i quali veggono l'insufficienza delle opposizioni, ed insieme conoscono che togliendosi quest'arte, bisogna rinunziare al pensiero di mantenere non che di porre in più florido stato le parti tutte della fisica, dal complesso delle quali resulta il pregio de' medici non volgari. Io non nego che vi possano essere e matematici e filosofi insigni senza esser medici, ma è noto altresì che finora la molto maggior parte di loro, qualunque ne sia stata la cagione, o medici furono o del tutto o in parte o essere lo volevano.

A' soli naturalisti dunque appartiene come effetto del lor metodo di studiare e della multiplice lor cognizione il possedere quella principal parte dell'umana sapienza che consiste nell'esser privo d'errori, evitando non solamente la troppo facile credulità, ma la non meno erronea troppo ritrosia diffidenza de' nostri sensi e della nostra ragione. Nè sembra esser l'ultimo tra' vantaggi che la scienza naturale può apportare al nostro ingegno, quella rara e perciò stimabilissima unione

ne

ne delle critiche e delle scientifiche dottrine poichè non solo io credo che gli studi che molti di voi fate con tanta lode intorno alla nostra volgare eloquenza, della quale ogni nion popolo italico vi contrasta l'impero non possano ricevere alcuno oltraggio dalle fisiche ricerche, ma sono affatto persuaso che elle vi daranno materia onde congiugnere alle scelte parole i profondi pensieri, ed illustrare la vostra Greca e Latina erudizione colle bellissime moderne scoperte. Massime avendo l'esperienza mostrato che non è impossibile in questo secolo così abbonante d'aiuti per ogni sorta di studio il trapassare i troppo angusti confini ne quali erano tenui per l'addietro molti de' grandi ingegni, cioè nell'infanzia del solo volgare o del Latino scolastico e ne pochi frammenti dell'antica fisica onde è composta la non più tanto celebrata filosofia d'Epicuro, di cui non è gran tempo che alcuni erano tanto fastosi, e però non sarebbe vanità il credere che dopo tanti progressi delle varie scienze potesse omai farsi quel fortunato innesto d'elegante facondia colla sublime sapienza al quale par che indarno aspirassero i vastissimi ne' tempi loro e per altro sommamente stimabili ingegni d'Aristotele, e di Platone.

Ma perchè non basta a render l'uomo felice la chiarezza dell'intelletto senza la bontà e pace del cuore conviene considerare alquanto se anco per questo bene aver possano qualche efficacia le naturali cognizioni. Bene tanto stimabile che ad esso solo par che sieno state sempre dirette le mire de' più savi filosofi di tutti i secoli e di tutte le nazioni. Poichè non per altro che per ottenere la tranquillità dell'animo che è l'ultimo scopo della morale filosofia tanto si applicarono alla fisica gli antichissimi sapienti collocando gran parte della felicità nello scoprire le vere cagioni delle cose.

E certamente l'indagare quali sieno i legami che tengono i grandissimi corpi degli astri sempre in regolari distanze ed in moto uniforme per l'immenso universo ed il vedere che non altra è la forza che produce l'operazioni delle minime

nime parti della materia sopra la terra, deve rapir l'animo dello spettatore naturalista in una tranquillissima e dilettevole contemplazione della serie connessa ed ordinata delle cagioni subalterne, ed in una quieta ammirazione dell'unità e semplicità della cagion somma e primaria, la quale fu perciò dalla nostra maggior musa chiamata quel punto dal quale dipende il cielo e tutta la natura. Onde ne' dispiacevoli eventi nulla può mai tanto facilmente domare il cuore umano come disse divinamente Omero quanto la considerazione della necessità, cioè della dipendenza degli effetti dalle loro cagioni.

Quindi è che i naturalisti per quella loro innocente abitudine d'osservare e d'intendere le proprietà delle cose senza detestarle quando elle riescano incommode, sono perciò i più atti di tutti gli uomini a soffrire pacificamente l'altrui odio, l'ira, l'invidia, la vanagloria e le altre passioni che vizi chiamansi dell'umana natura. Ove al contrario coloro che il genio sperimentale non anno e della natural filosofia sono affatto ignoranti, il mondo riempiono di satire e di querele, e colle loro chimeriche immaginazioni non d'altro parlano che di riformare le repubbliche, e togliendo gli abusi cioè mutando i sensi e gli affetti credono che ridur potrebbero gli uomini al secol d'oro.

Ma considerando che innumerabili libri sono stati scritti da' filosofi per migliorare i costumi degli uomini inutilmente, credo che meriti la vostra deliberazione il pensare se non forse sia meglio che voi vi propongiate un contrario vanto a quel famoso di Socrate e che tentiate di ricondurre la filosofia dagli uomini al cielo, ov'è la sua sede più gloriosa. Certo è dall'istoria che alcuni di quella scuola si poco moderati furono che giunser fino ad occupar la tirannide delle lor patrie, e se esser non si voglia troppo timidi amici del vero, negare non si potrà che per contentare la mente umana mal furono sostituite alle ricerche ed osservazioni d'Anassagora e di Talete
le

le fantasime ed i solletti di cui son piene le socratiche carte, e le tanto famose idee colle quali si confondono alcuni malamente filosofi trattando l'ombre come cosa calda.

Se dunque vi può essere beatitudine tra i mortali ella deve principalmente consistere nella quiete e perfezione del cuore e dell'intelletto, la quale non può nascere se non dalla cognizione delle verità naturali. Della curiosità delle quali e delle osservazioni necessarie per acquistarle non dovete voi vergognarvi essendo nobili e grandi, poichè il sapere non altro essendo che una potenza e producendo autorità, non può se non accrescer nel popolo l'ossequio e l'ammirazione verso di voi che è il solo bene reale della nobiltà e della grandezza.

Ne v'importi la non curanza che alcuni in altre cose assai dotti dimostrano delle cognizioni naturali ch'eglino ignorano, anzi godete internamente del paragone, e rammentatevi piuttosto gli esempi d'Alessandro che tant'oro profuse per l'istoria degli animali, di Mitridate che tante esperienze fece, de' Tolomei a' quali tanti bei libri degli antichi naturalisti furono dedicati, e appresso i Romani voi ben sapete di quali casate erano quei che scrissero dell'agricoltura, e le grandi cariche e la confidenza de' principi che ebbe Plinio, per non dir nulla di quell'Imperator Re di Numidia che vinto e condotto da Cesare a Roma, negli studi naturali passò tranquillamente la sua avversa fortuna, i quali studi non punto gli nocquero per guadagnarli il favore d'Augusto e per decorosamente sostenere e trasmettere anco al figliuolo la sua condizione reale.

Ma senza cercare le antiche memorie, non ha forse la Toscana veduto il suo sovrano avo paterno del felicemente regnante GIOVANGASTONE far le sue delizie degli studi naturali? onde tanta fama ne venne a questa città per le grandi scoperte fatte co' suoi auspici. E non è forse famoso per simile filosofica magnificenza anco l'avo suo materno Gastone di Francia? Molti di voi an conosciuto e conversato il Conte Lorenzo

Maga-

Magalotti, e l'erudita sua delicatezza, e la vasta dottrina anno ammirata, il cui sapere nelle più recondite e più minute particolarità dell'istoria naturale anco dell'Indie e dell'America non par che punto diminuisse il pregio dell'altre grandi e rare sue qualità. Nè debbo io tacere del senator Filippo Buonarroti uno certamente de' maggiori uomini che prodotto abbia il nostro paese, la cui perdita fatta, non ha molto, fu deplorabile a tutti per la sapienza e probità sua singolare, ma principalmente alla Società nostra della quale ei fu uno de' fondatori e per la quale mostrava grandissimo zelo approvando molto il pensiero che fin d'allora da alcuni di voi formato s'era di comprendere ne' vostri studi non solo la botanica ma tutta la fisica. Voi vi ricorderete quanto egli era e perito ed amante della naturale istoria e quanto sagace nel giudicare dell'altrui ipotesi e de' racconti, nel non credere a i quali troppo buonamente, consistono come disse quel Greco i fondamenti e gli articoli della sapienza. La qual mia rispettosa menzione di sì grand'uomo io bramo che insieme sia un tenue monumento della mia privata venerazione del suo merito, e della nostra amicizia, e servami d'autorità per provare che lo studio delle cose naturali non disconviene ne alla nobile condizione ne alle occupazioni del governo e può unirsi ad una vastissima erudizione e d'istoria e d'antiquaria la quale ognun sa che ei possedeva sopra ogn'altro mortale.

Tra' viventi poi se il solo esempio di molti di voi medesimi non bastasse, che adorni delle dignità più illustri non avete sdegnato per questo d'essere ascritti nella nostra società, io saprei scegliere tra' più insigni personaggi dell'Europa alcuni nomi famosi non meno per l'arti del governo e della guerra che per l'istoria e filosofia naturale ch'ei non solo amano ma interamente possiedono.

*Dietro a sì bella scorta applicando voi o nobili e vir-
tuoosi ascoltatori i vostri sensi e l'vostro intelletto allo studio
delle cose naturali, e congiugnendo il sagace e solido ragio-*

§§§§

na-

namento del Galileo, del Torricelli, del Neuton alla diligenza e facilità maestosa ed ingenuo candore del Malpighi e del Redi, voi potrete molto giovare a voi medesimi e altrui colle vostre scoperte, le quali purebè sien vere non saranno mai sterili di buone conseguenze, e potrete insieme svegliando in voi la filosofica curiosità molto accrescere i vostri diletti, e più che con qualunque altro studio contribuire alla tranquillità dell'animo vostro, ed alla perfezione del vostro sapere, e così potrete più godere delle vostre ricchezze. Occupazione non solo innocente ma gloriosa e che vi renderà imitatori degli eroi più illustri. A questo così nobile scopo non era mai possibile di pervenire altramente, che prendendo la valorosa risoluzione che ora io vi veggo pronti ad esequire cioè di far riforgere nella nostra città, una conversazione filosofica da alcune leggi diretta. Se la famosa accademia del Cimento si fosse mantenuta, e la successione di quei grandi ingegni che la fondarono non si fosse interrotta, voi non avreste dovuto avere il pensiero di formar queste leggi. Ma poichè io non so per qual fato quella gloriosa adunanza fu poco durevole benchè coll'operato da lei in pochi anni si sia acquistata fama immortale, tempo era omai che i gentili spiriti vostri punti dal desiderio della lode e dall'amore della verità, non più si contentassero della sola botanica, ma giacchè per lo studio di essa voi vi trovavate uniti in un corpo, il vecchio nome di società botanica con prudente modestia ritenendo, nè quello studio utilissimo però abbandonando, molto opportunamente avere ora estese le vostre intenzioni a tutta la naturale istoria e a tutte le parti della fisica, soggetto molto più confacevole alla varietà degl'ingegni e per la molteplicità delle osservazioni molto ancora più utile.

Io per dir vero negar non voglio che anco in solitario studio possa alcuno diventar gran filosofo e far di belle e importanti scoperte, ma l'esperienza ha mostrato che avvenne ciò molto di rado per produrre notabil progresso vi ab-
biso-

bisogna il lento corso di molti secoli, ove al contrario l'abilità congiunte di molti e dirette ad un sol medesimo scopo per volta anno in meno di cent'anni oltre ogni paragone moltiplicate le notizie scientifiche e condotta con mirabile prontezza la natural filosofia in questo presente floridissimo stato.

Ma perchè l'aumento del sapere nell'intelletto di pochi privati non contribuisce tanto al pubblico bene quanto il rendersi comuni a tutto il popolo se possibil fosse le palpabili verità, non altro che male potendo nascere dalla falsità e dall'errore, ardisco asserire che l'ottimo modo di spargere le cognizioni naturali, giacchè le altre accademie che adornano questa città sono ad altro scopo dirette, si è lo stabilire una società come questa vostra che con generosa accoglienza ammetterà allo spettacolo delle sue sessioni ogni dilettante del vero. Del qual vero essendo invincibile la forza e l'attrattiva su gli animi umani mi giova il presagire che tutti vi daran lode per questo e vi averan gratitudine.

Nè sembra essere questa vostra una molto difficile impresa poichè non vi mancano prudentissime leggi le quali avete già fatte, ne manca a queste leggi l'autorità essendo elleno state approvate di comune vostro consenso, e sperandosi ch' elle sieno per essere confermate e protette dal nostro real sovrano che d'ogni autorità e d'ogni impero è appresso di noi principio e cagione. E poichè secondo l'ingegnosa riflessione di Demostene a tutte le cose vi bisognano denari, godendo la società un assegnamento dal sovrano per mantenere il giardino, non è impossibile che eseguendo le disposizioni intorno a ciò fatte, e per la prudenza e integrità di chi l'amministra, ella abbia dal suo proprio erario onde fornir talora a qualche esperienza da farsi. E benchè la privata contribuzione de' socii per disposizione delle nostre leggi debba essere affatto spontanea, non dee però crederfi che molti di loro che ricchi sono vedendo il progresso ed il bisogno de' nostri studi non sieno per benignamente promovergli.

§§§§ 2

Non

Non vi manca nemmeno l'ingegno e la dottrina e l'industria de' socii che intraprendano colle loro esperienze o col solido ragionamento ad illustrare vie più l'ampilissimo studio della fisica. Ed a questo fine si propone la società di ricevere con istima e gratitudine tuttociò che piacerà a' belli ingegni fuori di essa di comunicarle purchè sia coerente col suo già noto disegno.

Ma siccome le nostre leggi lasciano anco sopra il numero delle produzioni da farsi una intera libertà a ciascheduno è molto probabile che la maggior parte delle osservazioni ed esperienze faranno comunicate da coloro, o sien socii od estranei, che per la loro mediocre fortuna costretti sono a professare popolarmente qualche parte della natural sapienza. A i quali poichè la società ancor nascente non può dare altro premio voi ben vedete che giusto è che almeno per voi non manchi loro la lode, della quale i buoni ingegni più che d'altra ricompensa sogliono essere avari. Ed è giusto altresì che mentre ei si applicano a preparare le filosofiche dimostrazioni che devono essere il principal negozio delle vostre adunanze, voi non permettiate che occupino intanto il vostro favore, con arti lusinghiere coloro che mai virtù non conobbero ne vollero, e che anzi cercano d'insinuare nelle menti dell' insauta moltitudine, che all'esercizio delle arti e principalmente della medicina nuoca il sagace ingegno, il lungo studio, e quell'amore che fa cercare con tanto tedio la verità nella non fallace reiterata esperienza.

Al quale falso e malefico sentimento se voi non vi opponete efficacemente bisogna tralasciare ogni speranza di stabilir giammai tra di voi una filosofica famiglia, poichè è stato sempre uno de non ultimi pregi della nobilissima arte della medicina, che i suoi alunni come osserva un nobile e famoso politico, abbiano sostenuta in gran parte la buona e bella letteratura, e totalmente la naturale scienza, che senza di loro si sarebbe certamente perduta. Io non so poi
con

con quanta vostra lode seguirebbe, che mentre le accademie delle scienze con tanto fervore si coltivano, io non dirò solamente ne' beati regni di Francia e d'Inghilterra e tra' potenti popoli del settentrione, ma in alcune Italiche città ancora, alle quali forse la nostra in altri pregi non cede, in lei sola onde avuta anno origine tante insigni scoperte nella terra e nel cielo, non potesse condursi a fine una sì onorata e per tanti capi sì laudevole impresa.

*L'onore che voi m'avete destinato di tessere l'istoria delle produzioni della vostra diligenza e dottrina negli studi naturali, e di pubblicare per comune utilità ciò che sarà più nuovo e più considerabile, e quella cortese fiducia che voi vi degnate avere nelle mie tenui forze, per contribuire al vostro pensiero, mi costituiscono al presente nel dovere di promettervi, che per me nessuno sarà defraudato della sua lode, e che alle fatiche vostre unirò sempre le mie, per quel poco di spirito che mi possono aver dato le Attiche e le Britanniche scuole, dalle quali io non mi vergogno d'aver cercato alcuna cosa apprendere, non altro scopo avendo che di poter-
vi piacere.*



Syl-

Syllabus AUCTORUM, quorum nomina in hoc Opusculo brevioribus notis compendii causâ citata sunt.

- A**CT. *Ac. R. Sc. Acta Academiae Regiae Scientiarum Parisiensis, seu Histoire, & Memoires de l'Academie Royale des Sciences, à Amsterdam in 12.*
- Adv.** Petri Ponac, & Mathias de Lobel, *Adversaria nova Stirpium.* Antwerp. 1575. in fol.
- Alp. Exot.** Prosperi Alpini de Plantis Exoticis Libri III. Ven. 1656. in 4.
- Ambros.** Hyscinthi Ambrosii Phytologiae, Partis Primae, Tomus Primus. Bon. 1666. in fol.
- Barr.** Jacobi Barrelieri, Plantae per Galliam, Hispaniam, & Italiam observatae: Opus post. edente Antonio de Jussieu. Paris. 1724. in fol.
- Barr. In.** Barrelieri Icones.
- Barr. Obs.** & Inf. in Barr. Barrelieri Observationes à D. Jussieu digestae.
- Belluc.** H. Puf. Thomae Bellucci, Plantarum Index Horti Pisani, & Appendix Plantarum Florentinis Hortis ornamenti Angeli Domini cura descripta. Florentiae 1662. in 8.
- Bocc.** Mus. P. I. Paolo Boccone, Museo di Fifica, e d'Esperienze. Ven. 1697. in 4.
- Bocc.** Mus. P. II. Paolo Boccone, Museo di Pianta rare. Ven. 1697. in 4.
- Bocc. Rar.** Pauli Bocconii, Icones, & Descriptiones Rariorum Plantarum, &c. Oxonii 1674. in 4.
- Boerb. Ind. Alt.** Hermann Boerhaave, Index aliter Plantarum, quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur. Pars I. & II. Lugduni Bat. 1710. in 4.
- Bot. Monsp.** Petri Magnol, Botanicon Monspelicense: cum Appendice. Monsp. 1686. in 12.
- Bot. Monsp. Ap.** Appendix Botanici Monspelicensis supradicti.
- Bot. Par.** Sebastiani Vaillant, Botanicon Parisiense. A Leide, & à Amsterdam 1717. in fol.
- Breyn.** Prodr. 1. Jacobi Breynii Prodr. omnis primus Fasciculi Rariorum Plantarum. Gedani 1680. in 4.
- Brauf.** Othonis Brunfels, Herbarium. Tomi III. Argentinae 1519. in fol.
- Buxb. Crat.** 1. L. C. Buxbaum, Plantarum minus cognitarum Centurias. Petropoli 1728. in 4.
- C. B. Pin.** Caspari Bauhini Pinet. Theat. Botanicum. Basil. 1673. in 4.
- C. B. Prodr.** Caspari Bauhini, Prodr. omnis Theat. Botanicum. Basil. 1673. in 4.
- Carf. & Carf.** & Carf. in Op. Andreae Cacialpini, De Plantis Libri XVI. Florentiae 1583. in 4.
- Carf.** H. Sir. Andreas Cacialpini, Hortus siccus, quem Ipse Alphonso Tornabono Episcopo Biturgensi paravit; nunc vero apud DD. Pandulphinos Pars. Flor. aëstivatur.
- Cam.** Hort. Joachimi Camerarii, Hortus Medicus, & Philosophicus. Francof. ad Moenum 1588. in 4.
- Cast.** Castore Durante, Herbario novove. Ven. 1667. in fol.
- Clarici.** D. Bartolommeo Clarici, Historia, & Cultura delle Piantae, &c. Op. Post. Ven. 1736. in 4.
- Clus.** Hist. Caroli Clusii, Rariorum Plantar. Historia. Antwerp. 1607. in fol.
- Col. Parr. I.** Fabii Columnae, Minus Cognitarum Rariorumque, &c. Plantarum Catalogus. Romae 1616. in 4.
- Col. Parr. II.** Fabii Columnae, Minus Cognitarum Stirpium, Pars altera. Romae 1616. in 4.
- Comm.** Rar. Jo. Commelini, Horti Medici Amstelodamensis Rariorum Plantarum Descriptio, & Icones Op. Post. Amstel. 1697. fol. Item Caspari Commelini, Horti Medici Amstelodamensis, Rariorum Plantarum Descriptio, & Icones, Pars altera. Amstel. 1702. fol.
- Cord.** Hist. Valerii Cordi, Hist. Stirpium Libri IV. Argentinae 1562. in fol.
- Corsl.** Ind. R. H. Josephi Piston Tournesori, Corollarium Institutionum Rei Herbariae, ad usum Institutionum R. Herb.
- Dill.** Cat. Giss. Io. Jacobi Dillenii, Catalogus Plantarum sponte circa Gissao nascentium; cum Appendice &c. Francof. 1719. in 12.
- Diosc.** Pedacius Dioscorides Anazarbicus in Libris de Materia Medica. Significat autem Plantas, quas recentiores Botanici sibi visum repperisse ex descriptis à Dioscoride.
- Dod.** Fruct. Remberti Dodonaei Stirpium Historiae, Pemptades seu. Antuerpiae 1616. in fol.
- Dum.** Cat. Plant. H. Flor. Angeli Domini, Appendix Plantarum Florentinis Hortis ornamenti. Ad cal-

- ccm Plantarum Indicis Horti Pisani
Thomas Bellucci.
- Ferr. Flor. Cult.* Io. Baptista Ferrarii
e Soc. Ief. De Florum cultura, Li-
bri IV. Romae 1633. io 4.
- Ferr. Hely.* Io. Baptista Ferrarii e Soc.
Ief. Hesperides sive de Malorum
Aureorum cultura, & usu, Libri IV.
Romae 1646. in fol.
- Flor. Alders.* Mauricii Hoffmanni, Florae
Aldershae Deliciae Sylvestres,
sive Catalogus Plantarum in Agro
Aldershamo sponte nascentium. Al-
tdorf. 1677. in 4.
- Fuchs. Hist.* Leonh. Fuchsi, de Historia
Stirpium Compositarum. Basil. 1542.
io fol.
- Ger. Emser.* John. Gerarde: The Herball,
or generall Historie of Plantes very-
much Enlarged, and Amended by
Thomas Iohnson. London. 1636. io fol.
- Hermann.* H. L. Bat. Pauli Hermannii,
Catalogus Horti Academici Lugdu-
no-Batavi. Lugduni Bat. 1687. in 8.
- H. Carol.* Praefici Cupani, Hortus Ca-
tholicus cum Supplemento I. Neap.
1696. in 4.
- H. Carol.* Suppl. Francisci Cupani, Horti
Catholici Supplementum alterum.
Panormi 1699. in 4.
- H. Maurer.* Antonio Titac, Catalogus Plan-
tarum Horti D. Io. Francisci Mauro-
ceni Sen. Vico. Patavii 1713. io 8.
- H. Pif.* Michaelis Angeli Tillii, Catalogus
Plantarum Horti Pisani. Flo-
rentiae 1723. io fol.
- I. B. 1.* Historia Plantarum Universalis
Auctoribus Iohanne Bauhino, &
Jo. Henrico Cherlero, a Dominico
Chabraeo illustrata. Pars I. Ebro-
duni 1690. in fol.
- I. B. 2.* Ejusdem Operis, Pars altera.
Ibidem 1692.
- I. B. 3.* Ejusdem Operis, Pars tertia.
Ibidem 1692.
- I. B. 3.* App. Ejusdem Operis Appen-
dix ad calcem Tom. III.
- Just.* R. H. Iosephi Pittoe, Tournefort
Institutiones Rei Herbariae, cum
Appendice, & Corollario. Paris.
1700. io 4. Vol. 3.
- Just.* in Barr. Vide Barr. Obf.
- Lact. Triumf.* apud Fratrem. Vide
Triumf. Obf.
- Loh. It. & Loh. Iren.* Icones Stirpium
(ex Matthiae Lobelii, & Petri Pe-
daci Operibus desumptae, curante
Christophoro Plantino Typogr.)
Antverpiae 1581. in 4. transv.
- Lugd.* Historia Generalis Plantarum ab
Io. Molino, & Jacobo Dalecampio
elaborata. Lugd. 1736. in fol. Vol. 1.
- Marr.* Pedacii Dioscoridis Anazarbaei,
de Medica Materia Libri sex, In-
terp. Marcello Virgilio Secretario
Florentino, cum eiusdem Annota-
tionibus. Florentiae 1518. in fol.
- Matth. Valgrif.* 1559. Pietro Andrea
Matthioli, Discorsi ocelli sei Libri
di Pedacio Dioscoride Aozarbaeo
della Materia Medicinale. Venezia
appresso Vincenzio Valgrifi 1559.
Fogl. Vol. I. Itst. com parvis fi-
guris.
- Matth. Valgrif.* Cum Magnis Fig. c 568. &
Matth. 1568. Idem Opus. Venezia ap-
presso Vincenzio Valgrifi c 568. cum
magnis Fig. Vol. 1.
- Matth.* 1585. Idem Opus, ibidem spud
Eundem in fol. pariter, & cum
magnis fig. Vol. 1.
- Mem. Ar. R. Sc.* Vide Ad. Ar. R. Sc.
- Meutz.* Png. Christiani Mentzelii Pupil-
lus Rariorum Plantarum, ad calcem
Indicis nominum Plantarum mul-
tilinguis. Berolini 1682. in fol.
- Michx.* Petrus Antonius Michxli. Si-
gnificat Plantas quae variis Amicis
communicavit, Vailantio praefec-
tim, Boëthazio, & Tillio.
- Michx.* Nov. Plant. Gen. P. I. Petri An-
tonii Michxli Nova Plantarum Ge-
nera Pars I. Florentiae 1729. Typis
Bernardi Paperini, in fol.
- Mont. Cat. Stirp. Agr. Ben. Pradr.* Iosephi
Montii Catalogi Stirpium Agri Ro-
moneosis Prodrum. Bon. 1719. io 4.
- Mor. H. R. Bief. & Mor. Pradr.* Est. Ro-
berti Morison, Hortus Regius Ele-
sentis auctus, sive Praediorum Ro-
manicorum, Pars I. Lond. 1669. in 12.
- Mor. Umb.* Roberti Morison, Umbelliferarum
Distributio nova. Oxonii
1672. in fol.
- Mor. Hyl. Oxo.* Pars. 1. Roberti Mori-
son, Plantarum Historiae Universa-
lis Oxoniensis, Pars Secunda. Oxo-
ni 1680. in fol.
- Mor. Hyl. Oxo.* Pars. 3. Ejusdem Operis
Pars tertia. Opus Post. Oxonii
1699. in fol.
- Munting.* Phytograph. Abrahami Moun-
tingii Phytographia curiosa. Am-
stel. 1725. in fol.
- Park Theatr.* Ioh. Parkinson Theatrum
Botanicum. London 1640. in fol.
- Plin.* C. Plinii Secundi, Historia Natu-
ralis. Notat Plantas, quae eadem
creduuntur cum descriptis a Plinio.
- Pluk.* Aim. Bot. Leonardi Plukenetii, Al-
magestum Botao. Lond. 1696. in fol.
- Poa. Bald.* Lax. Plantae, seu Simplicia in
Baldo Monte, & in Vis ab Verona
ad Baldum a Io. Pona Pharmaco-
paco

paco Veronenſi reperta, & edita. Baſil. 1608. 4.
Ponted. Anſel. Iulii Pontederæ, Anthologia. Patav. 1720. 4.
Raii Syll. Io. Raii, Stirpium Europæarum extra Britannias naſcentium Sylloge. Londini 1694. in 8.
Raii Synopf. Ed. 1. Io. Raii, Synopſis Methodica Stirpium Britannicarum, Editio ſecunda. Lond. 1696. in 8.
Raii Synopf., & Raii Synopf. Ed. 3. Io. Raii, Synopſis Methodica Stirpium Britannicarum, editio tertia auctior, & emendatior. Londini 1724. in 8.
Raii Method. Plant. Io. Raii Methodus Plantarum emendata, & aucta Londini 1709. in 8.
Raii Hiſt. Tom. 1. Io. Raii Hiſtoria Plant. Tomus prior. Londini 1686. in fol.
Raii Hiſt. Tom. 2. Eiusdem Operis Tom. II Ibidem 1688. in fol.
Raii Hiſt. Tom. 3. Eiusdem Operis Tom. III. Ibidem 1704. in fol.
Scheuchz. Agreſt. Io. Scheuchzeri, Agrostographia. Tiguri 1729. 4.
Scheuchz. Agreſt. Prodr. Io. Scheuchzeri, Agrostographiæ Prodomus. Tiguri 1708. in fol.
Stehel. Bot. Iof. Pitton Tournefort, Schola Botanica. Amſtcl. 1699. in 12.
Tab. Ic., & Tabera. Irem. Icones Plantarum (ex Iacobi Theod. Tabernaemontani, Hiſtoria Plantarum Idiomaſte Germanico conſcripta deſumptæ) curante Nicolao Baſſæo Typ. Francoſ. ad Moenum 1590. 4. tranſv.
Theophr. Theophrasti de Hiſtoria, & de Cauſis Plantarum. Significat autem Plantas, quæ eaſdem videotur cum deſcriptis a Theophrasto.
Tournef. in All. Ar. R. Sc. Nova Plantarum Genera ab Iof. Pitton Tour-

nefort inſtituta, dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences.
Trog. Hieronymi Tragi, de Stirpibus Libri III. Argentor. 1552. in 4.
Triumf. Oſf. & Laet. Triumf. apud Fratreſ. Io. Baptiſtæ Triumfetti Obſervationes de Ortu, & Vegetatione Plantarum, cum Novarum Stirpium Hiſtoria Iconibus illuſtrata. Romæ 1699. 4.
Triumf. Fracl. Io. Bapt. Triumfetti, Præluſio ad publicas Herbarum Offenſiones; & Novarum Stirpium deſcriptiones, & Icones Romæ 1700. in 4.
Vaill. in All. Ar. R. Sc. & Paull. Nov. Plant. Gen. Nova Plantarum Genera a Schæſtiano Vaillant inſtituta, dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences.
Vignæ. Dominici Vignæ, Animadverſiones in Libros de Hiſtoria, & de Cauſis Plantarum Theophrasti. Piſis 1625. in 4.
Vir. Læſt. Gabrielis Grisey, Viridarium Luſitanicum. Ulyſſip. 1666. in 4.
Volb. Heſſer. Norimb. I. C. V. (Volkmeri) Hesperidum Norimbergienſium Libri IV. Norimbergæ 1700. in fol.
Voyag. du Levant, M. Pittoe de Tournefort, Relation d'un Voyage du Levant fait par ordre du Roy. A Amſterdam 1718. Tom. II. Vol. I. in 4.
Zannich. & Zannich. Hiſt. Cio. Gualtero Zannichelli, Hiſtoria deſſe Plantæ, che naſcono ne' Lidi intorno Venezia, Op. Poſt. accreſciuta, & publicata da Gian-Iacopo Figlio dell' Iteſſo. Venezia 1735. in fol.
Zannich. Opus. Bot. Io. Hier. Zannichelli, Opuscula Botanica. Venet. 1750. 4.
Zann. Giacomo Zannoni, Hiſtoria Botanica, Parte Prima. Bologna 1675. in fol.

Explicatio aliarum Notarum quibus quandoque uſi ſumus.

D. *Deſcr. & Deſcript.* Quæd Deſcriptionem tantum. Significat autem Plantas illas, quibus adicitur, eaſdem videtur cum deſcriptis ab aliquo Autore, non vero cum deſcriptis ſub eodem nomine.
Il. *& Irem.* Quæd Irem tantum. Significat Plantas illas, quibus adicitur eaſdem eſſe cum deſcriptis ab aliquo Autore in Tabulis æneis, vel ligneis, non vero cum deſcriptis ſub eodem nomine.
Off. & Offic. *Officinarum.* Significat autem

nomina illa Plantarum, quibus appoſita eſt, apud Scriptores Medicos, & Pharmacopocos uſitata eſſe.
Tab. Tabula. Indicat Plantas, quæ ab aliquo Autore pinguntur in Tabulis æneis.
V., & Vulg. Indicat nomina apud Vulgus communia, quorum pleraque a Scriptoriſus Medicis adoptata ſunt.
Qqor. Qværandum. Significat nomina illa a quibusdam Rci Medicæ Scriptoriſus uſurpari.

48 (LXXXVIII) 20



Mar. 1904



CATALOGVS PLANTARVM HORTI FLORENTINI



ABROTANVM incanum & tomentosum maius, folio Delphinii reflexo, segmentis tortuosis, capitulis cernuis uno versu dispositis per basin acuminatis brevi petiolo appendis & squamis longioribus tectis. *Abrotanum mar maximum Col. Part. 1. 54*

2. Idem minus, folio tenuiore, capitulis rotundis longiusculo petiolo appensis, squamis brevioribus & confertioribus tectis

3. Abrotesanum maius subincanum Camphoræ odorem spirans, Delphinii foliis surrectis, capitulis rotundis cernuis & novum larus spectantibus. *An Abrotanum mar angustifolium*

*joleum maius Inst. R. H. 459. * An Abrotano maschio Matth. 728. An Abrotanum Casalp. 478. Abrotanum mar usitatus Offic. Abrocinæ vulgo*

4. Idem minus odoratum, foliis reflexis, segmentis crassioribus, capitulis maioribus. *An Abrotanum mar angustifolium minus Inst. R. H. 459*

5. Abrotanum Lini folio acriori & odorato Inst. R. H. 459. * *Dragone vulgo, aliquibus Targone Casalp. 562. Dragoncello Matth. 626. Dracunculus Hortensii Cast. Draco Herba Dod. Tarcbon Gefn.*

A

AB-

ABSINTHIUM Ponticum seu Romanum officinarum seu Dioscoridis, foliis latioribus, capitulis maioribus. *Absinthium vulgare Fusch. Hist. 1.* * Hoc & sequens in off. promiscue usurpantur pro Absinthio vulgari, communis, Romano, Pontico vero, & Herba Medica

2. Idem foliis & capitulis minoribus. *Assenzo Mattb. 723*

3. Absinthium Ponticum tenuifolium incanum *Inst. R. H. 457.* * *Assenzo di Ponto Mattb. 724.* *Absinthium Santonicum Casalp. 476.* *Assenzo Pontico vulgo*

ABSINTHIUM. vide SERIPHIVM

ABUTILON *Inst. R. H. 99.* * *Altea ovvero Abutilo di Avicenna. Mattb. 976.* *Altea Theophrasti Casalp. 561. & 576*

ACACIA Indica Farnesiana *Inst. R. H. 605.* * *An spina ex semine peregrino nata Casalp. 322.* *Gaggia vulgo*

2. Acacia Americana non spinosa, foliis Vicie multiflora, floribus pallidis in spicam triunciale dispositis, siliqua palmari compressa & intorta.

T AB. I.

* Ad arboris proceritatem excrevit hac Acacia, biemis incommoda perferens. Etiam folia (Fig. 1.) unciam plerumque longa, sesquilineam lata, quoadque duplo vel triplo ampliora, laevia splendentia, superne saturatius viriditia, inferne dilutiora, in ambitu obscure dentata, costa simplici subviridula alterno fere ordine innascuntur, nullo impari feriem claudente. Hac folia composita e sunt ramorum vetustorum prodeunt tria aut quatuor ut plurimum ana eam florum spicis, in ramis autem recentibus alii casta simplici ex alternis nodis prodeunt adnascuntur decem ut plurimum, vel etiam quatuordecim, alterno pariter ordiae, foliamque aliud maius componunt. Flores (Fig. 2.) e lateo virentes, sesquilineam longi infundibuliformes stella instar in sex lacinas obtusas divisi, quarum tres angustiores tribus latioribus interposita, staminibus brevibus concoloribus, apicibusque citrinis donati, odore gravi, acit cuidam (Fig. 3.) trinaciali viridi affiguntur nonnihil inter se distantes, & spicam laxam constituunt Salicis semisiferas spicas non male representantem, & e ramulorum nodis pendentem. Ex innumeris floribus, qui quotannis erumpunt, duo vel tres tantummodo fecundi sunt, siliquam nempe proferunt (Fig. 4.) palmarem compressam sesquilineam latam in maturitate fuscam. *Anagyridis fusida* siliquarum instar intortam & pendentem. Semina (Fig. 5.) siliquae edulis seminaibus similia sunt. Candicis & ramorum vetustorum cortex rufus est, recentium vero viridis ut foliorum. Rami ipsi praelongi sunt, parum divaricati, ad terram incurvati & veluti depluentes, nullisque spinis armati. Figura 2. florem maiorem vero per microscopium representat. Siliquam (a tribus enim annis nullam Arbor ad maturitatem perduxit) pingendam nobis perhumaniter communicavit D. Nicolaus Gaalterius ex immensa fructuum collectione quam in instructissimo suo Museo inter alia plurima pretiosaque cimelia asservat

ACANTHVS sativus vel mollis Virgilii *Inst. R. H. 176.* * *Acanto Mattb. 710.* *Acanthus vulgo Brancaurina Casalp. 333*

2. Acanthus aculeatus pinnis angustioribus ac venis albicantibus distinctis, floribus albis

3. Acanthus minus aculeatus, brevioribus & mollioribus pinnis H. Pil.

ACER Platanoides *Inst. R. H. 615.* * *An Acer Casalp. 42*

2. Acer

2. Acer maior folio ampliore, fructu cum alis semiclaufis
3. Idem folio & fructu minore
4. Acer maior, folio rotundiore minus laciniato (fructu cum alis semiclaufis) an Opulus Italarum. Inft. R. H. 615
5. Acer Campeftre & minus Inft. R. H. 615. * *An Opulus Cafalp.* 42. Pioppo. Oppio. Loppio vulgo
6. Acer trifolia Inft. R. H. 615

ACETOSA arborefcens, fubrotundo folio, ex Infulis Fortunatis Inft. R. H. 503

2. Acetofa montana maxima glabra, longo lato Ari folio, auriculis integris, flagellis ramofis, capfulis feminalibus breviter coronatis
3. Acetofa Hispanica maxima Manting. Phytograph. Fig. 7
4. Acetofa tuberoſa radice Inft. R. H. 503
5. Acetofa pratenſis Inft. R. H. 502. * *Oxalida* Mattb. 474. *Hac, & tres ſequentes Acetofa in Offic. promiſcue uſurpantur pro Acetofa, Oxalide, & Oxalida*
6. Eadem ſerocina, foliis amplioribus, flagellis ramofis
7. Eadem foliis brevibus ſubrotundis glabris, flagellis ramofis feminiferis tantum
8. Acetofa hortenfis, longo viridi anguſto folio
9. Acetofa rotundifolia hortenfis Inft. R. H. 503. * *An Oxalis tertia Cafalp.* 166. *Acetofa Romana vulgo*
10. Acetofa arvenſis lanceolata (repens, auriculis longioribus acutis) Inft. R. H. 503. * *An Oxalis prima, vulgo Acetofa Cafalp.* 166. *Hac, & dua ſequentes promiſcue vocantur in Offic. Acetofa minor, lanceolata, ſylveſtris, & Oxalis ovina*
11. Eadem auriculis brevioribus. * *An Oxalida minore* Mattb. 475
12. Eadem Alpina fruteſcens, foliis lanceolatis anguſtis, ſemine nudo exiguo & rugoſo
13. Acetofa ſcutata repens Inft. R. H. 503
14. Acetofa Ocimi folio, Neapolitana Inft. R. H. 503

ACONITVM lychodionum lutenm Inft. R. H. 424. * *Aconito* II. Mattb. 1142. *An Napelli alterum genus folio Platani Cafalp.* 585. *Luparia. Napellus. Aconitum Offic.*

2. Aconitum cæruleum ſeu Napellus I. Inft. R. H. 425. * *Napello* Mattb. 1151. *An Napelli genus alterum Cafalp.* 585

ADATHODA Zeylanenſium Inft. R. H. 175

AGRIMONIA Officinarum Inft. R. H. 301. * *Eupatorio* Mattb. 1068. *Agrimonia Cafalp.* 319. *Agrimonia. Eupatorio de' Greci Ric. Eupatorium veterum Offic.*

2. Agrimonia odorata Inft. R. H. 301. * *Pianta, che è la ſteſſa in ogn' ſembianza, che l'Agrimonia volgare: ma ha odore, e ſapore aromatico, e grato, come è l'Eupatorio de' Greci Ric.* 38. *Eupatorium odoratum, & Aromaticum Offic.*

3. Agrimonia Orientalis humilis, radice craſſiſſima repente, fructu (craſſiore) in ſpicam brevem & denſam coeſto Coroll. Inft. R. H. 21

AGRIMONIOIDES Inft. R. H. 301

ALATERNVS Inft. R. H. 595. * *An Phyllirea mar Tbcoprafti vulgo legno puzzo, & Putine Cafalp.* 74

ALCEA Cannabina Inft. R. H. 98. * *Alcea Offic.*

2. *Alcea folio rotundo laciniato Inft. R. H. 98*

3. *Alcea Virginiana Ricini folio Boerh. Ind. Alt. Part. 1. 270. num. 9*

ALCHIMILLA vulgaris (præcox) floribus herbaceis C. B. Pin. 319.
* *An Stellaria Matth. 1236. Alchimilla, & Per Leonis Cafalp. 557. Hac & sequens eius varietas in Offic. promiscue vocantur Alchimilla, Per Leonis, Stella herba, Stellaria*

2. *Eadem serotina*

3. *Alchimilla Alpina pubescens minor Inft. R. H. 508*

ALKEKENGII Officinarum Inft. R. H. 151. * *Solatro Halicacabo Matth. 1126. Vescicaria Cafalp. 213. Alchebengi Ric. Solanum Vescicarium. Solanum Halicacabum Offic.*

2. *Alkekengi fructu parvo, verticillato Inft. R. H. 151. * Solanum somniferum Cafalp. 214*

ALLIVM an montanum, capite rotundo Inft. R. H. 384

2. *Allium angustifolium, foliis intortis Inft. R. H. 385*

3. *Allium latifolium glabrum, floribus umbellatis albis, petalis subrotundis quinque lineas longis & tres latis*

4. *Allium pratense, radice Iridis, flore purpurascente Zannich. Hist. An Allium montanum maius foliis Narcissi splendentibus viridibus, floribus purpurascens C. B. Pin. 75*

ALNVS glutinosa folio viridi subrotundo ampliore leviter sinnato & dentato, fructu crassiore brevi. *An Alno Matth. 157. Ontano vulgo*

2. *Alnus non glutinosa, folio viridi subrotundo serrato*

ALOE folio in oblongum aculeum abenote Inft. R. H. 366. * *Aloes alterum genus nuper ex India Occidentali advectum Cafalp. 418. An Aloe Ric. Aloe nobis vulgaris. Fico d' India vulgo*

2. *Aloe vulgaris Inft. R. H. 366. * An Aloe Cafalp. 417*

3. *Aloe caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis H. Pis. Tab. 20*

4. *Aloe Africana caulescens, foliis (magis) glaucis caulem amplectentibus (& in mucronem obtusorem desinentibus.) Comm.*

5. *Aloe Africana, floribus rubris, tenuissimis pediculis, folio plano, marginatiferis H. Pis. Tab. 8*

6. *Aloe Africana brevissimo crassissimoque folio, flore candido H. Pis. Tab. 5*

ALSINANTHEMVM annuum subhirsutum maius, foliis brevioribus ex rotunditate acuminatis, floribus albis pentapetalis, petalis subrotundis & integris femiliness longis, capsula duriori. *Alsine minor Lini capitulis C. B. Pin. 151. An Alsine petraea minima Tabern. Icon. 710*

2. *Idem*

2. Idem minus petalis orientalibus, capsula molliori. *Alfine multicaulis* C. B. Pin. 250. *Alfine minima* L. B. 3. 364. *descript. Ic. vero vid. pag. 348. sub flore Cuculi. Alfine minor* Tabern. Icon. 708

ALSINE altissima nemorum Inst. R. H. 242. * *Morsus Gallinae maior* Brunf.

2. *Alfine montana latifolia*, flore laciniato Inst. R. H. 242

3. *Alfine media vulgaris*, calyce villosa. *Alfine media* C. B. Pin. 250. Inst. R. H. 242. *Alfine vulgaris*, sive *Morsus Gallinae* L. B. 3. 363. *Morsus Gallinae* Trag. 385. *Alfine maior* Fuchf. 21. *Alfine* Matth. 1172

4. Eadem calyce glabro. *Alfine media* Tabern. Icon. 707. *Alfine minor* Dod. Pempt. 29. *Alfine Matthioli* Lugd. 1212. *Alfine minor recentiorum*, sive *Hippia minor* Lob. Icon. 460. *Alfine* Cass. 19

5. *Alfine media*, foliis minoribus * *Ha tres Alfines media species promiscue usurpari possunt pro Alfine & Morsu Gallinae. Offic.*

6. *Alfine pratensis* Gramineo folio ampliore Inst. R. H. 243

7. *Alfine pratensis* Gramineo folio angustiore Inst. R. H. 243

8. *Alfine an aquatica media* Inst. R. H. 243

9. *Alfine annua rotundifolia* glabra multicaulis & multiflora, floribus pentapetalis fugacibus & vix conspicuis, petalis lanceolatis semilineam longis, calycis foliolis introrsum cucullatis, extrorsum in costam elevatis. *Paronychia altera* Matth. 1096. Lugd. 1213. * *Paronychia* Offic.

10. *Alfine maritima*, sive *Spergula marina* maior perennis, foliis angustis succulentis unum latas spectantibus, flore pentapetalo purpurascente, petalis subrotundis & integris, semine fusco compresso, margine foliaceo aucto. * *Spergula* Offic.

11. *Alfine* *Spergulae* facie media Inst. R. H. 244

12. *Alfine Alpina repens*, capillaceo folio, floribus solitariis albis pentapetalis pediculo longo fultis, petalis subrotundis & integris

13. *Alfine tenuifolia* Inst. R. H. 243

14. *Alfine minima*, flore fugaci Inst. R. H. 243

15. *Alfine minima* perennis repens glabra, capillaceo folio non ita angusto, flore herbido maiusculo tetrapetalo, petalis vix conspicuis & integris, fructu orbiculato. *Alfine pusilla*, Graminea, flore tetrapetalo Inst. R. H. 243

16. *Alfine* quae saxifragia Bavarica Pon. Bald. Lat. 60

ALTHAEA Dioscoridis, & Plinii Inst. R. H. 97. * *Althaea* Matth. 975. *Vismalva quasi Malva discida* Casalp. 561. *Altea* Ric. *Althaea*. *Bismalva*. *Ibiscus*. *Malvaobiscus* Offic.

2. *Althaea* Dioscoridis & Plinii, folio magis angularo Inst. R. H. 97

3. *Althaea subincana*, caule praesto imbecilliori seu vix se sustinens, foliis magis laciniatis ac serratis, flore purpureo parvo, segmentis obtusis veluti cordatis, capsula seminum crassiore glabra & rugosa. *An Althaea profunde serrato fere dentato folio* L. B. 2. 955

ALYSSOIDES incanum, foliis sinuatis (flore luteo, petalis bifidis, fructu rotundo) Inst. R. H. 218

2. Idem fructu oblongo

3. *Alyssoides alpinum* fruticosum sempervirens, folio Lencolii viridi ad margines piloso aut barbato, floribus spicatis luteis, calyce auriculato, fructu

du subrotundo, semine latissimo. *Alysson alterum* *Casalp.* H. Sicc. pag. 201. num. 555

ALYSSON Creticum saxatile foliis undulatis incanis Corollar. Infl. R. H. 15

2. *Alysson* perenne incanum Leucoli folio, flore luteo, fructu obtuso & veluti cordato D. Leonardi Sesler Medici, & Philobotani Veneti

3. *Alysson* vulgare, Polygoni folio, caule nudo Infl. R. H. 217. * *An Humilis quadam herbula affinis Bursa Pastoris* *Casalp.* 366. *Paronychia vulgaris* Dod.

4. *Alysson* Veronicæ folio Infl. R. H. 217

AMARANTHOIDES Lychnidis folio, capitulis argenteis maioribus Infl. R. H. App. 654

2. *Amaranthoides* Lychnidis folio, capitulis purpureis Infl. R. H. App. 654

AMARANTHVS folio variegato, colore hilariori, qui femina Infl. R. H. 236. * *Maraviglie di Spagna vulgo*

2. *Amaranthus* folio variegato, colore obscuriori, live mas Infl. R. H. 236. * *An Bliti peregrini alterum genus* *Casalp.* 162

3. *Amaranthus* Indicus spinosus ipica herbacea Infl. R. H. 236

4. *Amaranthus* panicula incurva lucea Infl. R. H. 236

5. *Amaranthus* simplici panicula Infl. R. H. 235. * *Amaranto*. *Sciamatro*. Fior velluto vulgo

AMBROSIA maritima Infl. R. H. 394. * *An Ambrosia* *Herbariorum* Marc. 205. *Ambrosia* *Casalp.* 158. *Ambrosia*. *Ambrosiana* Offic.

AMMI maius Infl. R. H. 305. * *Ammi* Offic.

2. *Ammi* perenne Infl. R. H. 305. * *Crisbamo* III. Matth. 521. *Eryngium arvense* C. B.

AMYGDALVS Indica nana Infl. R. H. 627

ANACAMPSEROS maxima, suaverubente caule, foliis coniugatis latissimis longioribus subcinereis & circumrosis, floribus umbellatis pallidis. *An Anacampseros maxima* Infl. R. H. 264. * *Hec*, & sequens in Offic. vocantur *Craßula maior*, *Telephium*, *Herba S. Iohannis*

2. Eadem atrotubente caule, foliis viridibus. *An Anacampseros Lusitanica Hamatodes, maxima* Infl. R. H. 264

3. *Anacampseros* minor, rotundior folio, sempervirens Infl. R. H. 264. * *Telephium minus* Offic.

ANAGALLIS phœniceo flore Infl. R. H. 142. * *Anagalide* *Mascbio* Matth. 656. *Anagallis* flore puniceo *Casalp.* 262

2. *Anagallis* caeruleo flore Infl. R. H. 142. * *Anagalide femina* Matth. 657. *Anagallis* flore caruleo elegantissimo *Casalp.* 262. *Anagallide*, che fa il fiore azzurro Ric.

ANAGYRIS fetida Infl. R. H. 647. * *Anagyris* *Casalp.* 112

AN-

ANDROSAEMVM maximum frutescens (foliis maioribus subrotundis) Inft. R. H. 251. * *Androsamum* a recentioribus *Chirurgis Matriflywa* appellatum *Casalp.* 395. *Herba Siciliana Tab. Clymenon Plinii Ang. Perislymenon Diofcoridis C. B.*

2. Idem foliis oblongis minoribus. * *An Androsamo* *Mattb.* 988

ANEMONE *Geranii* rotundo folio purpurascens Inft. R. Herb. 276

2. *Anemone Virginiana* Inft. R. H. 277

3. *Anemone latifolia*, *Pavo dicta*, major, prima Inft. R. H. 275

4. *Anemone tenuifolia*, flore amplo sanguineo hexaphyllo Inft. R. H. 278

5. *Anemone tenuifolia*, flore niveo Inft. R. H. 278

6. *Anemone tenuifolia*, flore simplici phœniceo Inft. R. H. 279

7. *Anemone tenuifolia*, floribus dilute violaceis, viridi colore & rubore perfusus Inft. R. H. 281

8. *Anemone tenuifolia* multiplex rubra Inft. R. H. 282

9. *Anemone tenuifolia* multiplex, magno flore violaceo & rubente colore mixto Inft. R. H. 283

10. *Anemone foliosa*, flore suaverubente multipliei Inft. R. H. 283

11. *Anemone sylvestris alba* maior Inft. R. H. 277

ANEMONOIDES. vid. RANVNCVLVS

ANEMONOSPERMOS *Afra* folio & facie *Taraxaci lacani* *Boerh.* *Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. Pag. 100. n. 5*

ANETHVM horrense Inft. R. H. 318. * *Anetho* *Mattb.* 799. & *Ric. Anethum sativum Casalp.* 283. *Anethum Offic.*

2. *Anethum verum* *Pernambuccense* *Boerh. Ind. Alt. Part. 1. pag. 65*

ANGELICA *sylvestris minor*, sive *erratica* Inft. R. H. 313. * *Hæc & sequens, Angelica erratica seu sylvestris, Herba Gerardi, & Podagraria in Officinis promiscue vocantur*

2. *Eadem latifolia*

3. *Angelica Alpina* ad nodos florida Inft. R. H. 313

4. *Angelica montana* perennis, *Paludapii folio* Inft. R. H. 313. * *An. Lewisico vulgare* *Mattb.* 815. & *Ric. 46. Ligusticum. Lewisicum. Libysticum Offic.*

ANONIS legitima antiquorum *Coroll.* Inft. R. H. 27. * *Ononis Marc. 164. Anonide* *Mattb.* 711. *Ononis vulgo Bonaga & Bulimaca* *Casalp.* 243. *Reſſa Bovis* *Trag. Remora Aratri Ambr. Anonis Offic. Bulimacola vulgo*

2. *Anonis* non spinosa, caulibus procumbentibus Inft. R. H. 408

3. *Anonis viscosa minor* flore pendulo *C. B. Pin. 389. Prodr. 156. * Anonit odore Theriaca Belluc. H. Pif.*

ANTHEMIS *Italica arvensis annua maior* vulgarissima, flore maximo, difco puovente *Michel. Nov. Plant. Gen. pag. 32. verl. 1. * Cota vulgo ſive Cotula fatida* *Casalp.* 492. *Pro Camomilla Offic. a quibusdam nſurpatur*

2. An-

2. *Anthemis arvensis* annua pacula, modo odora, modo inodora, modo foetida, folio glabro, capitulis & ramulorum extremitatibus crassioribus Michel. Nov. Plant. Gen. pag. 32. v. 3. Tab. 30. fig. 2.

3. *Anthemis hortensis* repens odorata, flore luteo, semisfoliatis concoloribus & vix conspicuis Michel. Nov. Plant. Gen. pag. 33. v. 7. *Chamamelum luteum capitulo aphylo* C. B. Pin. 135. * *Chamamelum odoratum* Offic. Erba Appiohna vulgo

ANTIRRHINVM Ligustri folio, flore candido, labio inferiori circa rictum luteo, superiori vero lineis sanguineis variegato. * *Or Leonis floribus candidis* Casalp. 350

2. *Antirrhinum Leucii* folio, flore candido, labio inferiori circa rictum pallido

3. *Antirrhinum vulgare* Leucii folio, flore purpureo Inst. R. H. 168. * *Antirrhinum l. Matth.* 1255. *Or Leonis floribus roseis* Casalp. 350. Bocca di Leone vulgo

APARINE vulgaris annua maior asperima, spinulis tum in caulis tum in foliorum marginibus deorsum reflexis, flore albo, fructu hispidus spinis hamatis instructo. *Aparine vulgaris* C. B. Pin. 134. * *Aparine Matth.* 852. *An Aparine vulgo Asprella* Casalp. 324

2. *Aparine annua minor* praecox, spinis in caule deorsum, in foliorum marginibus transversum aut sursum inclinatis, flore albo, fructu villis aduncis exasperato

3. *Aparine femine laevi* Inst. R. H. 114

4. *Aparine femine Coriandri saccharati* Inst. R. H. 114

5. *Aparine minima* Bot. Momp. App. 291

APARINE. vid. RVBEOLA

APHACA vulgaris flore luteo, siliquis crassioribus & brevioribus, semine albo aut subcinereo licuris nigris distincto. *Aphaca altera semine albo, nigris maculis notato* Vir. Lust. *Aphaca semine vario* Casalp. 236. *Aphaca semine variegato* I. B. 2. 217. Descript.

APIVM hortense latifolium Inst. R. H. 305

2. *Apium hortense* seu *Petroselinum* vulgo Inst. R. H. 304. * *Apio Hortense*, *Petroselinum* Matth. 811. *Apio vulgare detto Prenzemolo* Ric. *Apium* Offic.

3. *Apium Macedonicum* Inst. R. H. 305. * *Petroselinum Macedonicum* Matth. 813. & Ric. *Petroselinum Macedonicum* Offic.

4. *Apium Pyrenaicum* Thapsia facie Inst. R. H. 305

5. *Apium palustre latifolium erectum*, ad alas floridum * *An Apium aliud spontaneum latifolium, umbellae in foliorum alis* Casalp. 299. *Apio Palustre* Ric. *Paludarium*. *Eleoselinum* Offic.

6. *Apium dulce*, *Celeri Italorum* Inst. R. H. 305. * *Sedano* vulgo

APOCYNVM erectum latifolium incanum Syriacum, floribus parvis obsoleto purpurascens Inst. R. H. 91

2. Idem foliis amplis subrotundis

3. Apo-

3. Apocynum erectum Africanum, villoso fructu, falicis folio glabro angusto Inft. R. H. 92. * Lino d' India vulgo

4. Apocynum sarmentis crassioribus & excelsis arborescendentibus, foliis rotundis glabris & glaucis, floribus candidis ad foliorum alas umbellatim ussecntibus, fructu An Apocynum folio subrotundo Inft. R. H. 92. * An Periploca non repens Casalp. 119

AQVILEGIA hortensis simplex, flore incarnato Inft. R. H. 428

2. Aquilegia sylvestris Inft. R. H. 428. * Aquilina Matth. 665. An Aquilegia, & Columbina Casalp. 589

3. Aquilegia hortensis multiplex, flore magno caeruleo Inft. R. H. 429 *

ARBVTVS folio serrato (fructu rotundo) Inft. R. H. 592. * Arbutum Matth. 291. Arbutus cuius fructus Avellana magnitudinem non excedit Casalp. 113. Vnedo Lob. Corbezzolo vulgo

ARISARVM latifolium alterum Inft. R. H. 161. * Arisaro Matth. 632. Arum paruum Casalp. 227

2. Arisatum Angustifolium Diofcoridis forte, corniculo purpurascete C. B. Pin. 197

ARISTOLOCHIA Clematidis recta Inft. R. H. 162. * Aristolochia, o Aristologia longa Matth. 685. Aristolochia tenuis, vel Clematidis, vel Saracenticus Offic. Aristologia Clematide Nostrale Ric.

2. Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro Inft. R. H. 162. * Aristolochia I, o Aristologia rotunda Matth. 684. Aristologia genus primum Casalp. 566. Aristologia rotunda Ric. Hac & sequens in Officinis promiscue usurpantur pro Aristolochia rotunda

3. Eadem pitalongo angusto flavescente flore, lingua ex purpura nigricante. An Aristolochia flore ex albo purpurascete Inft. R. H. 162

4. Aristolochia Piftolochia dicta Inft. R. H. 162

ARMENIACA fructu maiore rotundo, nucleo amaro * Hac & due sequentes Mala Armeniaca etiam vocantur, & Albicocche vulgo

2. Eadem fructu oblongo

3. Armeniaca Mala minora Inft. R. H. 624

ARTEMISIA vulgaris caule atro purpureo, ramis floriferis expansis, capitulis cernuis. An Artemisia vulgaris maior, caule & flore purpurascens Inft. R. H. 460. * Hac, & due sequentes promiscue usurpari possunt pro Artemisia Officinarum

2. Eadem caule ex viridi albicante capitulis surrectis * An Artemisia vulgaris, qua a quibusdam Canapasia vocatur Casalp. 478

3. Eadem caule ex viridi albicante, ramis floriferis surrectis non expansis, capitulis erectis

4. Artemisia Italica elatior, Delphinii folio viridi, inodora Vaill. Act. Ac. R. Sc. Auu. 1719. pag. 378. num. 24

ARVM Americanum Ari vulgaris facie, foliis carnosus obscure virentibus ucidis, in uncialem teretem & inermem sculeum desinentibus. An Arum. TAB. II
Amc.

Americanum folio angustiori nervoso sagittato molliori, apice acutissimo Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 74. num. 11

Pulcherrimam hanc plantam Michelio communicavit Illustrissimus D. Comes Ioseph Zinanius Prosperi fil. Ravennas, qui inter cetera quibus commendandus est animi sui ornamenta, paucis ab hinc annis ad Rerum Naturalium ac Plantarum presertim studium applicare cepit animum, adeoque sedulus & diligens fuit ut Ravennae privatum hortum selectissimarum plantarum copia instructissimum iam habeat; magnam preterea apud eruditos gratiam promeritus sit ob editas observationes suas circa locustas, & diversarum avium ova nidisque. Hoc igitur Arum in hortum Florentinum translatum primum floruit inenite Maio anni 1737. Flor crasso longo rectoque pediculo insident supra foliorum comam eminebat; Petalo (si tamen ita appellandum est) carnoso ovali oblongo constabat intus candido exterius & viridi albicante, cuius una extremitas petiolo affixa & arte complicata erat, deinde vero sensim sensimque dilatabatur adeo ut cyathum conicum referret, margine ex una parte prolixiore Aristolochiae Clematidis florum instar, & in oblongum mollemque aculeum abeunte. Pistillus Ari vulgaris forma & magnitudine in fundo floris surgebat. Fructus observare non licuit, cum Flor ab imperito quodam decerpitur intempestive fuerit

2. Arum vulgare non maculatum Inst. R. H. 158. Arum. Aron Offic. Gichero vulgo ut & tres sequentes

3. Arum maculatum maculis candidis Inst. R. H. 158. * Aron Matth. 624. Gichero maculis candidis Casalp. 226

4. Arum maculatum maculis nigris Inst. R. H. 158. * Gichero maculis nigris Casalp. 226

5. Arum minus maculis amplioribus albidis, & maculis nigris perexiguis notatum

6. Arum Ægyptiacum florigerum & fructum ferens, radice magna orbiculari Inst. R. H. 159. * Colocasia Marc. 118. Aron d' Egitto Matth. 450. Aron magnum Casalp. 227. Faba & Lotus Ægyptia quorundam

ARVND sativa, quæ Ἀρούρα Diofcoridis & Theophrasti Inst. R. H. 526. * Harundo Marc. 55. Canna Matth. 164. Calamus sive Harundo crassa Casalp. 186. Canna vulgo

2. Arundo maxima, & hortensis, radice crassa & pinguiore, ex Monte Argentario proveniens, pro Cinæ radice usitata H. Pil.

3. Arundo vulgaris sive γυνώρις Diofcoridis Inst. R. H. 526. * Canna Palustre Matth. 165. Calamus seu Harundo alia gracili calamo Casalp. 186

4. Arundo variegata angustifolia * An Canna vel Arundo tota nivea & foliis & caule Mentis. Pug. quam in hoc ipso horto Florentino observavit

5. Arundo semisarcita Rheni Bononiensis Plinii Mont. Cat. Scirp. Agr. Bon. Prodr. 32. * Harundo Rheni Bononiensis sarcita Plinii Casalp. 187

6. Arundin sarcita Vallium Ravennæ Mont. ibid.

ASARVM Inst. R. H. 501. * Asarum Matth. 40. & Ric. Asarum Casalp. 389. Baccaris, Vulgago, Perpenfa, Nardus Rustica, Sanguis Martis Franc.

ASCLEPIAS albo flore Inst. R. H. 94. Vincetoxicum Matth. 855. Asclepias Casalp. 269. Asclepias. Vincetoxicum. Hirundinaria Offic.

2. Asclepias flore albo, umbilico atropurpureo

3. Ascle-

3. *Aclepias nigro flore* Inst. R. H. 94
4. *Aclepias Africana Aizoides* Inst. R. H. 94

ASPARAGVS *lativa*, foliis tenuissimis sparsis, flore longiore * *An Asparago* Mattb. 505

2. Eadem foliis crassioribus non ita sparsis, flore brevior. *Asparagus sativa* Inst. R. H. 300. Tab. 154. A. * *Hæ dua Asparagi species promiscue usurpantur pro Asparago Offic. & Sparagi Ric.*

3. *Asparagus sylvestris*, tenuissimo folio (fructu crassiore) Inst. R. H. 300. * *Asparago salvatico* Mattb. 506

4. Eadem fructu patvo. * *An Asparagi genus tertium* Casalp. 217

5. *Asparagus foliis acutis* Inst. R. H. 300. * *Asparagus* Casalp. 217. *Asparagus petraeus*. *Corruda* C. B. Pin. Spazzole vulgo

6. *Asparagus Africanus scandens Myrti folio angustiore* H. Pis.

ASPHODELVS *maritimus maximus*, radice *Buxea* ferme insipida, foliis sesquialunciam latis, caule ramoso, floribus albis, fructu exiguo, semine cinereo nigris maculis distincto. *Asphodelus in Maritimis caule nudo ramoso, floribus candidis, radicum bulbulis interna parte croceis* Casalp. 415

2. *Asphodelus montanus maior*, radice ferrida cum bulbulis externe albidis, interne buxeis, caule ramoso & non ramoso, foliis unciam latis, floribus albis, fructu rotundo crassiore, semine cinereo nigris maculis distincto. *Asphodelus in Alpibus, caule simplici, floribus candidis, fructu rotundo, magnitudine Faba* Casalp. 415. * *An Asphodeli* Mattb. 634. *Hæ dua Asphodeli species in Officinis promiscue vocantur* *Hastula Regia, Asphodelum, Asphodellum*

3. *Asphodelus Apulus albus ramosus minor*, foliis luncceis. * *An Pbalan-gii alterum genus in Sicilia* Casalp. 416

4. *Asphodelus luteus & flore & radice* Inst. R. H. 343. * *Asphodelus luteus* Casalp. 416. *Asphodelo che fa i fiori gialli a modo di stella* Mattb. 635

5. *Asphodelus Zeylanicus*, foliis rotundis cepaceis, floribus luteis H. Pis.

ASPLENIVM sive *Ceterach* Inst. R. H. 544. * *Scolopendria* Marc. 213. *Cetrach* Casalp. 595. *Aspleno* Mattb. 940. *Cetracca Ric.*

2. *Asplenium ramosum* Inst. R. H. 544. * *Lousbite aspera falsa* Mattb. 974

ASTER *omnium maximus*, *Helenium* dictus Inst. R. H. 483. * *Elenio* Mattb. 79. *Euula* Casalp. 499. *Euula*, & *Henula Ric.* *Euula Campana*, & *Iunla Offic.*

2. *Aster luteus radice odora* Inst. R. H. 482. * *Intenfaria* Casalp. 496

3. *Aster maritimus Salicis longo glabro auriculato ac subtilissime denticulato folio, floribus luteis, semisfoliis septem lineas longis & semilineam latis. Au Aster montanus luteus Salicis glabro folio* C. B. Pin. 266. *Morif. Hist. Oxon. Pars. 3. fess. 7. Tab. 21. fig. 10. Aster IIII. Austriacus II. Clus. Hist. XIII.* * *Aster Offic.*

4. *Idem semisfoliis decem lineas longis, & semilineam latis*

5. *Aster Montanus Italicus luteus, foliis brevioribus & rigidioribus ferratis, floribus umbellatim compactis* Michel. H. Pis. *Helenium Spiræ folio* Vail. Ac. R. Sc. Ann. 1720. pag. 392. num. 15. *Couyza media Monspeliensi affinis multiflora* L. B. 2. 1049

6. *Aster palustris luteus*, folio longiori lanuginoso Inft. R. H. 483. * *Briannica* Lngd.
7. *Aster* III. *Pannonicus Clusii luteus*, folio hirsuto *Salicis* I. B. 2. 1047.
8. *Aster pratensis Autumnalis*, *Conyze* folio Inft. R. H. 482. * *Coniza mezzana* Matth. 920. *Aster alio similis alter* *Casalp.* 496. *Mentha lutea* Lom. *Camilago Plinii* C. B. *Conyza media* Offic.
9. *Aster maritimus folio tereti crasso tridentato* Inft. R. H. 483. * *Crisbano* III. Matth. 520
10. *Aster* Novæ Angliæ altissimus hirsutus (foliis *Salicis* caulem amplexantibus) floribus omnium maximis purpureo-violeaceis Inft. R. H. 482
11. *Aster maritimus palustris ceruleus Salicis* folio Inft. R. H. 481. * *Tripolium* Offic.
12. *Aster Tripolii flore* Inft. R. H. 481. * *An Linaria Tripolii flore* Donn. Cat. H. Flor.
13. *Aster Virginianus ramosissimus serotinus*, parvis floribus albis Trade-
scanti Morif. Hilt. Oxon. Part. 3. 121. num. 43
14. *Aster Chenopodii folio flore ingenti specioso* H. Elth.

ASTERISCVS annuus, foliis ad florem rigidis Inft. R. H. 497. * *Vn aliro* *Aster Attico* Matth. 1235. *Aster Atticus* *Casalp.* 495
 2. Idem perennis. *Asteriscus perennis folio odorato, flore rigido* Michel Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. 105
 3. *Asteriscus annuus*, foliis ad florem rigidis, flore sulphurei coloris Inft. R. H. 497
 4. *Asteriscus annuus aquaticus petulus* Inft. R. H. 498. *Astero Attico* annuo odorato di Candia Zann. 30

- T A B. III.** **ASTEROIDES** hirsuta latifolia Patavina (flore luteo, semisflosculis septem lineas longis scissilineam latis, feminibus triangularibus brevissime coronatis ac binis plerumque aristis armatis) Michel. H. Pf.
- T A B. IV.** dum nonnihil erenato, flore luteo, semisflosculis octo lineas longis & semilineam latis, feminibus scissilinearibus brevissime coronatis ac longiuscula arista munitis. *Aster montanus saxatilis luteus, angusto acuto nervoso & molli Plantaginis folio, multicaulis* Bocc. Musf. Part. 2. 31. Tab. 18
- T A B. V.** 3. *Asteroides Alpina glabra*, *Salicis* folio angusto peracuto, flore luteo, semisflosculis novem lineas longis & semilineam circiter latis, feminibus longis altius coronatis, ac unica, interdum binis aristis armatis. *Asteriscus perennis, Salicis glabro folio* Vaill. alt. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 430. *Asteroides Alpina Salicis folio* Coroll. Inft. R. H. 50

In tribus histe *Asteroidum* Tabulis fig. a semina marginalia representant, quæ brevia sunt, pyramidata triangularia, facie qua calyxi incumbunt latiore & gibba; valde item umbilicata, seu membrana quadam rigidiuscula & pellucida, non autem aristis villisque coronata. His semisflosculis b insidet. Fig. cæcæ exprimit semina quæ in disco sunt, longiora & angustiora, triangularia pyramidata, & varie in singulis speciebus coronata. d semisflosculus est ovo seu embryoni insident. Semina qualibet inter se distinguuntur foliolis & imbricatis in acumen rigidiusculum defluentibus ut in *Antemide*. Omnia autem hæc per microscopium ampliata sunt

ASTRA.

- ASTRAGALVS tuberosus scandens Fraxini folio Inst. R. H. 415
 2. Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris, sive sylvestris Inst. R. H. 416
 3. Astragalus luteus annuus Monspeliacus procumbens Inst. R. H. 416
 4. Astragalus luteus perennis, filiqua gemella rotunda velicam referente Inst. R. H. 416. * *Ceci saluaticibi* Matth. 443
 5. Astragalus Monspelulanus Inst. R. H. 416
 6. Astragalus triangularis Munting. Phytograph. Tab. 110. *Securidaca Sicula, filiquis foliaceis* Boec. *Rarior. Plant.*

ASTRANTIA maior corona floris purpurascens Inst. R. H. 314. * *Veratrum nigrum*, & *Elleborus niger* Diosc. *Gesf. Sanicula fumina* Fuchf.

- ATRIPLEX latifolia sive Halimus fruticosus Inst. R. H. 505. * *Halimus alter latiore folio* Casalp. 160
 2. Atriplex maritima frutescens sempervirens, foliis Oleæ angustioribus & candicantibus, fructu cordato tuberculoso. *An Portulaca Marina fruticosa* l. B. 1. 219. * *Hec & sequens Portulaca Marina*, in Offic. vocantur
 3. Eadem fructu levi. *Halimus primus, tenuiori folio* Casalp. 160. *Halimus Eiusdem* in H. Sicc. pag. 61. num. 153. *An Portulaca Marina fruticosa* l. B. 1. 219
 4. Atriplex folio hastato seu deltoide Inst. R. H. 505
 5. Atriplex Orientalis frutex aculeatus, flore pulchro Coroll. Inst. R. H. 38

AVRANTIVM maximum Ferr. Hesper. 437. 439. 441. Arancio di fructo grossissimo vulgo

2. Aurantium Hierichuntium (fructu rotundo) cortice tenuiori (lævi) medulla dulci rubente H. Pis. 21. Tab. 16. Arancio di sugo rosso vulgo

3. Aurantium ficciore medulla hibernum Ferr. Hesper. 374. & 379. *An Aurantium maximum verrucoso cortice* Volk. Hesper. Norimb. Tom. 2. 176. & *Clarici* pag. 139

4. Aurantium Olyssiponenſe Ferr. Hesper. 425. *Aurantium Lusitanicum* Volk. Hesper. Norimb. 193. Arancio di Portogallo vulgo

5. Aurantium Acri medulla, vulgate Ferr. Hesper. 374. & 377. *Aurantium pomi acidi ferax* Volk. Hesper. Norimb. 187. * *Aurantium succo intus acido* Casalp. 141. *Aurantium. Mala Aurantia. Mala Aurea* Offic. Arancio forte vulgo

6. Aurantium dulci medulla, vulgate Ferr. Hesper. 374. & 377. *Aurantia fructu dulci* Volk. Hesper. Norimb. 187. 188. * *Aurantium succo intus dulci* Casalp. 141. Arancio dolce vulgo

7. Aurantium vulgare medulla mediis saporis Ferr. Hesper. 374. *Aurantia fructu saporis mediis sive dulcicido* Volk. Hesper. Norimb. 187. * *Aurantium succo intus mediocri* Casalp. 141. Arancio di mezzo sapore vulgo

8. Aurantium admodum florigerum, fructu subrotundo quasi sessili, leviter verrucoso, in fine circulo nonnihil prominente instructo, cortice trilineari, medulla amaradulci. Arancio da fiori nostrale vulgo. * *An Arancio Ric.*

9. Aurantium sylvestre Volk. Hesper. Norimb. 187. Arancio Salvatico vulgo

10. Aurantium Sinenſe Ferr. Hesper. 430. & 433. *Aurantium Sinenſe pumilum* Volk. Hesper. Norimb. 277. & 207. * Arancio della China vulgo

et. Au-

11. Autantium foliis subrotundis crispis confertim nascentibus, flore albo parvo odorato & caduco, fructu aureo orbiculato, pulpa acida. *Autantium crispo folio* Ferr. *Hesper.* 389. Arancio riccio vulgo

AVRICULA Vrfi maxima, latioribus & longioribus foliis, flore luteo H. Mauroc. *Auricula Vrfi omnium maxima, non descripta* Don. Cat. Plant. H. Flor. & Raii *Hist. Tom.* 3. 576. H. Pisf. 21

2. Auricula Vrfi flore magno atropurpureo holoserico simplici, umbone candido amplissimo *Inst. R. H.* 120

AZEDARACH *Inst. R. H.* 616. * *Sicomoro falso* Matth. 307. *Taber Cast.* 107. *Zizypha candida* Lob. *alba* Lugd. *Pseudo-scomorus* Cast.



ALLOTE Matth. 872. *Inst. R. H.* 185. * *Ballote, Cimiciottum* vulgo *Casalp.* 445. *Marrubium nigrum & fatidum* Offic.

2. Ballote flore albo *Inst. R. H.* 185

BALSAMINA sermima *Inst. R. H.* 418. * *Balsamina secon-*
da Matth. 1350. *Catanance* vulgo *Balsaminum* *Casalp.* 266. *Be-*
ghomini vulgo

2. Balsamina sermima flore candido *Inst. R. H.* 418

3. Balsamina sermima flore partim candido partim rubro *Inst. R. H.* 418

4. Balsamina flore maiore specioso *Inst. R. H.* 418

5. Balsamina Indica flore ex albo & suave purpurascens colore elegantissime variegato *Inst. R. H.* 419

6. Balsamina Indica flore rubente pleno *Inst. R. H.* 419

BALSAMITA maior Dod. *Pempt.* 205. *Vaill. Ad. Ac. R. Sc. Ann.* 1719. pag. 369. num. 1. *Tanacetum bortenfe foliis & odore Mentha* *Inst. R. H.* 461.

* *Mentha Greca* Matth. 753. *Herba S. Maria* *Casalp.* 483. *Costus Hortorum* *Gesn. Mentha Corymbifera* Cord. *Mentha Sarracenicæ* Ang. *Mentha Græca* Cast.

2. Balsamita foliis Agerati *Vaill. Ad. Ac. R. Sc. Ann.* 1719. pag. 369. num. 2. *Bellis spinosa foliis Agerati* C. B. *Pin.* 262

BARBA Capræ præcox, foliis costæ ramisque inascentibus minoribus & ad Carpinum accedentibus, floribus albis, petalis ex angusto principio sensim ad extremitatem dilatatis & rotundatis, staminibus longioribus. *Barba Capræ, floribus oblongis* C. B. *Pin.* 163. *Inst. R. H.* 265. *Barba Capri* I. B. 3. 488. *Dryopogon* I. *Tabern. Icon.* 777. * *Barba Caprina* Offic.

2. Eadem Seroicosa, foliis maioribus altius incisus, floribus albis, petalis subrotundis, staminibus a centro vix se attollentibus *An Dryopogon* II. *Tabern. Icon.* 778

BAR-

BARBA Iovis pulchre lucent Inft. R. H. 651. * *Barba Iovis* *Cafalp.* 118
2. Barba Iovis Americana herbacea trifolia, floribus cæruleis spicatis. *Trifolium Americanum* C. B. Pin. 327

BARBAREA maior, foliis in paucos & ampliores lobos divifis, floribus luteis, filiquis craffiusculis unciam longis ad caulem contractis

2. Eadem foliis in oblongos lobos divifis, filiquis brevioribus ad caulem non contractis

3. Barbarea; quæ Sifymbrium Orientale Barbareae facie Plantaginis folio Coroll. Inft. R. H. 16

4. Barbarea foliis minoribus & frequentius finuatis Raii Hift. Tom. 1. 809

BELLADONA maioribus foliis & floribus Inft. R. H. 77. * *An Solatrum mains* *Cafalp.* 212. *Solanum melanoceraſion*, vel *manicum*, vel *lethale Offic.*

BELLIDASTRUM Alpinum glabrum, foliis brevibus hirtutis, caule palmari, flore albo Michel. Nov. Plant. Gen. 32. num. 1

BELLIS maior hirtuta hiemalis multiflora, floribus cum duplici femiſſoculorum ferie inferne rubentium deſuper alborum. *An Bellis minor autumnalis* *Monanthes*, caule nudo tenui prælongo, flore ex albo rubente Raii Hift. Tom. 3. 221. * *Symphytum minimum*. *Conſolida minima* & *minor*. *Primula æris Offic.*

BERBERIS dumetorum Inft. R. H. 614. * *Creſpino* *Matth.* 182. & *Cafalp.* 99. *Berberis vulgare* o *Creſpino* *Ric. Oxyacantha* *Galenii Cord. Spina acida* *Brunf. Berberis Offic.*

BERMYDIANA Iridis folio, fibroſa radice (flore cæruleo) Inft. R. H. 388

BETA Communis, ſive viridis C. B. Pin. 502. *Beta nigra* L. B. 2. 961. *Beta folio brevior* & *rotundior* *Cafalp.* 159. *Bietola vulgo*

2. Beta pallide virens maior Inft. R. H. 502

3. Beta ſylveſtris maritima Inft. R. H. 502

BETONICA foliis hirtutis, floribus purpureis ampliffimis Menz. Pug. *Betonica ampliffima*, Alpina *Bellucc. H. Piſ.* *An Betonica rubicundiffimo flore* *Montis Anres* Inft. R. H. 203

2. *Betonica Alpina latifolia* maior villoſa, flore luteo Inft. R. H. 203

3. *Betonica purpurea* Inft. R. H. 203. * *Betonica* *Matth.* 994. *Cafalp.* 444 *Ric. & Off. Bectonica vulgo*

4. *Betonica arvenſis annua*, flore ex albo flaveſcente Inft. R. H. 203. * *Siderite ſecunda* *Matth.* 1057

BETULA Inft. R. H. 588. * *Betula* *Matth.* 158

BIDENS Virginiana altiffima, alato caule, foliis longis ſperis integris alernacim poſitis, floribus luteis umbellatis, ſemiſſoculis amplioribus ſemper quinis, ſoculorum vaginulis nigricantibus, ſemine lato marginato binis corniculis inſtruito. *Ceratocephaloides altiffima longifolia* *Vaill. in Aſſ. Ac. R. Sc. Ann.* 1720. pag. 425. num. 2

2. Bi-

2. *Bidens palustris* annua, caule rotundo purpurascente circa radicem nonnihil villosa, foliis longis integris rarius serratis, flore luteo specioso nutante, femine quatuor aristis munito. *Bidens folio aem dissecto* *Casalp.* 488. *Infl.* R. H. 462. *Bot. Par.* 21. *num.* 1

3. *Bidens Palustris* annua, caule anguloso, foliis oblongis integris & serratis, flore parvo luteo minus specioso erecto, femine binis aristis armato. *As Bidens folio non dissecto* *Casalp.* 488. *Eupatorium Cannabium femina septentrionalium, stellato & odorato flore* *Lob. Icon.* 529

4. Eadem foliis in tres partes tantum divisus & leviter serratis. *An Bidens foliis tripartito divisus* *Casalp.* 488. *Infl.* R. H. 462

5. Eadem foliis quinquepartitis angustis & leviter dentatis * *Hec & dua sequenter in Officiis promiscue vocantur Verbenae supina* *Trag. Verbefina* *Gesf. Et Cannabina aquatica* C. B.

6. Eadem foliis quinquepartitis laciusculis altius dentatis. *An Bidens foliis tripartito divisus* *Casalp.* 488. *Infl.* R. H. 462

7. Eadem Ebuli folio

8. *Bidens palustris* annua, foliis latis brevibus altius dentatis & quandoque incisis, imis integris, superioribus trilobatis, flore luteo nudo, femine bidentato

9. *Bidens Americana* Apii folio *Infl.* R. H. 462

BIGNONIA *Americana* Fraxini folio flore amplo phœniceo *Infl.* R. H. 164. * *la/minum bederaceum Iadicum* *Corn.*

2. *Bignonia Americana* (tetraphylla) capreolis donata, siliqua brevior *Infl.* R. H. 164. * *Clematide tetraphylla Americana* *Zaan.*

BISTORTA maior radice minus intorta *Infl.* R. H. 511. * *Bistorta*, *Matth.* 997. & *Casalp.* 167. *Bistorta*. *Calabrina*. *Bulapatum* *Offic.*

BLATTARIA maxima annua, foliis amplioribus acutis rugosis serratis & non splendentibus, floribus luteis solitariis pedicello quasi orbatis. *An Blattaria* *Matth.* 1210. *Ed. Valgrif. in fol. Ann.* 1585. *Dod. Pempt.* 145. *Lngd.* 1305. *Lob. Obs.* 304. *Blattaria Plinii* *Ger. Emac.* 776. *Lob. Icon.* 564. *Blattaria altissima Verbasii Maris foliis viridibus* *H. Cathol. suppl.* pag. 96. *Blattaria Mandragora folio rugosissimo lucido, flore lutescente maximo* *H. Psf.*

2. *Blattaria* annua, foliis longis splendentibus usque ad costam sere laciniatis, floribus luteis longo pedicello fultis. *An Blattaria lutea folio longo laciniato* C. B. *Piu.* 241. *Blattaria lutea* I. B. 3. *App.* 874. *Descript.*

3. Eadem floribus albis

4. *Blattaria* annua, foliis longis splendentibus serratis, interdum per basim nonnihil laciniatis, floribus luteis solitariis longo pedicello fultis. *Blattaria flore luteo* *Ger. Emac.* 778. *Perk. Theatr.* 64. *Verbasum novum* *Casalp.* 347

5. Eadem flore albo

BLITVM sylvestre rubrum minus, foliis Ocimi confertioribus, interdum pluribus macentis nigris & exiguis notatis, floribus secundum caulis longitudinem ad foliorum exortum glomeratim nascentibus, femine nigro splendente. *An Blitum obscure virenti, Ocimi medio folio, non spicatum, seu Helxine veluti Lappulis infestum* *H. Cathol.* 30

2. *Blitum maritimum* annuum erectum minus, caulibus albicantibus, ramis longioribus & crebrioribus, foliis subrotundis parvis glaucis longo pedicello

culo donatis, floribus candidis ad foliorum alas inter molliter aculeata foliola exeuntibus, fructu oblongo coronato, semine nigro splendente. *Elitum Maritimum minus, calyculis aculeatis* Michel. H. Pif.

BOLETVS parvus, pileolo griseo suboscuro longo & angusto ac in metæ formam fastigiato, costis per longitudinem, & transversalibus scrobiculis undique cellulato, pediculo albo

BORRAGO floribus cæruleis Inst. R. H. 133. * *Buglossa vera* Matth. 1245. *Borrage floribus cæruleis elegantissimis* Casalp. 433. *Borrana*, & *Borrana Domestica* Ric. *Buglossum latifolium*, & *Borrage* Offic.

2. *Borrage floribus albis* Inst. R. H. 132. * *Borrage floribus candidis* Casalp. 433.

BRASSICA Campestris perfoliata flore albo Inst. R. H. 220. * *Perfoliata filiquosa* Lob.

BRVNELLA maior & elatior, folio longo latiore ac utrinque acuminato, flore ex cæruleo purpurascente. *Brunella flore minore vulgaris* L. B. 3. 428. *sed* Icon. *Prunella vulgaris* Trag. 320. Icon. *Prunella Fusteb.* 621. * *An Consolida minore* Matth. 1014. & Ric. *Prunella*, *Morella*, *Herba Mora*, *Consolida minor* Casalp. 453

2. *Eadem* nonnihil humilior, foliis brevioribus & ad petiolum obtusis. *Brunella flore minore vulgaris* L. B. 3. 428. *Descript.* *Brunella maior folio integro, seu non dissecto* Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 363. *Sell.* XI. Tab. 5. fig. 11. *Prunella* Dod. Pempt. 136. *Prunella Consolida minor* Tabern. Icon. 553. *Symphytum petraum*, *Consolida minor* Matth. Lob. Icon. 474. *Cast.* 146. * *Prunella*. *Symphytum minus* Offic.

3. *Eadem* minor serocina, foliis ad petiolum acuminatis, flore parvo

4. *Brunella* cæruleo magno flore Inst. R. H. 182

5. *Brunella* foliis imis integris, superioribus laciniatis, flore albo. *Brunella folio laciniato, flore albo* Inst. R. H. 183

6. *Eadem* foliis imis longioribus & angustioribus, flore albedo. *Prunella* Ill. Tabern. Icon. 354

BRYONIA aspera sive alba, baccis rubris Inst. R. H. 102. * *Vite bianca*, ovvero *Erionia* Matth. 134. *Eryonia* Casalp. 205. *Erionia* Ric. *Bryonia* Offic.

BVGLOSSVM latifolium sempervirens Inst. R. H. 134. * *An Buglossa Hispanica* Casalp. 433

2. *Buglossum angustifolium maius, flore cæruleo* Inst. R. H. 134. * *Buglossa vulgaris* Matth. 1246. *Buglossa quasi Lingua Bovina* Casalp. 432. *Buglossa* Ric. *Buglossum*, *Lingua Bovis*, & *Lingua Bovina* Offic. ut & numer. 7. & 8

3. *Buglossum angustifolium minus, flore albo* Inst. R. H. 134

4. *Buglossum sylvestre minus, flore azureo, radice perenni italicum* Barr. Icon. 333

5. *Buglossum Creticum maius, flore cæruleo purpurascente* Inst. R. H. 134

6. *Buglossum Creticum maius flore albo* Inst. R. H. 134

C

7. Bu-

7. Buglossum Italicum perenne & admodum villosum, Echii folio, flore violaceo interne holosericeo, calyce velicario. *An Buglossum sylvestre, maius, nigrum* C. B. Pin. 236. *Inst. R. H. 134. * Vn altra Buglossa col flore negro* Mattb. 124

8. Idem Echii bullato undulato dentatoque folio, minus villosum, flore intense violaceo quasi nigricante ac interne holosericeo

9. Buglossum arvense annuum, Lithospermi folio (flore albo) *Inst. R. H. 134. * Anchusa differentia tertia Casalp. 435. Lithospermum sylvestre Trag.*

BVGULA sylvestris villosa flore caeruleo *Inst. R. H. 209*

2. Bugula maior glabra, foliis oblongis inferne tantum vel undique plerumque purpurascens, floribus caeruleis. *Consolida media quiburdam Bugula* L. B. 3. 430. *Fig. 2. * Consolida media* Mattb. 2013. *Consolida mezzana* Cast. 134. & *Ric. Hac & sequens Bugula, Consolida media, Herba Laurentiana, sen S. Laurentii, & Herba Mora in Offic. vocantur, & vulgo Erba Mora*

3. Bugula media glabra, foliis brevibus subrotundis obscure virentibus & quasi lucidis, nunquam inferne purpurascens, floribus caeruleis. *Consolida media* Fuchs. Hist. 391. *Consolida media quiburdam Bugula* L. B. 3. 430. *Fig. 1. An Bugula minima glabra, flore caeruleo* Barr. Obs. 37. *Icon. 337*

4. Eadem floribus roseis

BVPHTHALMUM Tanacetii minoris foliis *Inst. R. H. 495. * An Chrysanthemum Casalp. 494*

2. Idem majus. *Chrysanthemum Tanacetii folio, flore albo, montanum, Italicum* Barr. *Icon. 466. An Buphtalmum Alpinum flore candido Trinmf. Obs. 79*

BVPLEVROIDES quæ Simpla Nobis Canariensium Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. Part. 1. 72

BVPLEVRVM arborecens Salicis folio *Inst. R. H. 310. * Sefeli Æthiopico* 11. *Mattb. 794. Planta altera quæ pro Sefeli Æthiopico ostenditur Casalp. 296. Sefeli Æthiopicum Offic.*

2. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum *Inst. R. H. 310. * Perfoliata* Mattb. 215. & *Offic.*

BVRSIA PASTORIS maior, folio sinuato *Inst. R. H. 216. * Bursa pastoris* *Casalp. 365. Mattb. 601. & Offic.*

2. Bursa pastoris eleganti folio instar Coronopi repentis *Inst. R. H. 216*

BVXVS arborecens *Inst. R. H. 578. * Buxus Casalp. 126. Boffo* Mattb. 208. *Buxus Offic. Boscolo vulgo*

2. Buxus foliis rotundioribus *Inst. R. H. 579*



ACALIA Alpina foliis crassis serratis & inferna parte hirsutis, floribus purpureis umbellatis. * *Cacalia Casalp.* 459

1. Eadem præalta, Petasididis foliis crassis subtus canescentibus & tomentosis. An *Cacalia foliis crassis hirsutis Insl. R. H.* 453

CACHRYS Peucedani folio eraffiore & rigidior, segmentis teretibus, umbellis lateis ad singulos nodos radiatim seu rotatim nascentibus, semine longo fulcato & undique aspero. *Cachrys semine fungoso fulcato aspero, foliis Peucedani latiusculis Mor. Vmb.* 62. *Cachrys semine fungoso fulcato aspero Eiusd. Tab.* 3

2. Eadem semine longo fulcato, ingis seu costis aculeis longis & non exantibus Caulalidis instar insignitis

3. *Cachrys Sicula* foliis Pastinacæ latifoliæ, semine fulcato & hirsuto Mor. Part. 3. 277. Sect. 9. Tab. 1. fig. 4

4. *Cachrys Cretica* Angelicæ folio, Asphodeli radice (semine fulcato aspero & nigricante) Coroll. Insl. R. H. 23

CALAMINTHA præstantior magno flore Insl. R. H. 194. * An *Calamentum montanum Casalp.* 472

2. *Calamintha vulgaris*, vel officinarum Germaniæ Insl. R. H. 194. * *Calamintha montana Matth.* 756. & Offic.

3. *Calamintha Pulegi* odore, live *Nepeta maior vulgaris*

4. Eadem foliis latis circinatis. An *Calamintha I. Matth.* 755

5. Eadem minor floribus exiguis

6. Eadem foliis latissimis fere rhomboidalibus petiolo longo donatis, floribus longiore petiolo fultis

7. *Calamintha frutescens* Satureiæ folio facie & odore (floribus candidis) Insl. R. H. 194. *Thymbra* Offic.

8. *Calamintha humilior* folio rotundior Insl. R. H. 194. * *Hedera Terrestris* Matth. 662. *Hedera Terrestris Casalp.* 452. & Offic. *Chamaciffo* Dod.

CALAMVS AROMATICVS vulgaris, mukis Acorum Michel. Nov. Plant. Gen. Part. 1. 33. * *Planta quæ apud Serenif. Mag. Ducem vires, & cuius radices vulgo pro Calamo Aromatico venduntur Casalp.* 425. *Acoro Matth.* 23. *Acoro, & Calamo Aromatico delle Spezierie ne' Giardini di S. A. Ric.*

CALCITRAPA vulgaris lutea alato caule Vaill. in A& Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 211. num. 21. * *Spina Solstitialis* Dod.

CALCITRAPOIDES Rapi folio alato caule, flore purpureo coronato Vaill. in A& Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 213. num. 1

2. *Calcitrapoides canescens* Sonchi folio, alato caule, capite (maiore) turbinato Vaill. in A& Ac. R. Sc. An 1718. pag. 214. num. 11. 13

3. *Calcitrapoides*; an maritima canescens Cichorii folio, capite magno Vaill. in A& Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 214. num. 9

CALTHA maritima sempervirens & semperflorens. * *Hæc pro Calendula & Caltha Offic. usurpari potest*

CAMPANULA pyramidata altissima Inst. R. H. 109

2. Campanula Alpina non ramosa maxima subhirsuta, foliis Vrticæ, floribus cæruleis solitariis amplis pendulis & uno versu dispositis. *An Campanula maxima foliis latissimis, flore carneo Inst. R. H. 108*

3. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, cæruleo Inst. R. H. 109. * Medio oværo *Viola Mariana* Matth. 1040. *An Rapunculi genus grandius, floribus purpureis Casalp. 385*

4. Campanula hortensis, Rapunculi radice Inst. R. H. 109

5. Campanula sive Cervicaria Bononiensis, parvo flore Inst. R. H. 109

6. Campanula Alpina, foliis Vrticæ longioribus & asperis, rarius dentatis, floribus cæruleis uncialibus uno versu dispositis & in foliorum alis glomeratim nascentibus, calyce patulo. * *Hæc, & quatuor sequentes, Cervicaria, & Archangelica in Offic. vocantur*

7. Eadem foliis Vrticæ angustis pyramidatis crebro & læviter dentatis, calyce clauso

8. Eadem arvensis Vrticæ foliis brevioribus asperis & altius incis, floribus parvis, calyce clauso

9. Eadem arvensis Vrticæ folio angusto aspero & læviter crenato, calyce clauso

10. Campanula saxatilis Beticæ folio lævi, margine aspero, floribus cæruleis parvis glomeratis, semine marginato

11. Campanula Perlicæ folia, flore albo Inst. R. H. 111

12. Campanula minor rotundifolia vulgaris Inst. R. H. 111

13. Campanula arvensis erecta Inst. R. H. 112. * *Elatine Casalp. 387. Speculum Veneris Ger. Pentagonion, Viola Pentagonia Tabern.*

CAMPHORATA Maritima hirsuta perennis humi strata, Iuniperi folio, fructu bilineari & veluti birostrato, semine ferri Equini figuram mentiente. *An Campborata hirsuta C. B. Pin. 86*

CANNABINASTRUM annuum flore prorsus albo

2. Idem flore albo, labio inferiori venis purpureis distincto

3. Idem flore prorsus purpureo

4. Cannabinastrum annuum, Parietariz folio, flore purpureo cum labio inferiori circa faucem duntaxat variegato. *Cannabinastrum est novum planta genus a Michælo constitutum in Enumeratione rariorum plantarum sibi per Italiam & Germaniam observatarum, ut a Galeosfidibus Galeobdolis Ladanis & Asphaltis plantas quasdam verticillatas melius distingueret. Huius characteres sunt, facies quadam propria, flos galeatus cuius labium inferius papillatum, calyculorum ora fimbriata ac teretibus & a se invicem distantibus aculeis munita, tandem verticilli florum ad basim spinis circumdati. Hæc vero nota cum Iconibus & descriptione octo specierum claris proponuntur in supra-dicto Michælii Opere possumo, ad cuius editionem parandam studium ac laborem meum omne libentissime conferam simul, ac publici iuris fecerim alteram partem Eius Novorum Generum Plantarum*

CANNACORVS latifolius vulgaris Inst. R. H. 367. * *Canna Indica Casalp. 420*

2. Can-

2. Cannacorus flore luteo punctato Insl. R. H. 367

CAPPARIS folio acuto Insl. R. H. 261. * pro Cappari Offic. usurpatur

CAPRIFOLIUM Germanicum Insl. R. H. 608

2. Caprifolium Italicum perfoliatum subhirsutum & serotinum, foliis oblongis. Vincibosum Casalp. 207. * Hac, & sequentes Caprifolii species in Offic. nostris promiscue usurpantur pro Periclymeno & Caprifolio, vocanturque vulgo Madrefelva & Vincibosco

3. Caprifolium Italicum perfoliatum angustifolium sempervirens, foliis inferna parte incanis superne glaucis & quasi lucidis. Periclymenum petraum perfoliatum humile, foliis inferioribus candicantibus, superne lucido virore splendentibus H. Meff.

4. Caprifolium Italicum (perfoliatum serotinum & glabrum) Insl. R. H. 608. * Periclymeno Matth. 1025. Madrefelva di fiori gialli Ric.

CARDAMINE montana Afari folio Insl. R. H. 225

2. Cardamine Alpina palustris, Silymbrii aquarici Matthioli folio, altera & minor, floribus albis

3. Cardamine Sicula foliis Fumarie Insl. R. H. 224

4. Cardamine Alpina hirsuta floribus albis

5. Cardamine IV. Dalecampii Insl. R. H. 224. * Nasturtium aquaticum minus C. B.

6. Cardamine Alpina I. trifolia Insl. R. H. 225

7. Cardamine pratensis magno flore purpurascens Insl. R. H. 224. * Nasturtium pratense Trag. Flor Cuculi Dod.

CARDIACA (foliis planis) Insl. R. H. 186. * An Cardiacum Matth. 1086. Cardiacum Casalp. 445. Hac, & sequens in Offic. promiscue usurpantur pro Melissa sylvestri, Cardiacum, Alyssum Galeni & Aetii, Marrubium Marc. & Lycopside

2. Cardiacum crispum Insl. R. H. 187

CARDVVS pycnopolycephalus palustris Triumf. Obs. 103

2. Carduus sylvestris alter in limitibus agrorum Casalp. 526. & Vaill. in Arb. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 195. num. 6

CARDVVS. vide ONOPORDON, ERIOCEPHALVS, SILYBVM, CALCITRAPA, & CALCITRAPOIDES

CAREX palustris maior, radice fibrosa, caule exquisitè triangulari, spica breviori compacta Michel. Nov. Plant. Gen. 69

2. Carex minor, radice fibrosa, foliis angustioribus, caule exquisitè triangulari, spica mutilata Michel. Nov. Plant. Gen. 68. num. 3

3. Carex, an nemorosa, fibrosa radice, caule exquisitè triangulari, spica longa divulsa seu interrupta, capitulis solitariis præterquam ultimo Michel. Nov. Plant. Gen. 69

4. Carex minor præalta, spica longa interrupta

5. Carex angustifolia, caule triquetro, capitulis pulchellis habitioribus inter se distantibus & in foliorum alis sessilibus Michel. Nov. Plant. Gen. 70

CAR.

CARLINA acaulos, magno flore luteo. *Carlina vulgo Calsalp.* 527. * *pro Carlina, & Chamaeleonte albo Offic. usurpari potest*

1. *Carlina annua parva (subincana) flore purpureo rubente & albo, patula Michel.* H. Pil.

3. *Carlina sylvestris, flore aureo petennis Inst. R. H.* 500

CARPINVS foliis oblongis serratis & nonnihil crispis, folliculis fructuum longioribus & acutis, semine lato maiore ac magis costulato. * *An Fago similis altera Calsalp.* 39. *Carpino Matth.* 162. *Carpinus alba Cast.*

2. Idem foliis minoribus rugosis acuminatis atque inæqualiter serratis, folliculis fructuum brevioribus, semine minore, non ita costulato

3. *Carpinus Orientalis, folio minori, fructu brevi Coroll. Inst. R. H.* 40

CARTHAMOIDES perennis maior & plerumque ramosa, foliis ab imo ad medium caulem in simplices & angustas lacinias ad costam usque divisis, cæteris profunde dentatis, capitulis cæruleis

2. Eadem minor, foliis circa radicem usque ad costam lacinatis, cæteris dumtaxat dentatis

3. *Carthamoides humilis, radice repente, Carlinae folio, capitulis cæruleis*

CARTHAMVS Officinarum flore croceo *Inst. R. H.* 457. * *Cnicus Graminum, & Crecum Sarracenicum Marc.* 30. *Cnicus sativus vulgo Crecum Sarracenicum Calsalp.* 534. *Carthamo Ric. Grogo, Zaffrone Vulgo*

CARVI *Calsalp.* 291. *Inst. R. H.* 306. * *Caro Matth.* 798. *Carvi, Carrot, Carum Offic.*

CARYOPHYLLATA vulgaris lutea, *Caryophyllatae aquaticæ folio. Caryophyllata Brunf. Tom.* 3. 24

2. *Caryophyllata vulgaris foliis maioribus*

3. Eadem foliis minoribus. * *Ha tres Caryophyllata species promiscue usurpari possunt pro Caryophyllata, Benedicta, Herba Benedicta Offic. & Garioflata Ric.*

4. *Caryophyllata Alpina lutea Inst. R. H.* 295

5. *Caryophyllata Alpina minor Inst. R. H.* 295

6. *Caryophyllata aquatica nutante flore Inst. R. H.* 295

CARYOPHYLLVS barbarus hortensis latifolius diversicolor *Inst. R. H.* 322. * *Armeria Lob. & aliis*

2. *Caryophyllus sylvestris, flore ex albo carneo, umbilico virescente ac piloso, petalis tenuissime dissectis, sectionibus multitudinis. * An Caryophyllus flore tenuissime dissecto, carneo Inst. R. H.* 331

3. *Caryophyllus barbarus hortensis latifolius ruber Inst. R. H.* 333

4. *Caryophyllus (annuus) barbarus sylvestris Inst. R. H.* 333

5. *Caryophyllus repens cinereus angustifolius, flore odorato dilute purpureo & circa umbilicum piloso, petalis latis & altius crenatis*

6. *Caryophyllus Alpinus minimus repens subhirsutus, Polygoni folio, flore purpureo inodoro, ac circa umbilicum cæruleo & anguloso*

7. *Caryophyllus Alpinus parvus, Gramineo folio subtilissime denticulato, flore ex albo purpureo & inodoro, umbilico subvirescente, corniculis brevissimis, petalis tenuissime lacinatis*

8. Caryophyllus longo latoque folio, flore rubro parvo, umbilico saturatior & punctulis nigropurpureis villisque pellucidis obfuso

9. Caryophyllus minimus, Larydis folio, petalis parvis obtusis cordatis dilute purpurascens, ac interne lineis tribus saturatioribus distinctis

10. Caryophyllus minimus, petalis parvis in summitate complanatis & cordatis, excus purpureis, interne dilutioribus & lineis tribus saturatioribus distinctis

CASIA Poëtica Monspeliensium, an Theophrasti Inst. R. H. 664. * *Cassia lignea Casalp.* 154

CASSIDA Inst. R. H. 181. * *Scutellaria C. B.*

1. Cassida; an Cretica frutescens Cataractæ folio, flore albo Coroll. Inst. R. H. 11

2. Cassida palustris vulgarior, flore caeruleo Inst. R. H. 182. * *Lychnis Galerulata Clus. Gratiola caerulea C. B. Tertianaria Tab.*

4. Cassida palustris minima, flore purpurascens Inst. R. H. 182

5. Cassida quæ Scutellaria, folio Teucrii nitido, flore spicato annuente purpureo H. Cathol.

CATARIA an Hispanica, Betonice folio angustiori, flore albo Inst. R. H. 302

CEDRVS folio Cnpressi, fructu parvo violaceo

CELTIS fructu (minore) nigricante Inst. R. H. 612. * *Lotus arbor quæ in Hetruria Bagattum vocant Casalp.* 86. *An Loto Matth.* 276. *Bagolaro vulgo*

CENTAVRIVM maius Orientale erectum, Gladii folio, flore luteo Coroll. Inst. R. H. 32

2. Centaurium maius folio Helenii subternis incano Inst. R. H. 449

CEPA alpina palustris tenuifolia Inst. R. H. 383

2. Cepa scditilis luncifolia perennis Inst. R. H. 383

3. Cepa bicornis luncifolia, floribus albidis a medio ad summum purpurascens & præcipue costis & marginibus

4. Cepa Afcalonica Matth. 556. Inst. R. H. 382. * *Cepis affinis Afcalonica, seu Afcalonica vulgo Casalp.* 400. *Afcalogne Matth.* 586. *Scalogni vulgo*

CERASVS racemosa sylvestris, fructu eduli & viridi purpurascens austro-dulci gratiosi saporis * *Cerasus quadam sylvestris Casalp.* 51

2. Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata Inst. R. H. 627. * *Mahaleb Matth.* 190

CERATOSPERMVM minimum Cornucopioides album & subhirsutum, seminebus incarnati coloris, Autumni tempore Lauri candidibus adnascens Michel. Nov. Plant. Gen. 125. num. 3. Tab. 56. fig. 3

CHÆROPHYLLVM facivum Inst. R. H. 314. * *Cerofoglio Matth.* 555. *Cerofolium Casalp.* 41. *Cberefolium Dod. Gingidium Fuchf. Cerfoglio vulgo*
CHA-

CHAMAECERASVS dumetorum (villosa) fructu gemino rubro Inst. R. H. 609

2. Chamaecerasus Alpina fructu nigro gemino Inst. R. H. 609

CHAMAEDRYS fruticosa sylvestris, Melissæ folio Inst. R. H. 203. * *Hac, & sequens in Offic. promiscue vocantur Salvia sylvestris, Scrodonia, Scordii, & Scordium matris*

2. Eadem foliis maioribus & nigricantibus

3. Chamædrys maior repens Inst. R. H. 204. * *Chamædrys vulgo Quercula Casalp. 454. Camedry, Quercinola Ric. Trixago Cast.*

4. Chamædrys frutescens Teucrium vulgo Inst. R. H. 205. * *Teucrio I. Matth. 863. Teucrium Casalp. 455*

5. Chamædrys palustris canescens, seu scordium officinarum Inst. R. H. 205. * *Scordium Marc. 204. Scordeo Matth. 890. Scordium Casalp. 456. Scordeo Ric.*

6. Chamædrys maritima incana frutescens, foliis lanceolatis Inst. R. H. 205. * *Maro Matth. 769. Ric. 48. Pepolina ex Sicilia ad nos allata sub nomine Mari Casalp. 466. Marum Cortusi I. B.*

7. Chamædrys laciniatis foliis Inst. R. H. 205. * *Camedrio II. Matth. 866. Chamædrys femina Casalp. 457. Botrys Chamædryoides C. B. Trixago Lon. Iva melsbata Tab.*

8. Chamædrys spinosa C. B. Prodr. 117

CHAMAEMELVM (annuum) vulgare Leucanthemum Dioscoridis Michel. Nov. Plant. Gen. 34. * *Antemide o vero Camamilla Matth. 955. Chamamelum vulgo autem Camomilla Casalp. 491. Camomilla Ric. Chamamelum Offic. Camomilla vulgo*

CHAMAEMELVM. vide ANTHEMIS

CHAMAENERION villosum magno flore purpureo Inst. R. H. 303. * *Onagra alia birsuta, latiore folio Casalp. 268*

2. Chamænerion, an villosum, minus, parvo flore Inst. R. H. 303

3. Chamænerion Asclepiadis folio, glabrum, flore purpurascens

4. Chamænerion latifolium, vulgare Inst. R. H. 302. * *Onagra Casalp. 268. Herba S. Antonii & Filius ante patrem Gesn. Lyfimachia siliquosa C. B. Epilobium Gesn.*

5. Chamænerion angustifolium Alpinum, flore purpureo Inst. R. H. 302

6. Chamænerion Alpinum palustre latifolium & glabrum, foliis binis, interdum ternis, flore purpureo, petalis bifidis. *Chamænerion Alpinum, foliis ad nodos ternis Inst. R. H. 203*

7. Chamænerion Alpinum palustre, nitidorubente caule, Digitalis minoris foliis coniugatis petalis ac petiolo donatis, floribus ferme albis, petalis bifidis, siliqua quadrata triunciali

8. Chamænerion Alpinum, foliis pediculo donatis, floribus albis perexiguis, petalis bifidis

9. Chamænerion angustifolium glabrum Inst. R. H. 303

10. Chamænerion Alpinum minus, Brunellæ foliis Inst. R. H. 303

CHA.

CHAMAEPITYS lutea vulgaris, sive folio trifido Inst. R. H. 208. * *Campepito primo Matth.* 991. *Chamaepitys vulgo Iva Casalp.* 456. *Iva Arbetica, & Atunga Offic.*

CHAMAERHODODENDROS Alpina villosa Inst. R. H. 604

CHAMELAEA triccocos Hist. R. H. App. 651. * *Menecyon Arabum Lob.*

CHELIDONIUM maius vulgare, foliorum lobis rotundioribus & rotundis crenatis, flore luteo non laciniato. *Chelidonia Brunf. Tom. I.* 236

2. Idem foliorum lobis oblongis acutis & argute dentatis. *Chelidonia I. B.* 3. 482. *Chelidonium minus Dod. Gall.* 24

3. Idem foliorum lobis oblongis rotunde incis. *Chelidonium maius vulgare folio magis dissecto Boerb. Ind. ult. H. Lugd. Bat. part. I.* 305. * *Celidonia Ric. Chelidonium & Hircundinaria Offic. ut & superiores*

4. *Chelidonium maius, foliis quernis Inst. R. H.* 331

CHENOPODIUM Stramonii folio Barr. Obf. 103

2. *Chenopodium folio triangulo Inst. R. H.* 506. * *Bono Enrico Matth.* 631. *Bonur Henricus Brunf. Tota Bona Lob. Lepatbum unctuosum C. B. Atriplex Canina Lon.*

3. *Chenopodium folio sinuato candicante Inst. R. H.* 506. * *Atriplex, Saluatico secundo Matth.* 489. *Cynocrambe Casalp.* 161

4. *Chenopodium foetidum Inst. R. H.* 506. * *Connina vulgo Casalp.* 163. *Elitum fatidum Trag. Atriplex fatida C. B. Garofnum Dod. Vulvaria Tabern. & Cast.*

5. *Chenopodium Ambrosioides, folio sinuato Inst. R. H.* 506. * *Boeri Matth.* 901. *Boeris Casalp.* 158

6. *Chenopodium Ambrosioides Mexicanum Inst. R. H.* 506

7. *Chenopodium Lini folio villosa Inst. R. H.* 506. * *Belvedere Casalp.* 159. *Linaria Scoparia C. B.*

8. *Chenopodium maritimum annuum glabrum, Gramineo folio carnosso & minus acuto, floribus in foliorum alis, semine nigro splendente. An Kali minus, album, semine splendente C. B. Pin.* 289

9. Idem caulibus lignosis procumbentibus, graminis folio carnosso longiore, angustiore & peracuto, floribus minoribus

10. *Chenopodium maritimum fruticosum sempervirens, foliis vermiculatis, floribus in foliorum alis, semine nigro splendente. Amydylis Chamaepitydes frutescens C. B. Pin.* 282. *Kali species sive Vermicularis marina arborescens I. B.* 3. 704. *Chamaepityx vermiculata Lob. Icon.* 382. *Cafia lignosa similis frutex tertius in Maritimis, bicubitalibus ramis lignosis, foliis Erica crassifloribus & pulposis Casalp.* 155

CHENOPODIUM. vide KALI

CHONDRILLA inacea viscosa arvensis, quae prima Dioscoridis Inst. R. H. 475. * *Herba quae ad Chondrillas reduci potest Casalp.* 510

CHONDRILLA. vide LACTUCA

D

CHRI-

CHRISTOPHORIANA vulgaris nostras racemosa & ramosa Inst. R. H. 299. * *Barba Capri* *Casalp.* 217. *Aconitum racemosum* C. B. *Napellus racemosus* Lugd.

CHRYSANthemVM folio minus secto glauco Inst. R. H. 492

2. Idem folio magis secto

3. *Chrysanthemum latifolium* Inst. R. H. 492

CHRYsANTHEmVM. vide BIDENS

CHRYsOCOME Dill. Supp. Floræ Giff. *Linofyris* Lob.

CICHORIVM silvestre sive officinarum, foliis lacioribus & pulchre divisis, flore caeruleo. *Cichorium*, *Intubus erratica* *Tabern.* Icon. 170. * *Hec*, & *sequens* in *Offic.* promiscue usurpantur pro *Cichorio sylvestri*, *Cichoria*, *Cichorio*, & *Intubo erratica*

2. *Cichorium silvestre* altius radicaturn, foliis laciniatis, flore caeruleo * *An Cichorea saluatica* *Mattb.* 532

3. *Cichorium maritimum* perenne, foliis minoribus integris & interdum nonnihil laciniatis, flore caeruleo

CICVTA maior Inst. R. H. 306. * *Cicuta* *Mattb.* 1155. & *Casalp.* 292

CINARA maxima ex Anglia delata Inst. R. H. 442. * *Mazza ferrata* vulgo

2. *Cinara horrensia* foliis non aculeatis Inst. R. H. 442. * *Cardo senza spine* *Mattb.* 705. *Scolymus* *Fuchs.* *Cattus*, *Carduus sativus* *Gesn.* *Carciolo* vulgo

3. *Cinara silvestris*, spinis longis flavescencibus armata. *An Cinara spinosa*, cuius pediculi estantur Inst. R. H. 442. * *Cardones* *Casalp.* 526. *Callor Theophrasti* *Aug. foliorum pediculi terra obruti* *Gobbi* vulgo vocantur

4. Eadem spinis brevibus & rarioribus infecta * *Spina alba* *Marc.* 162. *Cardo simile a i Carcioffi, che Noi adopriamo in Toscana per fare apprendere il Latte in vece di Caprio* *Mattb.* 693. 701. *Presame* vulgo ut & *superior*

5. *Cinara aculeosa* *Tunnetana*, *Tafsa* dicta, magno flore suaviter olente, angustis *Cinerariæ* foliis non spinosis H. *Pis.*

CIRCAEA Lutetiana Inst. R. H. 301. * *Pirola quedam in Montibus Casalp.* 339

2. *Circæa minima* Inst. R. H. 301

CIRSIVM foliis non hirsutis, floribus compactis Inst. R. H. 447. * *Circio* *Mattb.* 1233

2. *Cirsium acanthos* flore purpureo Inst. R. H. 448

3. *Cirsium pratense*, *Asphodeli* radice, foliis carnosis angustis longioribus viridibus & *Acanthi* modo divisis, capitulo singulari purpureo parvo

4. *Cirsium arvense*, *Sonchi* folio, radice repente, flore purpurascente Inst. R. H. 448. * *Stoppione* vulgo *Casalp.* 531

5. *Cirsium Acanthoides* montanum, flore flavescente Inst. R. H. 448

6. *Cirsium Creticum* altissimum, *Cardui lanceolati* folio, flore albo *Coroll.* Inst. R. H. 32

CI-

CISTVS femina, folio Salviz (acutiore) elatior, & rectis virgis Inft. R. H. 259. * *Ciffo femina* Matth. 195. *Ciftus* Cafalp. 574. *Ciftio* vulgo ut & duo fequentes

2. *Ciftus* mas II. folio longiore Inft. R. H. 259
3. *Ciftus* mas maior, folio rotundiore Inft. R. H. 259. * *Ciffo mafchio* Matth. 194. *Cifti alterum genus in arenis maritimis nafcent* Cafalp. 574
4. *Ciftus* Ladanifera Monfpelienfium Inft. R. H. 260. * *Ladano* Matth. 197. *Ladanum vulgo* Cafalp. 575. *Imbrentina* Ric. 45. *Rimbrentine* vulgo

CITREVM vulgare Inft. R. H. 621. Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 240. *Malum Citreum vulgare* Ferr. Hesper. 61. *Malum Citreum Gennenfium*, vulgare Volk. Hesper. Norimb. 25. & 116. *Cedri di Malfa vulgo* * *Citrus* Cafalp. 139. *Malus Citria* Caff. *Malus Medica* C. B.

2. *Citreum Florentinum* odoratifimum. *Malum Citreum Florentinum* Volk. Hesper. Norimb. 123. & 124. *Limon Citreum Florentinum* laudatifimum Ferr. Hesper. 263. *Cedrato* vulgo

3. *Citreum* calyce longo craffiffimo & quinquepartito. *Malum Citreum*, calyce quinquepartito craffo, fructu magno Clarici pag. 671. num. 48. *Cedro della Ghianda* Volk. Hesper. Norimb. Tom. 2. 48

CLEMATITIS five Flammula furrecta, alba Inft. R. H. 294. * *Flammula* Matth. 1009

2. *Clematitis* fcandens urens, Afparagi radice, foliis rotundioribus, floribus albis umbellatis, femine brevi & ferme rhomboideo. *Clematitis fcor* Flammula repens Inft. R. H. 293. * *Vitalba* Ric. *Flammula lovis* Ambr.

3. Eadem matitima foliis oblongis, feminibus maioribus circinatis. *Clematitis maritima repens* Inft. R. H. 294. Zannich. 69. Tab. 129

4. Eadem Iafmini vulgaris folio feminibus longis rhomboideis. *An Clematitis fcor* Flammula fcandens, foliis valde minoribus L. B. 2. 137. *Defcript.*

5. *Clematitis filveftris latifolia* (foliis incifis) Inft. R. H. 293. * *Clematide terza* Matth. 1008. *An Clematitis* Cafalp. 543. *Vitis filveftris* Trag. *Vitis nigra* Fuchf. *Vitalba* vulgo

6. Eadem foliis minus incifis & partim integris
7. Eadem foliis minoribus ac multum incifis
8. *Clematitis peregrina* foliis Pyri incifis Inft. R. H. 293
9. *Clematitis alpina* Geranifolia Inft. R. H. 294
10. *Clematitis carulea* recta Inft. R. H. 294
11. *Clematitis carulea repens* Inft. R. H. 294. * *Clematide feconda* Matth. 1007. *An Flammula* Cafalp. 543
12. *Clematitis purpurea repens* Inft. R. H. 294

CLINOPODIVM Origano fimile elatius, maiore folio Inft. R. H. 195. * *Clinopodio vulgare* Matth. 860. *Acinos* Lob.

2. *Clinopodium arvenfe* Ocimi facie Inft. R. H. 195. * *Vn altro Clinopodio* Matth. 861. *Clinopodium* Cafalp. 454. *Ocimum filveftre*, *Acinos* Dod.

CNICVS filveftris hirsutior, five Carduus Benediftus Inft. R. H. 450. * *Cardo Santo* Matth. 858. *Carduus Sanctus*, fcor *Carduus Benediftus* Cafalp. 534

COCHLEARIA altissima Glasti folio Inst. R. H. 215

2. Cochlearia folio cubitali Inst. R. H. 215. * *Tblaspi magnum* Rapbanus montanar vulgo appellatur Casalp. 767. *Rapbanus vulgare* Matth. 469. *Armoracia* Brunnf. *Rapbanus rusticanus* C. B. Cren vulgo a voce Germanica
3. Cochlearia folio subrotundo Inst. R. H. 215. * *Cochlearia* Offic.

COLCHICVM commune Inst. R. H. 348. * *Colchico florido* Matth. 1164. *Hermodactylus* vel *Crocus sylvestris* Casalp. 410. *Hermodactylus niger* & *rufus* Mesoco & *Serapioni* C. B.

COLVTEA Orientalis, flore sanguinei coloris lutea macula notato Coroll. Inst. R. H. 44

2. Colutea Aethiopica flore purpureo Inst. R. H. 649
3. Colutea Vesicaria Inst. R. H. 649. * *Colutea* Matth. 827. *Sena quibund.*

COMELINA Virginiana repens, foliis acutis caulem amplexantibus. *Falangi ramofo Virginiano, con foglie larghe, serpeggiante* Zann. 90

CONVOLVULVS purpureus, folio subrotundo Inst. R. H. 82. * *Campanelle*, e fiori dello Scacciati vulgo a *pictoris* cuiusdam nomine

2. Convolvulus maior, foliis latis acutis sagittatis & per basim auriculatis, auriculis nigris & angulatis, flore albo triunciali, calyce unciali. *Valubilis* Brunnf. Tom. 3. 91. *An Smilax levis*, vel *lenis maior* Lob. Icon. 619. *Ger. Emac.* 861. *Smilax levis maior* Dod. *Pempt.* 292. *Convolvulus maior albus* Park. *Theatr.* 163
3. Idem foliis latis brevibus obtuse mucronatis & per basim auriculatis, auriculis parum angulosis, floribus biuncialibus, calyce octo circiter lineis longo

4. Convolvulus arvensis minor, folio hastato, auriculis longis angustis peracutis, flore roseo radiis albis pido. *An Convolvulus arvensis minimus* Rati *Synopf. Ed.* 3. 276. *Convolvulus angustissimo folio nostras cum auriculis* Pluk. *Almag.* 116. *Tab.* 24. *fig.* 3
5. Idem folio sagittato acuto. *Convolvulus minor purpureus* Lob. Icon. 619. *Convolvulus minor* Clusf. *Hist. I.* *Smilax levis minor* Dod. *Pempt.* 393. *Helxine cissampelos* Matth. (1665. & 1559.) *Lugd.* 1424
6. Idem folio longiore cum auriculis subrotundis brevissimis. *An Convolvulus minimus, angusto brevi subrotundo folio* Boerh. *Mus. Part.* 2. 44. *Tab.* 33

7. Convolvulus Græcus Sagittæ foliis, flore albo Coroll. Inst. R. H. 1. * *Orobanchæ Theophrasti* Ang. *Viluppio*, & *Vilucchio* vulgo, ut & tres superiores
8. Convolvulus argenteus umbellatus erectus Inst. R. H. 84. * *Dorycnium vulgo Argentina* Casalp. 384
9. Convolvulus minor argenteus repens acaulos serme Inst. R. H. 84
10. Convolvulus maritimus nostras rotundifolius Inst. R. H. 85. * *Brassica Marina* Matth. 497. *Soldanella* Casalp. 384. & *Ric.*

CONYZA maior vulgaris Inst. R. H. 454. * *Coniza maggiore* Matth. 918. *Conyza maior* Casalp. 501. *Baccharis* Gesf.

2. Conyza Americana Vrtice folio, flore albo Inst. R. H. 455

CONYZA. vide CHRYSOCOME

CORIANDRVM minus testiculatum Inst. R. H. 316

CORIARIA vulgaris Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. Ann. 1711

CORINDVM ampliore folio, fructu maiore Inst. R. H. 431. * *Vesticia*.
via Matth. 1130. *Faba inversa* Casalp. 382. *Pisum Vesicarium* C. B. *Halia*
cacabum peregrinum Fuchf. Paternostri di S. Domenico vulgo

2. Corindum folio & fructu minori Inst. R. H. 431

CORNVS femina Inst. R. H. 641. * *Cornus* vulgo *Sauguen* Casalp. 80.
Sauguius Matth. 280. *Virga Sanguinea* Dod. *Sanguine* vulgo

2. *Cornus silvestris* mas Inst. R. H. 641. * *Cornus* Casalp. 109. *An* *Cor-*
nio Matth. 279. & Ric.

CORONA Imperialis Inst. R. H. 372. * *Lilium Perficum* C. B.

CORONA SOLIS Inst. R. H. 489. * *Helenium Indicum*, sive *Flor So-*
lis seminum cortice candido Casalp. 500. *Hac*, & *sequens* promissus vocatur
Chrysanthemum Peruvianum Dod. *Planta maxima Cortusi*, *Girasole* vulgo

2. Eadem maxima, Seminum cortice nigro * *Helenium Indicum*, seminum
cortice nigro Casalp. 500

3. *Corona Solis* parvo flore, tuberosa radice Inst. R. H. 489. * *Tartusi*
bianchi vulgo

4. *Corona Solis* altissima *Virgæ aureæ* foliis Inst. R. H. 490

5. *Corona Solis* *Trachelii* folio, radice repente (flore maiore) Inst. R.
H. 490

CORONILLA maritima glauco folio Inst. R. H. 650

CORONOPVS Neapolitanus tenuifolius Inst. R. H. 128. * *Coronopus*
vulgo *Herba stella sylvestris* Casalp. 329

1. *Coronopus* *Masilienis* hirsutior latifolius Inst. R. H. 128

3. *Coronopus hortensis* (perennis) Inst. R. H. 128. * *Coronopo* Matth.
522. *An* *Coronopus* vulgo *Herba Stella fativa* Casalp. 329

CORYLVS fativa fructu oblongo. * *Nux Avellana urbana oblongam*
nucem ferens Casalp. 38. *Nocciola* vulgo

2. *Corylus sylvestris* fructu oblongo, involucrio eleganter inciso. *Corylus*
sylvestris fructu oblongo Lugd. 1712. *Descript.* *Nocciola saluatica* vulgo

3. *Corylus sylvestris* fructu rotundo cum involucrio longiore. *Corylus syl-*
vestris fructu rotundo Lugd. 101. *Descript.*

COTINVS Coriaria Inst. R. H. 610. *Cotino* Matth. 236. *Coccigrya Thee-*
braffi, *Cotinus* *Plinii* Lugd. *Scoeano* vulgo

GRAMBE Orientalis *Dentis Leonis* folio, *Erucaginis* facie Coroll. Inst.
R. H. 14

GRA-

CRATAEGVS folio subrotundo serrato subtus incano Inst. R. H. 633.
* *Sorbi torminalis alterum genus in alpestribus Casalp.* 146. *Sorbus alpe-*
na Gesf.

2. *Crataegus Italica folio laciniato minori subtus lanato, fructu rotundo ru-*
bro Michel. H. Pif.

CREPIS maritima angustifolia dentata, flore luteo

2. *Crepis folio leviter dentato Vaill. in Aft. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 255.*
*num. 1. * Terracrepulus in Hetruria Casalp.* 113

3. *Crepis Choudrilla folio Vaill. in Aft. Ac. R. Sc. Ann. 1721. num. 2*

4. *Eadem folio maculis sanguineis notato*

CRITHMVM maritimum mains glaucum, caulibus erectis, foliorum lobis
ternis longioribus & angustioribus, umbellis ex albo virescentibus. * *Haec dua*
Cribmi species in officinis pro Fanculo marino sive maritimo promiscue,
usurpantur

2. *Idem minus, caulibus procumbentibus, foliorum lobis brevioribus*

CROCVS sativus Inst. R. H. 350. * *Crocum vulgo Zafferanum Casalp.*
411. Croco Matth. 77. 78. Zafferano Ric. & vulgo

2. *Crocus vernus latifolius aureus Inst. R. H. 352*

3. *Crocus vernus angustifolius, flore dilute purpureo. Croci alterum genus*
silvestre, flore purpurascete Casalp. 411

CRUCIATA hirsuta Inst. R. H. 115. * *An Crucialis Casalp.* 325. *In-*
guinaria Plinii quibusd.

2. *Cruciata Florentina lutea minor, partim glabra, partim hirsuta. Cru-*
cialis in montibus exsiliis Casalp. 325

3. *Cruciata, an palustris alba Inst. R. H. 115*

CVCVBALVS Plinii Inst. R. H. 339. * *Polemonia altera peregrina Ca-*
salp. 258. *Alfina stans baccifera C. B.*

CVCVMIS sativus Ægyptiacus, immaturo fructu albo, maturo vero sub-
luteo laevi

2. *Cucumis sylvestris Asinicus dictus Inst. R. H. 104. * Cocomero salva-*
tico Matth. 1288. Cucumis sylvestris vulgo Cucumis asinicus Casalp. 204.
Cucumis erraticus Gesf. Cucumer Elateris Lob. Cocomero salvatico detto
asinico Ric.

CVPRESSVS meta in fastigium convoluta, quæ femina Plinii Inst. R.
H. 587. * *Cupressus femina Casalp.* 134. *Cipresso femina Matth. 132. Ci-*
presso vulgo

2. *Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas Plinii Inst. R. H. 587.*
** Cupressus mas Casalp.* 134. *Cipresso maschio Matth. 132. Cipressa vulgo*

3. *Cupressus Lusitanica patula, fructu minori Inst. R. H. 587*

CYANVS segetum flore caeruleo Inst. R. H. 446. * *Flos Alyssus caeruleus*
Marc. 209. Ciano minore Matth. 537. Cyanus qui vulgo Fioralis in Hetru-
ria Casalp. 538. *Battisegolæ vulgo*

2. *Cyanus montanus latifolius*, vel *Verbasculum Cyanoides* Infl. R. H. 445. * *Ciano maggiore* Matth. 536
3. *Cyanus floridus odoratus Turcicus* sive *Orientalis maior*, flore albo Infl. R. H. 446. * *Ambretta bianca vulgo*
4. *Cyanus floridus odoratus Turcicus* sive *Orientalis maior*, flore incarnato Infl. R. H. 446. * *Ambretta vulgo*
5. *Cyanus floridus odoratus Turcicus* sive *Orientalis maior*, flore luteo Infl. R. H. 446. * *Ambretta gialla vulgo*

CYCLAMEN orbiculato folio, inferne purpurascens Infl. R. H. 154.
 * *Cyclamino* Matth. 620. *Cyclaminus*, vulgo *Pamporcinus* *Casalp.* 392. *Ar-
 idanisa. Pane Porcino Ric. Panterreno vulgo*
 2. *Cyclamen folio anguloso* Infl. R. H. 155
 3. *Cyclamen folio Hederaceo Polyanthes* Infl. R. H. 155
 4. *Cyclamen radice exigua* Infl. R. H. 156. * *Cyclamini vulgo Pam-
 porcini quoddam genus in Psanis Collibus Casalp.* 392

CYNOGLOSSVM montanum maximum Infl. R. H. 139. * *Cynoglossa
 sa quadam in montibus Casalp.* 440. *Hac, & sequenter Cynoglossi species
 usurpari possunt pro Cynoglossa Offic.*

2. *Cynoglossum montanum*, virenti folio, maiori flore Infl. R. H. 139
 3. *Cynoglossum Creticum*, argenteo angusto folio Infl. R. H. 140
- Cynoglossum folio molli incano, flore caeruleo striis rubris variegato Mor.
 H. R. Bief.*

CYPEROIDES spica pendula longiore & angustiore Infl. R. H. 529

2. *Cyperoides silvarum latifolium*, caule exqu岸ite triangulari, foliis ad mar-
 gines ciliis instar pilosis & angustissime denticulatis, spicis strigosis, capsulis
 oblongis incurvis rarius dispositis & parum bifidis Michel. Nov. Plant. Gen.
 56. num. 6
3. *Cyperoides spicis brevibus erectis*, e granis parvis & subbisectis &
 glaucis dense congestis Mont. Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 20
4. *Cyperoides foliis Caryophyllaeis*, caule rotundo triquetro, spicis flori-
 feris multis
5. *Cyperoides angustifolium*, caule & spicis floriferis triangularibus, spi-
 cis autem feminalibus longe distantibus, pediculis brevibus insidentibus, squa-
 mis curtis, capsulis nitidis & fere splendentibus in cuspidem vix bifidam
 desinentibus Michel. Nov. Plant. Gen. 58. num. 19
6. *Cyperoides spicis parvis longe distantibus* Infl. R. H. 530

CYPERVS odoratus radice longa, sive *Cyperus Officinarum* Infl. R. H.
 527. * *Cipero* Matth. 28. *Cyperus primus Casalp.* 189. *Cippero con radici lun-
 ghe segnali e torte Ric. Cunzia vulgo*

2. *Cyperus odoratus radice longa*, simul cum caulibus tenuiore
 3. *Cyperus rotundus odoratus parvus* Michel. Nov. Plant. Gen. 45. n. 6.
- * *Cipero* Matth. 28. *Cyperus alter Casalp.* 189. *Cippero con radici olivoe-
 ri Ric.*
 4. *Cyperus rotundus, efculentus angustifolius* Infl. R. H. 527. * *Traf-
 Matth. 573. & Casalp.* 191. *Bacicci vulgo*

CY-

CYTISO GENISTA scoparia vulgaris, flore luteo Inft. R. H. 649.
 * *Genista* genus quadrato inno *Casalp.* 115. *Genista angulosa* & *scoparia*
 C. B. Scornabecco vulgo

CYTISVS glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis Inft. R. H. 648
 2. *Cytisus Alpinus* laefolius (foliis utrinque acuminatis) flore racemoso pendulo Inft. R. H. 648. * *Laburnum* vulgo *Avornellum* *Casalp.* 113
 3. *Cytisus Alpinus*, foliis longioribus utriusque acuminatis & subtus villosis, flore racemoso pendulo Michel. H. Pif.
 4. *Cytisus glaber* nigricans (spicatus) Inft. R. H. 648
 5. *Cytisus hirsutus*, foliis latis subrotundis, floribus primum luteis deinde rufescentibus, siliquis latis, calyce ampliori
 6. *Cytisus hirsutus* amarus sempervirens, floribus & foliorum alis pendulis luteis ac lituris sanguineis notatis, siliquis villosis incurvis. *Cytisus sylvestris* in *Montibus* *Casalp.* 114. An *Cytisus hirsutus* Inft. R. H. 647
 7. *Cytisus Italicus* hirsutus, foliis brevioribus obtusioribus & pediculo orbatis, floribus glomeratis in foliorum alis, siliquis parvis deorsu congestis & villosis. *Cytisus* *Casalp.* H. Sic. pag. 12. num. 38. *Cytisus* in *Collibus maritimis albidior*, foliis ferme sine pediculo barentibus *Eiusd.* in *Op.* 114
 8. *Cytisus humilis* glaber, foliis oblongis, floribus purpureis per caulem sparsis, calyce bilineari, siliqua nigida aogusta sesquiunciali



AMASONIVM stellatum Inft. R. H. 257

DAUCVS vulgaris Inft. R. H. 307. * *Staphylinus silvestris*
 Dod. *Daucus* Offic.

2. *Idem* tenuifolius glaber
 3. *Daucus maritimus* annuus, seminibus & radiis umbellæ crassioribus.
 * An *Staphylinus silvestris maximus*, flore *Daucus maritimus* *Casalp.* 289
 4. *Daucus* annuus ad nodos floridus Inft. R. H. 308. * *Gingidii* genus
Cicutaria vocatum *Casalp.* 289

DELPHINIVM perenne montanum subhirsutum mions, foliis Aconiti tenuissime dissectis, flore cæruleo. An *Aconitum Lycostomum* flore *Delphini* I. *Silefiacum* *Clus. Hist.* XCV

2. *Delphinium Platani* folio, *Staphisagria* dictum Inft. R. H. 428. * *Staphisagria* *Casalp.* 589. *Staphis Agria* *Matth.* 1291. *Staphisagria*, & *Staphisagria* Ric. *Pedicularis* Cord. *Strafizeca* vulgo
 3. *Delphinium hortense*, flore maiore & simplici cæruleo Inft. R. H. 426. * *Fior Capaccio* *Casalp.* 69. 267. & 403. *Consolida Regalis* *Cast. Calceotrippa* Cord.
 4. *Delphinium hortense*, flore maiore & simplici albo Inft. R. H. 427.
 * *Harum duarum Delphini specierum semen pro Staphisagria in officinis nostris usurpatur*

DENS

DENS CANIS angustiore longinque folio, flore suaverubente Infl. R. H. 378

2. Dens canis latiore rotundioreque folio, flore ex purpura rubente Infl. R. H. 378. * *An Dens caninus Casalp.* 410

DENS LEONIS alpinus maximus latifolius

2. Idem angustifolius

3. Dens leonis latiore folio Infl. R. H. 468. * *Dente di Leone Matth.* 535. *Vrinaria Adv. Taraxacon Offic.*

4. Idem folio glabro. * *Aphaca Casalp.* 508

5. Dens leonis angustiore folio Infl. R. H. 468

6. Dens leonis Asphodeli bulbis Infl. R. H. 468. * *Cicorea Conflanti-nopolitana Matth.* 533

7. Dens leonis tuberosa radice Infl. R. H. 468

8. Dens leonis foliis canescentibus villosis Infl. R. H. 468

9. Dens leonis alpinus Asplenii folio

10. Dens leonis alpinus glaber, Cichorii folio, costa viridi, floribus luteis, caulibus nonnihil foliosis

11. Dens leonis foliis minimis hirsutis & asperis Infl. R. H. 469

DENTARIA heptaphyllos Infl. R. H. 225. * *Dentaria maior Casalp.* 589.

2. Dentaria heptaphyllos baccifera Infl. R. H. 225. * *Dentaria minor Casalp.* 586. *Coralloides Cord.*

DICTAMNUS Creticus C. B. Pin. 222. Boerh. Ind. alt. H. L. Bat. P. I. 178. *Origannum Creticum latifolium tomentosum, seu Dictamnus Creticus Infl. R. H. 199. Dittamo Matth.* 743. & *Ric. Dictamnus Creticum Casalp.* 468. *Dittamo vulgo*

DIGITALIS latifolia (hirsuta & praealta) flore ferrugineo Infl. R. H. 166

2. Digitalis maior lutea vel pallida, parvo flore (foliis imis angustioribus, fructu semiunciali) Infl. R. H. 165

3. Digitalis latifolia, floribus albis, punctis quatuor ferrugineis notatis

4. Digitalis angustifolia glabra, floribus parvis albidis ac punctis quatuor ferrugineis notatis. *An Digitalis angustifolia lutea Infl. R. H. 166*

5. Digitalis minima Gratiola dicta Infl. R. H. 165. * *Gratiola Matth.* 734. *Gratia Dei Casalp.* 275. *Limnefinum, sive Centauroides Cord. Centaurium aquaticum, forte Polemonium palustre amarum Hippocrati veterinario Gessu. Hyssopus vulgare quorundam Col.*

6. Digitalis lutea magni flore Infl. R. H. 165

DIPSACVS silvestris, vel Virga pastoris maior Infl. R. H. 466. * *Vn alio Diffaco Matth.* 699. *Carduus fullonum Brunf. Labrum Veneris Cass.*

DORIA Narbonensium Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 98. * *Herba Doria Casalp.* 503. *Panax Chironium Theophrasti Tab.*

2. Doria quae Iacobaea Orientalis Limonii folio Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 98. num. 4.

3. Doria quae Iacobaea alpina foliis longioribus serratis Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 98. num. 3. * *Solidago Saracenica Fuchs. Consolida Saracenica Tbel. Consolida Aurea Tab. & Offic.*

E

DO-

DORONICVM maximum, foliis caulem amplexantibus Inft. R. H. 488

2. Doronicum Scorpoide, radice candida, monantho, folio uno caulem amplexante H. Cath. * *Aconitum Pardalianches*. Radice, cbe ei si porta per *Doronico Ric.* 36

3. Doronicum radice Scorpii Inft. R. H. 487. * *Doronico Pardalianche*, minore chiamato *falsamente Doronio* Mattb. 1140. *Doronicum Casalp.* 497

DORYCNIVM Montpellierensium Inft. R. H. 391

2. Idem villosum

3. Idem flore ex albo & rubro variegato

DRACOCEPHALVS latifolius glaber, Lysimachiae luteae folis Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 417. Sect. 11. Tab. 21. fig. 2

DRACVNCVLVS polyphyllus Inft. R. H. 160. * *Minor Dracunculus* Marc. 145. *Dracotea minore* Mattb. 624. *Dracunculus vulgo Dracotea* Casalp. 225. *Serpentaria vulgo*



CHINOPHORA maritima spinosa Inft. R. H. 636. * *Critbamo* 11. Mattb. 519

ECHINOPVS maior, flore candido, flaminibus in medio caeruleis Inft. R. H. 463. * *Spina bianca d'alcuni* Mattb. 702.

An quadam peregrina apud Nor foliis Acanthi minoribus candidis spinosâ, &c. Casalp. 522. *Carduus sphaerocephalus* Cord.

2. Idem major, Acanthi folio ampliore

3. Echinopus minor annuus magno capite Inft. R. H. 463

ECHIVM vulgare Inft. R. H. 135. * *Echio* Mattb. 1049. *Echium Casalp.* 436. *Buglossum sylvestre* Dod.

2. Echium maius & asperius, flore albo Inft. R. H. 135

3. Echium annuum, folio angusto ac verticis rubris albisque notato, flore ex caeruleo purpurascente

4. Idem folio latiore bullato undulato ac verrucis candidis exasperato, flore caeruleo, tubo incurvo. *An Echium Creticum latifolium rubrum* Inft. R. H. 135

5. Echium annuum foliis Lithospermi arvensis, flore caeruleo parvo Micheli H. Pl.

ELAEAGNVS Orientalis angustifolius, fructu parvo olivæformi subdulci Coroll. Inft. R. H. 53. * *Olive di Boemia* Mattb. 215. *Zizyphus Cappadocica* Plinii Lugd. *Zizyphus alba* Gesn.

ELI-

ELICHRYSVM Africanum foetidissimum amplissimo folio, calyce argenteo Boerh. Ind. alt. H. L. Bar. P. 1. 126

2. Elichrysum Orientale Inst. R. H. 453

3. Elichrysum Italicum maritimum incanum, foliis angustissimis ac brevibus, capitulis umbellatis rotundioribus aurcis. *Elichrysum seu Stoechas Citrina angustifolia* C. B. Pin. 264. Inst. R. H. 452. *Stoechas Citrina tenuifolia Narbonensis* I. B. 3. 154. *Stoechas Citrina* Dod. Pempt. 268. Matth. Ed. Valgr. fol. 1185. pag. 1100. * Hae, & tres sequentes *Elichrysi* species promiscue usurpantur pro *Stoechade citrina* Offic. vocanturque vulgo Tignamica corrupto nomine a thymamate ut censet Vigna in Theophr.

4. Idem praesaltum Linariae folio angustissimo, capitis luteis oblongis & in umbellam magis sparsam dispositis, calycibus oblongis pallidis

5. Elichrysum angustissimo folio Inst. R. H. 452. * *Helicryson* quam recentiores medici *Stoechadem Citrinam* vocant, alicubi *Tignamicam* *Casalp.* 484

6. Elichrysum Italicum odore gravi, angustissimo folio intorto, floribus umbellatis luteis, calyce longo angusto pallido

7. Elichrysum Africanum, foliis Linariae serratis ac subtus incanis, capitulis maiusculis singularibus aureis longo pedicelo insidentibus

* Ex seminibus a Domino Thoma Shaw Coll. Reginae apud Oxonienses socio per varias Africae provincias rerum naturalium observandarum gratia itinere instituto collectis & Michelio communicatis, tres aut quatuor diversa Planta prodire, inter quas elegans haec *Elichrysi* species adhuc superflua, cetera perierunt antequam semen perficerent

EMERVS Inst. R. H. 650. * *Emerus* *Casalp.* 117. *Colutea filiquosa* vel *scorpioides* C. B.

EPHEDRA maritima maior Inst. R. H. 663. * *Polygonum bacciferum* C. B.

2. *Ephedra* Cretica tenuioribus & rarioribus flagellis Coroll. Inst. R. H. 53

EPHEMERVM Virginianum flore caeruleo maiori Inst. R. H. 367

EPIMEDIVM Inst. R. H. 232

EQUISETVM altissimum scandens asperum monostachion & polystachion, setis plerumque ramosis & praelongis. *Equisetum in sepidibus* *Casalp.* 598. *Coda di Cavallo* III. Matth. 1083. Ed. Valgrif. in fol. Ann. 1568

EQUISETVM. vide HYDROCERATOPHYLLON

ERICA vulgaris glabra (Myrica folio, flore purpureo) Inst. R. H. 602. * *Scopa floribus purpurascens* *Casalp.* 104. An *Erica* Matth. 169

2. *Erica* maxima (ramis & foliis quaternis) alba Inst. R. H. 602

3. *Erica* maritima humilis, glabro Corio folio exadverso quaterno, costa non elata ac subtilissime sulcata, floribus oblongis purpureis elegantibus uno versu dispositis, calyce concolore. * *Scopa ramis humifratris circa stagna maritima* *Casalp.* 104

ERIOCEPHALVS capite rotundo maximo Vaill. in A& Ac. R. Sc. An. 1718. pag. 204. n. 1

E 2

2. Erio-

2. *Eriocephalus vulgaris* capite tuthinato, flore purpureo Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 205. n. 7
3. *Eriocephalus alpinus* annuus, foliis lanceolatis, spinosior & patulus, capitulis pyriformibus purpureis turbinateis & confertim nascentibus
4. *Eriocephalus leucographis* flore purpureo coronato Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 205. n. 10
5. *Eriocephalus annuus lanceatus* maior, capitulis pyriformibus purpureis plerumque solitariis, squamis rigidioribus expansis & reflexis. *Carduus lanceatus* Raii Hist. T. 1. 310. n. 1
6. *Idem* minor, capitulorum squamis minoribus compactis. *An Carduus lanceatus, sive sylvesteris* Dodonai l. B. 3. 58.

ERVCA latifolia alba, sativa Dioscoridis Inft. R. H. 227. * *Eruca sativa folio latiore* Casalp. 360. *Ruchetta Domestica* Matth. 559

2. *Eruca Romana* seu gentilis, siliqua angusta, folio lato Inft. R. H. 227
3. *Eruca maritima* foliis amplioribus, admodum succulentis, laciniatas, & alternis sectionibus sinuatis, flore luteo
4. *Eruca*, an tenuifolia perennis, flore luteo Inft. R. H. 227. * *Eruca sativa altera fruticosa* Casalp. 360. *Eruca* Offic. *Ruchetta vulgo ut & sequens*
5. *Eruca Campestris* annua minor, foliis laciniatas, flore luteo

ERYNGIVM latifolium planum Inft. R. H. 327. *Eringio piano* Matth. 718

2. *Eryngium planum minus* Inft. R. H. 327
3. *Eryngium vulgare* R. H. 327. * *Eringio Montano, Cacatryppola* Matth. 716. 717. *An Eryngium vulgo Iringum* Casalp. 520. *An Eringio* Ric.
4. *Eryngium maritimum* Inft. R. H. 327. * *Eringio Marino* Matth. 717

ERYSIMVM angustifolium maius Inft. R. H. 228

2. *Erysimum polycrateron*, vel corniculatum Inft. R. H. 228. * *Irionis tertia species* Casalp. 361. *Vn altro Irione* Matth. 604
3. *Erysimum* annuum foliis in paucas & longas lacinias divisus, floribus luteis exiguis, siliquis hirsutis corniculatis & ad caulem contractis *Erysimum vulgare* C. B. Pin. 100. Zannich. lji. 287. *Irio* C. B. in Matth. 471. *Erysimum Irio* l. Tabern. Icon. 442
4. *Idem* foliis latis multum laciniatas & ad Raphanum accedentibus. *Erysimum Trag. foliis luteis iuxta muros* proventient l. B. 2. 863. *Erysimum Trag. 102. Irion, sive Erysimum* Dod. Pempt. 714. *Erysimum Dioscoridis* Eiusd. Gall. 438. *Verbena recta sive mas* Fuchf. Hist. 592

EVGENIA Indica Myrti folio deciduo, flore albo, fructu suaverubente molli leviter sulcato & odorato Michel. Nov. Plant. Gen. 226

EVONYMVS vulgaris, granis rubentibus Inft. R. H. 617. * *Siler quem vulgo Silum alii Fusaginem vocant* Casalp. 128. *Evonimo* Matth. 209

EVPATORIVM Cannabinum Inft. R. H. 456. * *Eupatorio commune*, Matth. 1069. *Eupatorium* Casalp. 486. *Eupatorium cannabinum* Offic. *Eupatorio a° Avicenna* Ric.

FAGO-



AGOPYRUM vulgare scandens, calyculis florum alatis, femine nigro splendens H. Pil. *Fagopyrum maius scandens* Bot. Par. Helveticæ Cistampelot altera, *Atriplicis effigie* Lob. Icon. 629. Convolvulum nigrum Dod. Pempt. 396. * Formentone Casalp. 166

2. *Fagopyrum vulgare scandens*, calyculis florum nudis, femine nigro H. Pil. *Fagopyrum vulgare, minus, scandens* Bot. Par. 52. *Volubilis nigra* Tabern. Icon. 87. * Formentone alterum genus Casalp. 166. Formento Saraceno Matth. 418. *Polygonum bederacenum* Col.

FAGVS Inst. R. H. 584. * & Casalp. 35. *Faggio* Matth. 233

FERRVM EQVINVM Germanicum, filiquis in summitate Inst. R. H. 400. * *Sferra cavallo vulgo*

FERVLA femina Plinii Inst. R. H. 321. * *Ferula* Matth. 837. *Ferula mar* Casalp. 286

2. *Ferula minor* ad singulos nodos umbellifera Inst. R. H. 321. * *Panax Asilepinum* Casalp. 279

FICOIDES Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis aspero Tournef. in Art. Ac. R. Sc. Ann. 1705. * *Cristalloide*. Erba Cristallina vulgo

2. *Ficoides*, seu *Ficus Aizooides*, an Africana maior procumbens, triangulari folio ensiformi H. L. Bat. 247

FILAGO maior humistrata repens, foliis expansis, capitulis maioribus conglobatis

2. *Filago annua erecta maior ramosa & prolifera*, foliis expansis, capitulis florum in globulos congestis. *Filago seu Impia* Dod. Pempt. 66. Inst. R. H. 454. Vaill. in Art. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 391. *Gnaphalium vulgare*, *Filago*, *Centunculus* Lob. Icon. 480. *Gnaphalium vulgare* Tabern. Icon. 389. * *Gnaphalio vulgare* Matth. 909

3. Eadem foliis ad caulem appressis, capitulis florum parvis in globulos congestis. *Gnaphalium Germanicum* I. B. 3. 158. *Gnaphalium vulgare* Fuchf. Lync. 1155. *Gnaphalium* Fuchf. Hist. 288. *Filago* Dod. Gall. 67. *Eliebryst* sylvestris Trag. 321. Icon I.

FILICVLA quæ Adiantum nigrum officinarum, pinnulis acutioribus Inst. R. H. 542. * *Adiantum nero Ric.*

2. *Filicula Fontana maior*, sive *Adiantum album* Filicis folio Inst. R. H. 542

FILIPENDVLA vulgaris, an Molon Plinii Inst. R. H. 293. * *Filipendula* Matth. 913. & Casalp. 551

FILIX ramosa maior, pinnulis obtusis non dentatis Inst. R. H. 536. * *Felcie Femmina* Matth. 1253. *Filix fumina* Offic.

2. Eadem pinnulis dentatis

3. Fi-

3. Filix ramosa minor, pinnulis dentatis Inft. R. H. 536
 4. Filix obo ramosa, dentata Inft. R. H. 536. * *Hec & sequens in Officiis Filix mas vocantur*
 5. Eadem maior. * *An Felce masculina Matth. 1352*

FOENICVLVM fativum anouum, dilute virentibus foliis, in multas & gradatim descendeutes coniugationes divisis, capillamentis longioribus & crassioribus prædictis, umbellis amplioribus luteis, femine crassiore albo dulci. *An Feniculum dulce Azoricum Inft. R. H. 311. Fioocchio dolce vulgo*

2. Feniculum sylvestre præaltum, foliorum coniugationibus paucioribus, inæqualiter a se invicem distans, & io prælonga capillamenta divisis, umbellis parvis luteis, acriori & nigriori femine. *An Feniculum vulgare minus, acriori & nigriori femine Inft. R. H. 311. * Feniculum sylvestre Cesp. 282. Feniculum, & Marathrum Offic. Fioocchio vulgo*

3. Fœniculum maritimum, foliorum segmentis tenuissimis & rarioribus, umbellis parvis luteis, femine acriori & nigriori

4. Feniculum sylvestre, caulibus tenuioribus siccis, modo erectis, modo procumbentibus, foliorum portiunculis brevissimis, umbellis aureis rarioribus & tribus vel quatuor aut quique corymbis compositis, semine nigricante, Auracii fervido sapore

5. Feniculum tortuosum Inft. R. H. 311. * *Seseli Massiliense Offic.*

6. Feniculum anouum, umbella contracta oblonga Inft. R. H. 311. * *Vishaga Matth. 554. Cumini fativi genus quod Vishaga vocatur Cesp. 285. Gingidium Ang.*

FOENVM GRAECVM fativum Inft. R. H. 409. * *Fien Greco Matth. 438. & Ric. Fœnum Græcum Cesp. 239. & Offic.*

FRAGARIA vulgaris Inft. R. H. 295. *Fragaria Matth. 1075. * Herba di Fragole Ric. Fragola vulgo*

2. *Fragaria fructu albo Inft. R. H. 296*

3. *Fragaria sylvestris alpina, flore parvo, fructu rotundo exiguo*

4. *Fragaria sativa atque spicata, fructu rubro tuberculoso, circa calycem seminibus destituta*

5. *Fragaria Inglese di flore mezzo pieno Zacc. 97*

6. *Fragaria sylvestris sterilis maior ac fativam plane refereas, flore maiore. Fragaria sterilis maior Mentz. Pag.*

7. *Fragaria sterilis minor non repens & acaulos ferme, flore minimo ex albo carneo, petalis cordatis*

FRANCA maritima supia saxatilis glauca Ericoides sempervireas, flore purpureo Michel. Nov. Plac. Gen. 23. Tab. 22. fig. 1

FRANGULA Inft. R. H. 612. * *Frangola Matth. 1334. Sinus baccifera Tabern.*

FRAXINELLA Inft. R. H. 430. * *Dittamnium album, seu Fraxinellum Cesp. 589. Dittamo bianco Matth. 144. Dittamo bianco, Dittamo Fraxinella Ric.*

FRA-

FRAXINVS florifera boerhynides Infl. R. H. 577. * *Fraxini fructus* in Officinis vocantur *Lingua Avis*

FRITILLARIA maxima, flore obsoleta purpurea Infl. R. H. 377

FUMARIA Florentina scandens, viticulis longissimis, foliis latinibus, floribus albis deorsum reflexis, cum rictu acropurpureo, in spicam cernuam digestis. *Fumaria alba* Adv. 338. *Fumaria altera caulibus longioribus, flore candicante* *Cesalp.* 272

2. *Fumaria* Officinarum foliis glaucis, floribus in spica longiuscula recta dispositis, rubris, rictu acropurpureo. *Fumaria* Officinarum & *Dioscoridis*, flore purpureo C. B. Pin. 143. * *Fumaria piedi di Gallina prima* Mattb. 1218. Hac & sequens *Fumaria* usitiores in Officinis sunt, vocanturque *Fumaria*, *Fumus Terra*, *Capnos*, & *Fumoflerno* Ric.

3. Eadem foliis maioribus viridibus & in oblongos lobos divisis, floribus in spica recta digestis, rubris, inferna parte candicantibus, rictu saturatius purpureo. * *Fumaria piedi di Gallina secunda* Mattb. Descript. 1219. & *Fumaria* sic. 1217. *Fumaria* & *Fumus terra* *Cesalp.* 272

4. *Fumaria* lutea C. B. Pin. 143. * *Coridali Split* Mattb. 1219. *Split* *Cesalp.* 271

5. *Fumaria* bulbosa, radice cava, maior, flore albo Infl. R. H. 422

6. *Fumaria* bulbosa, radice cava, maior, flore rubro dilutius Infl. R. H. 422. * *Leontopetalon alterum* *Cesalp.* 271. Haec duo *Fumaria* bulbosa species in Offic. vocantur *Aristolochia cava*, & *Radix cava*



ALEGA vulgaris floribus caeruleis Infl. R. H. 398. * *Ruta Capraria*, *Lavanse* Mattb. 780. *Caprago*, vulgo *Galea*, in *Hetruria* *Avanese*, floribus purpureis *Cesalp.* 249. Hac & sequens in Officinis promiscue vocantur *Ruta Capraria*, seu *Caprago*, & vulgo *Capraggine*

2. *Galea* vulgaris floribus penitus candicantibus Infl. R. H. 399

GALEOBDELON foliis Vrticæ dilute virentibus, flore luteo. *Galeobdolon* Dill. Cat. Gist. 49. & Nov. Plant. Gen. 102. *Galeopsis* sive *Vrtica iners*, flore luteo L. B. 3. 323. Infl. R. H. 185

2. Idem foliis atrovirentibus

3. *Galeobdolon* foliis Vrticæ amplioribus & maculatis, flore luteo. *Galeopsis* lutea amplioribus foliis maculatis Infl. R. H. 185

GALEOPSIS procerior setida spicata Infl. R. H. 185

2. *Galeopsis* hirsuta setida, Melidæ folio, spica longissima alba

3. *Galeopsis* Hispanica frutescens, Teucrii folio Infl. R. H. 186

4. *Galeopsis* palustris, Betonicæ foliis, flore variegato Infl. R. H. 185. * *Tertiola* *Cesalp.* 451. *Betonica setida* Gesn.

GA-

GALEOPSIS, vide CANNABINASTRYM, & GALEOBDOLON

GALLIVM album Linifolium Barr. Obf. 12. n. 99

2. Gallium album vulgare (armentosum latifolium) Inft. R. H. 115.

* *Lappago* *Casalp.* 325. *Mollugo* C. B.

3. Gallium Alpinum latifolium minus, floribus albis odoratis

4. Gallium Alpinum pumilum erectum angustifolium album

5. Gallium luteum Inft. R. H. 115. * *Gallio* *Matth.* 1190. *Galium flore luteo* *Casalp.* 325

6. Gallium nigro purpureum montanum tenuifolium Inft. R. H. 115

GENISTA lincea Inft. R. H. 643. * *Genista linceo rotundo robustiore ac magis flexibili* *Casalp.* 115. *Genista* *Offic.* *Ginestra vulgo*2. Genista Florentina frutescens, tota glabra, viminibus angulosis & plerumque triangularibus, foliis partim acutis partim retusis, floribus luteis, siliquis glabris. *An Genista maritima frutescens Linifolia, caule alato* *Coroll.* *Inft.* R. H. 44

3. Genista, an ramosa foliis Hyperici Inft. R. H. 643

4. Genista tinctoria Germanica Inft. R. H. 643

5. Genista tinctoria Germanica, foliis angustioribus Inft. R. H. 643. * *An Ginestra* *Matth.* 12956. Genista tinctoria Linifolia * *Coroncola seu Cornicola* *Casalp.* 251. *Flor tinctorius Fuchs.*

7. Genista radiata, sive Stellaris Inft. R. H. 643

GENISTA SPARTIVM maius, longioribus aculeis Inft. R. H. 645. *Bot. Par.* 78. * *An Spina Christi vulgo* *Casalp.* 1172. Genista Spartium minus Germanicum Inft. R. H. 645. * *Alius suffrutex Coroncola similis altior* *Casalp.* 251

GERANIVM Batrachinides folio Aconiti, flore albo lineis cæruleis variegato Inft. R. H. 266

2. Geranium Batrachinides, Gratia Dei Germanorum Inft. R. H. 266

3. Idem Alpinum & minus, flore purpureoviridato, petalis leviter cordatis

4. Geranium Batrachinides odoratum Inft. R. H. 266

5. Geranium Batrachinoides, flore purpureo reflexo, Italicum Barr. Icon. 39

6. Geranium Romanum versicolor sive striatum Inft. R. H. 267

7. Geranium tuberosum maius Inft. R. H. 267. * *Geranio I.* *Matth.* 902

8. Geranium Argenteum Alpinum Inft. R. H. 267

9. Geranium Columbinum maximum, Asphodeli radice, foliis profunde dissectis, floribus saturate purpureis, petalis pene cordatis octo lineas longis & sex latis. *Geranium sanguineum, maximo flore* *Inft.* R. H. 267

10. Idem flore purpureo, venis concoloribus & saturatioribus distincto, externe valde dilato, petalis cordatis, septem lineas longis & sex latis

11. Idem maius, flore saturate purpureo, petalis altius cordatis, octo lineas longis, & quinque latis

12. Geranium maius, flore parvo saturate purpureo. *Geranium bematodes purpureum, parvo flore, Italicum* Barr. Obf. 55

13. Idem maius, foliis simpliciter laciniatis, flore purpureo minore, petalis cordatis

14. Ge-

14. *Geranium Columbinum*, dissectis foliis, pediculis florum longissimis Inst. R. H. 268
15. *Geranium Columbinum* maius, foliis tenuiter dissectis, foliis florum bifidis Inst. R. H. 268
16. *Geranium folio Malvæ rotundo* Inst. R. H. 268. *Geranio II. Matth.* 903. *Pie Colombino Ric.*
17. *Geranium Africanum arborescens*, Malvæ folio placo & lucido, flore elegantissimo kermisio Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 262
18. *Geranium Africanum arborescens*, liliici folio rotundo (circulo nigrescente infecto) Carlinæ odore Herman. H. L. Bat. 275
19. *Geranium Africanum frutescens*, Malvæ folio laciniato odorato instar Melissæ, flore purpurascente Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 263
20. *Geranium Africanum frutescens* (viciculis procumbentibus) Malvæ folio laciniato & odorato Herman. H. L. Bat. 277
21. *Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio* (circulo nigricante infecto) floribus albidis Herman. H. L. Bat. 282
22. *Geranium Africanum* (procumbens) foliis inferioribus Afari, superioribus Staphysagris maculatis, splendentibus, Acetosæ sapore Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 262
23. *Geranium triste*, sive *Indicum noctu olens* Inst. R. H. 270
24. *Geranium Alpinum*, Coriandri folio, longius radiculatum, flore purpureo maiore Michel. H. Pis.
25. *Geranium Rubertianum rubens* maius & maiori flore Michel. H. Pis. *An Gerani Robertiani altera species, flore maiore Adv.* 296
26. *Geranium Robertianum l. viride* Inst. R. H. 268. * *Geranio V. Matth.* 906. *Panax Heracleum Ang. Rupertiana Cæsalp. Herba Ruperti Lagd.*
27. *Geranium Cicutæ folio*, acu longissima Inst. R. H. 268
28. *Geranium Cicutæ folio* lodorum Inst. R. H. 269
29. *Geranium Cicutæ folio* minus supinum Inst. R. H. 269
30. *Geranium folio Althææ* Inst. R. H. 268. * *Geranio VI. Matth.* 907

GEVM rotundifolium maius Inst. R. H. 251

GLAVCIUM foliis multum laciniatis & crispis, flore luteo, siliqua prælonga glabra. *Papaver sylvestre corniculatum* Trag. 123. *Papaver cornutum Cord. Hist.* 131. * *Papavero Cornuto Matth.* 1116. *Papaver Corniculatum Cæsalp.* 270

2. Idem flore pallido

3. *Gladium foliis parum laciatis*, flore luteo, siliquis asperis * *Ha tres Gladii species usurari possunt pro Papavere Cornuto Offic. & Ric.*

4. *Gladium Orientale*, flore magno rubro Coroll. Inst. R. H. 18

GLAVX maior palustris, flore herbaceo Boce. Mus. Part. 2. 105

GLOBULARIA vulgaris Inst. R. H. 467. * *Bellis carulea C. B.*

2. *Globularia montana humillima* repeos Inst. R. H. 467

GLYCYRRHIZA capite echinato Inst. R. H. 389

2. *Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica* Inst. R. H. 389. * *Glicirrhis, o Regolitia Matth.* 688. *Glyciriza vulgo Liquiritia Cæsalp.* 251. *Logorizia Ric. Glycyrrhiza Offic. Liquiritia & Vguzia vulgo*

F

GRA-

GRAMINEVM

ORDO I

Gramina Loliacea

- G**RAMEN loliaceum, radice repente, sive Gramen officinarum Inst. R. H. 516
2. Gramen loliaceum, radice repente, sive Gramen officinarum, aristis longioribus donatum Inst. R. H. 516
 3. Gramen loliaceum, radice repente, maritimum Inst. R. H. 416
 4. Idem totum glaucum
 5. Gramen loliaceum corniculatum, spicis villosis Inst. R. H. 516
 6. Gramen loliaceum Alpinum, foliis latis, subtus & ad margines hirsutis, spicis corniculatis glabris & aristatis
 7. Gramen loliaceum villosum latifolium perenne, spicis partialibus multiplicibus & aristatis
 8. Gramen loliaceum corniculatum, veluti fruticosum, foliis angustissimis Inst. R. H. 517
 9. Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis Inst. R. H. 517

ORDO II

Gramina Secalina

- GRAMEN** spicatum vulgare, fsecalinum Inst. R. H. 527
2. Gramen fsecalinum, bulbosa radice, seu ex Alepo Bauhini Scheuchz. Agrostograph. 19

ORDO III

Gramina Spicata locustis simplicibus

- GRAMEN** spicatum semine miliaceo albo Inst. R. H. 518
2. Gramen spicatum, spica cylindracea longioribus villis donata
 3. Gramen spicatum, spica cylindracea tenuissima longiore Inst. R. H. 520
 4. Gramen spicatum, spica cylindracea longissima Inst. R. H. 519
 5. Gramen typhioides alpinum, spica brevi densa & veluti villosa Scheuchz. Prodr. Gram. 17
 6. Gramen spicatum aristis pennatis Inst. R. H. 518
 7. Gramen spicatum fsecalinum maritimum pumilum repens, Arundinis folio & facie, foliis superna parte villosis, spica laxa non aristata Michel. H. Pil. 72

8. Gra.

8. *Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore* Inst. R. H. 518

O R D O IV

Gramina spicata locustis biglumis

- GRAMEN avenaceum montanum Inst. R. H. 524
2. *Gramen anthoxanthum spicatum* Inst. R. H. 518

O R D O V

Gramina Dactyloidea

- GRAMEN dactylon, radice repente, sive *Gramen officinarum* Inst. R. H. 520. * *Gramen Cesp.* 183. *Sanguinella* Matth. 1054
2. *Gramen dactylon minus*, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis Michel. H. Pl. 75
3. *Gramen dactylon folio latiore* Inst. R. H. 520
4. *Gramen dactylon folio latiore, spicis nigris disjunctis* Bot. Par. 85. num. 36

O R D O VI

Gramina Miliacea glumis simplicibus

- GRAMEN arundinaceum Halepense, *Tragopogonis* folio, D. Bobart. Plux. Alm. Phytogr. Tab. 32. fig. 1
2. *Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis semine* Inst. R. H. 523
3. *Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis semine, folio variegato* Inst. R. H. 523
4. *Gramen miliaceum alpinum erectum latifolium, panicula sparsa aristata, locustis lineam longis*
5. *Idem angustifolium, panicula sparsa non aristata*
6. *Idem supinum, panicula sparsa non aristata*
7. *Gramen caninum supinum vineale latifolium serotinum, panicula sparsa, locustis minimis non aristatis*
8. *Gramen paniculatum supinum (præcox) ad infima culmorum genicula foliorum capillarum fasciculis donatum (aristatum)* Scheuchz Agrostograph. 141

O R D O VII

Gramina Avenacea

- GRAMEN avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus Inst. R. H. 525
 2. Gramen nodosum, avenacea panicula Inst. R. H. 525
 3. Gramen avenaceum iuncoides, foliis angustissimis, panicula quoquo versu expansa, locustis albicantibus bilinearibus, glumis per basim villosis & in linearem aristam desinentibus
 4. Græmæ prætense paniculatum molle Inst. R. H. 522
 5. Gramen caninum paniculatum molle Inst. R. H. 522
 6. Gramen avenaceum capillaceo folio, panicula ampliore, locustis splendentibus Inst. R. H. 525
 7. Gramen avenaceum parvum procumbens, panicula non aristata Inst. R. H. 525
 8. Gramen avenaceum, sparsa panicula speciosa, locustis minimis Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 215. sect. 3
 9. Gramen avenaceum parvum procumbens, panicula non aristata Raii Hist. 1288

O R D O VIII

Gramina locustis compositis panicula sparsa

- GRAMEN avenaceum altissimum glabrum, foliis asperis, panicula pene aristata (glumis ab basim villosis) caule pleno rigido D. Michx. H. Pis. 74.
 * Hoc procul dubio est *Ampelodesmos* cuius meminit Plinius L. XVII Hist. Nat. cap. 23 non solum enim in Sicilia, sed in Ora etiam maritima Neapolitana, ac nonnullis Adriatici litoris locis huius Graminis foliis siccatis, ac deinde madefactis rustici utuntur vininum loco ad Vites continendas, quemadmodum supius mihi narravit Michx.
 2. Gramen avenaceum aquaticum Inst. R. H. 526
 3. Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula heteromalla, locustis semiuncialibus breviter aristatis
 4. Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicantibus & aristatis Inst. R. H. 526
 5. Gramen avenaceum, locustis angustis glabris candicantibus & aristatis Inst. R. H. 525
 6. Gramen paniculatum alpinum, radice crassissima, foliis rigidis (superne parte magis glaucis) striatis & asperis, panicula fusca non aristata Michx. H. Pis. 75
 7. Gramen Orientale paniculatum, Portulacæ semine Cotoll. Inst. R. H. 39
 8. Gramen prætense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis Inst. R. H. 524

9. Gra-

9. *Gramen paniculatum*, spicis crassioribus & brevioribus *Inst. R. H.* 521
10. *Gramen paniculatum alpinum*, foliis prælongis, spicis crassioribus & brevioribus, staminibus florum albis
11. *Gramen paniculatum maritimum vulgatissimum* Raii *Synops. Ed.* 2. 259. num. 18. & *Ed.* 3. 409. num. 6
12. *Gramen paniculatum alpinum angustifolium*, panicula non sparsa, locustis pene aristatis
13. *Gramen paniculatum perenne*, capillaceo folio, panicula heteromalla, locustis longioribus aristatis
14. *Gramen alpinum angustifolium paniculatum proliferum*
15. *Gramen paniculatum angustifolium*, panicula uno versu disposita & pene aristata
16. *Gramen paniculatum alpinum*, angustifolium, caulibus reclinatis, panicula sparsa & quoquo versu tendente, locustis parvis non aristatis
17. *Gramen Avenaceum minus*, foliis inferioribus capillaceis, superioribus vero latioribus *Inst. R. H.* 525. Bot. Par. 94. num. 8
18. *Græmo paniculatum Alpinum*, foliis latis brevioribus & carinatis, panicula heteromalla densiore, locustis lanceatis mutis
19. *Gramen pratense* (annuum) paniculatum minus album (panicula heteromalla) *Inst. R. H.* 521
20. *Gramen filicinum rigidiusculum* Bor. Par. 92. num. 73. Tab. 18. fig. 4. *Gramen minus vulgare*, panicula rigida *Inst. R. H.* 522

O R D O I X

Gramina Bromoidæa

- GRAMEN avenaceum* panicula sparsa, locustis maioribus aristatis *Inst. R. H.* 526
1. *Gramen avenaceum spicatum alpinum*, spica heteromalla, locustis semuncialibus mutis
 2. *Gramen bromoides*, locustis maximis, lanuginosum, Italicum Scheuchz. *Hist. Gram.* pag. 261
 3. *Gramen bromoides murorum lanuginosum erectum*, locustis amplioribus aristatis in panicula compacta propemodum spicata & veluti in *Alopecuroide* dispositis Michel. H. Pif. 76
 4. *Gramen bromoides annuum*, caule pedali (vix se sublinens) locustis maioribus compressis lanuginosis & aristatis Mich. H. Pif. 75
 5. *Gramen bromoides annuum*, caule pedali (vix se sublinens) locustis maioribus compressis glabris Michel. H. Pif. 76
 6. *Idem præcox*, locustis minoribus aristatis
 7. *Gramen pratense annuum minus*, panicula lata speciosa heteromalla aristata Michel. H. Pif. 76
 8. *Gramen tomentosum Creticum spicatum*, spica purpurea Coroll. *Inst. R. H.* 39
 9. *Gramen spicatum*, spica purpureo argentea molli Tournefortii alterum, locustis maioribus Michel. H. Pif. 72
 10. *Gramen spicatum*, spica cylindræa molli & laxa *Inst. R. H.* 520
 11. *Gramen*

12. *Gra-*

12. Gramen paniculis elegantissimis sive *ἰσάπυρος* maius Inst. R. H. 522
 13. Gramen paniculis elegantissimis minimum Inst. R. H. 522
 14. Gramen paniculatum maius perenne, locustis magnis tremulis Michel.
 H. Pis. 75
 15. Gramen tremulum minus, locustis parvis triangulis D. Sherard. Raii
 Meth. Plant. 179

GRAMEN *dasylon* Indicum esculentum, spica articulata Mont. Cat.
 Stirp. Agr. Bon. Prodr. 63

2. Gramen *dasylon* Orientale maius Frumentaceum, semine Napi
 Eiusd. Ibid.

GRANADILLA Indica scandens & sempervirens, radice repente, foliis
 palmatis, flore magno albedo, quadruplici filamentorum versicolorum serie
 obvallato, fructu aureo ovi gallinacei magnitudine & forma. *An Grana-*
dilla polyphyllor fructu ovato Inst. R. H. 241

* *Voussissima* hac *Granadilla* species ex qua nam America provincia ad
 nos advecta primum fuerit ignoramus. Vulgatissima tamen nobis nunc est &
 ad topiaria opera valde expetita, utpote qua capreolis suis excelsos quosque
 parietes scandat, & foliis saturatus virentibus vestiat hyemis rigoribus in-
 vicula, præterea uberi florum ac fructuum proveniunt oculis non parum oblectet.
 Radix eius fibrosa est, fragilis, colore ex pallido albicante, sapore subdul-
 ci veluti recutis saba, geniculata repens ac admodum prolifera. Sarmen-
 ta emittit multa intus fungosa, qua si fulcrum nullum reperiant gracilia perma-
 nent, ac terram tangentia facile se propagant & geniculis, sive alis foliorum
 fibras demittendo: Si vero capreolis suis arborem vel parietem arripiant, in trun-
 cum insignem crescunt ligno levissimo constantem, & *Hederæ*, vel potius *Pe-*
rioploæ foliis oblongis Inst. R. H. qua excelsam quandam arborem conscende-
 rit ligni ad instar porosum ac subtilissimis tubulis constant. Folia simul cum
 capreolis ad singula intervodia & sinu foliorum duorum lunatorum prodent
 planta tenere parva integra vel trifida, adulta vero magna palmata seu quin-
 quesariam & quandoque septesariam scissa, lœvia nervosa & aliquantulum ve-
 nosa, superne saturatus virentia inferne glauca, odore gravi ferre *Xyridis*,
 sapore satuo. Harum incisura media longior est, cætera gradatim minores,
 omnes autem in medio latiores, in apice & petiolum versus extenuata, nusquam
 ferrata vel laciniata ut in novuillis aliis *Granadilla* speciebus contingit. Ma-
 gnitudine admodum variant hæc folia pro planta ætate vigore vel faciliori
 ascensu, a biunciali squidem, ad spithameam amplitudinem perveniunt. Pe-
 tiolo brevi adnæctuntur dilute virescute, superna parte in canaliculum effor-
 mato, cuius margines binis utraque parte minutis verrucis seu clavulis nigri-
 cautibus muniuntur, & quorum extremitate in ingenti æstu guttulam liquoris
 mellis pellucidi distillare observavi. Quotannis ab Iulii mensis initio ad Octo-
 brem totum usque flores ex alis foliorum profert figura illi omnino similis qui
 a Cl. *Tournefortio* pingitur Tom. II. Inst. R. H. Tab. 123. Sed per omnia ma-
 iores. Calycis triphylli exterioris lamina tenues sunt, cochlearis instar exca-
 vata, dilute virentes, & dum flor expanditur decidunt. Calyx interior in
 laminas quinque petalis similes dividitur, crassas, & lato principio sensim in
 acutum productas, in apice retusas & acuto molli hamato instructas, costu-
 lis externe per longitudinem distinctas, extus dilute virentes, intus autem
 can-

candicantes. Petala quinque pyramidata obtusa plana, magnitudine laminarum calycis, candida & ferme pellacida. Calyx in centro foris acetabulum infigne efformat, cuius labia duplici corallii seu sepe obvallantur. Exterior nempe duobus tribus vel quatuor ordinibus mollium filamentorum seminucliarum ex albo & caruleo eleganter variegatorum constat, interior vero tribus pariter ordinibus filamentorum semilinearum ferrugineorum, apice crassiusculo, exiguos clavos aliquatenus representantium. E supradictis acetabulis centro surgit stilus columnaris, qui ad acetabuli os perveniens in patinam velati quamdam expanditur & petalorum ac filamentorum plano coequatur, acetabuli cavitatem perfecte claudens, qua molles pellucido liquore repleti est; deinde vero columnarem rursus formam induit ex albo nonnihil virescens, & ad seminucliarum altitudinem exporrigitur. In summitate fenditur in quinque radios complanatos & nonnihil incurvatos, quorum extremitatibus apices seu testiculi oblongi compressi aurei & in filiquas veluti duas divisi aureo pulvisculo refertis ita adnectuntur ope fili seu axis cuiusdam, ut versatiles sint, in flore nempe nondum recluso clavis seu capillamentis Embryonis apprimuntur, in aperto vero, acetabulum versus inclinantur. In centro radiorum horum apices substituentium erigitur Embryo, seu bacca ovata exigua & viridi pariter albicans, cuius summitati innascuntur tuba tres vel quatuor claviformes & nigro purpureo variegata, & versus apices in aperto flore reclinatos diriguntur, adeo ut apicum debiscentium pulvisculus capitulis burum tubarum scabris & glutinosi facile adhaereat. Floris odor veluti Hyacinthi, sed nonnihil gravior. Fructus ovi gallinaei magnitudine & forma, per maturitatem aureus, cortice laevi crasso fungoso intus candido, in tres veluti cellularum dividitur ut exalte demonstrat Tab. 124. Tom. II. Inst. R. H. Semina exigua offusae formae & nigra punctulis seu fissulis albis variegata in vesiculis quibusdam rubris inaequalibus continentur liquore lento rubente subacido repleti. Notandum insuper est florum aridum non decidere maturo fructu ut in Helleboro paucisque aliis plantis accidit. Cl. Michellias haec nobis vulgatissimam Granadilla speciem nulli ex iis quae a variis Auctoribus describuntur vel pinguntur exalte respondere animadvertit. An vero eadem ipsa sit cum aliis nomine tenus a Botanistis designatis, indicari ex descriptione nostra facile poterit.

2. Granadilla folio Hederaceo, flore (subviridi) & fructu minimis Inst. R. H. 241

GROSSULARIA fructu maiore, villis longis rarius dispositis infesto, spinis rectis. * *Voa spina*, *Voa marina*, & *Voa crespina domestica* Matth. 184. *Voa spina* vulgo *Cesalp.* 99

2. Eadem foliis parvis, spinis ternis in apice nonnihil aduncis munita, acinis parvis pubescentibus. * *Voa spina salvatica* Matth. 184. Haec, & superior *Grossularia* species in Offic. audit *Grossularia*, *Voa crispa*, & vulgo *Voa spina*

3. *Grossularia* multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive *Ribes* Officinarum Inst. R. H. 639. * *Alois* vulgo *Ribes* *Cesalp.* 99. *Ribes* vulgare Matth. 185. *Ribes*, & *Ribesum rubrum* Offic.

GVAIACANA angustiore folio Inst. R. H. 600. * *Ermolinus* *Cesalp.* 104. *Loto d' Affrica* Matth. 278

HAR.



ARMALA Inft. R. H. 257. * *Ruta falvatica*. *Harmola* Matth. 778. *Harmel Constantinopolitanorum* *Cafalp.* 573. *Harmel*. Ric.

HEDERA arbores Inft. R. H. 613. * *Hedera baccis in maturitate nigris* *Cafalp.* 92. *Hedera arborea* Matth. 659. *Hellera* Ric. & vulgo

HEDYPNOIDASTRVM perenne glabrum & longius radiculatum, folio Dentis leonis eleganter laciniato, flore amphiore. *Hedypnois Alpina minor saxatilis glabra*, *Dentis leonis folio*, perennis, ex *Montibus Petra Apuana Micheli* H. Pif. *Taraxacoidastrum Dentis leonis folio ad summitate radiato* *Vaill. Nov. Plant. Gen. in Act. Ac. R. Sc. Ann.* 1721. pag. 235. numer. 2. * *Trincatella vulgo*

2. *Hedypnoidastrum* perenne subhirsutum & parvulum, radice brevi praeformis, *Dentis leonis folio*, flore parvo luteo, ac inferna parte ex albo ferrugineo

HEDYPNOIS annua Inft. R. H. 478

HEDYSARVM clypeatum flore suaviter rubente Inft. R. H. 401

2. *Hedysarum clypeatum* flore albedo Inft. R. H. 401

3. *Hedysarum triphyllum* *Canadense* Inft. R. H. 401

4. *Hedysarum triphyllum Americanum*, foliis minoribus & rotundioribus

HELIANTHEMVM vulgare, flore luteo Inft. R. H. 248. * *Panace*, *Chironia* Matth. 785. *Chironia* *Cafalp.* 397. *Hyssopus Campestris* *Trag. Graecia Dei Gesn. Consolida aurea Cord. Chamacilus* C. B.

2. *Helianthemum Venetum* erectum elatius & serme glabrum, foliis oblongis atroviridibus quasi lucidis, flore luteo minore * *Picior verticillos quosdam foliorum male expressis in Leone*, & pilos iusto maiores

3. *Helianthemum maritimum* procumbens, *Rorismarini folio* superne glauco, inferne simul cum caulibus incano, floribus albis

HELLEBORVS niger foetidus Inft. R. H. 272. * *Encephylon* *Cafalp.* 583. *Consiligo* *Gesn. Veratrum nigrum* *Dod.*

2. *Helleborus niger hortensis*, flore viridi Inft. R. H. 272. * *Vn altro Elleboro nero* Matth. 1281. *Helleborus niger* *Cafalp.* 581. *Elleboro nero*. *Nocce* Ric. 37. & vulgo

3. *Helleborus niger hortensis*, flore viridi, alter

4. *Helleborus niger* foliis dissectis Inft. R. H. 272

5. *Helleborus niger* angustioribus foliis (flore albo vel roseo) Inft. R. H. 272. * *Elleboro nero* Matth. 1200. *Hellebori nigri alterum genus* *Cafalp.* 581. *An Elleboro nero dal fior pavonazzo* Ric. 37. *Helleborus niger* verus *Ger. Veratrum nigrum legitimum* *Clus.*

HERMODACTYLVS folio quadrangulo Coroll. Inft. R. H. 50. * *Satyrium* *Cafalp.* 427

HER-

HERNIARIA montana saxatilis perennis glabra (viticulis longioribus humi proleſtis) Michel. H. Piſ. * *Hec, & ſequens uſurpari poſſunt pro Poſtygono minore, Herba Turca, & Millegrana Offic., & Herniaria Ric.*

2. Herniaria fruticosa lignoſa ſubbiſſuta maritima, radice exigua Micheli H. Piſ.

HESPERIS hortensis flore purpureo Inſt. R. H. 222. * *Viola Matronalis C. B.*

2. Hesperis lutea, ſiliquis ſtriſtiſſimis Inſt. R. H. 222. * *Draba lutea C. B.*

3. Hesperis Allium redolens Inſt. R. H. 222. * *Alliaria Matth. 891*

4. Eadem foliis altius inciſis

5. Hesperis Leucoii folio latiore non ſerrato, flore lateo parvo, ſiliqua quadrangula Michel. H. Piſ. * *Viola alba quadam luſu coloris in montibus, foliis rotundioribus Caſalp. 369*

6. Hesperis Leucoii folio ſerrato, ſiliqua quadrangula (flore lateo maiore) Inſt. R. H. 223

7. Hesperis Leucoii folio anguſto non ſerrato, ſiliqua quadrangula longiore & anguſtiore Michel. H. Piſ.

8. Hesperis Leucoii folio anguſto & laxiter ſerrato, ſiliqua quadrangula

9. Hesperis exigua lutea, folio dentato anguſto Boerb. H. L. Bat. P. 2. 20

HIERACIUM fruticosum latifolium hirsutum Inſt. R. H. 472

2. Idem anguſtiſolium

3. Hieracium murorum laciniatum, minus piloſum Inſt. R. H. 471. * *Pulmonaria Gallica Tab.*

4. Hieracium Dentis leonis folio, bulbolum Inſt. R. H. 470

5. Hieracium montanum latifolium glabrum minus Inſt. R. H. 471

6. Hieracium alpinum pratense, Cichorii folio, hirsutum aſperum & peramarum Michel. H. Piſ.

7. Hieracium alpinum Chondrilla glabro & nido folio, maius, flore aureo ac externe ſaturate purpureo

8. Hieracium Chondrilla folio glabrum minus

9. Hieracium aſperum, maiori flore, in limicibus agrorum Inſt. R. H. 469

10. Hieracium Echioides, capitulis Cardui Benedicti Inſt. R. H. 471. * *Buglossum Echioides Lob. Hieracium Echioides C. B. Buglossum luteum Cam.*

11. Idem alpinum Bugloſſi folio

12. Hieracium maritimum umbellatum anguſtiſolium glabrum, Pilofella facie Micheli H. Piſ.

HIPPOCASTANVM vulgare Inſt. R. H. 612. * *Caſſanea Equina appellata Conſtantinopoli Caſalp. 79. Caſſagne Cavalline Matth. 230. Caſſagno d' India vulgo*

HORMINVM Napi folio Inſt. R. H. 178

2. Hormionum ſylveſtre latifolium verticillatum Inſt. R. H. 178

HORMINVM vide SCLAREA

HYACINTHVS Indicus tuberoſus, flore Hyacinthi Orientalis Inſt. R. H. 347

G

2. Hya-

2. *Hyacinthus oblongo flore, cæruleus maior* Inft. R. H. 344. * *Hyacinthus Cæfalp.* 402
3. *Hyacinthus oblongo cæruleo flore, minor* Inft. R. H. 345
4. *Hyacinthus oblongo albo flore, minor* Inft. R. H. 345
5. *Hyacinthus oblongo flore suaviter rubente, minor* Inft. R. H. 345
6. *Hyacinthus Orientalis, flore duplici* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 28
7. *Hyacinthus Hispanicus, flore incarnato* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 32
8. *Hyacinthus Orientalis, flore pleno cæruleo purpureo, clavo longo, petalis modice reflexis* Boerh. Ind. Alter. H. L. Bat. Part. 2. 112. num.
9. *Hyacinthus Orientalis, flore pleno ex purpureo & cæruleo vario* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 55
10. *Hyacinthus Orientalis, flore pleno ex cæruleo & pallido vario, clavo longo tenuique* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 114. num. 56
11. *Hyacinthus Orientalis, flore pleno cæruleo lituris celestinis, clavo longo plano anguloso* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 49
12. *Hyacinthus Orientalis flore plenissimo candidissimo toto, clavo conico, petalis maxime reflexis, caule & flore maximis* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 45

HYDROCERATOPHYLLON folio aspero quatuor cornibus donato
Vaill. in Ag. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 21. num. 1

HYDROCOTYLE vulgaris Inft. R. H. 328. * *Cotyledon aquatica* Dod.

HYOCSYAMVS vulgaris vel niger Inft. R. H. 88. * *Hiofiamo* Matth.
1118. *Hyoftiamus niger* Offic.

2. *Hyoftiamus minor, albo similis, umbilico floris atropurpureo* Coroll. Inft. R. H. 5. * *Hyoftiyami alterum genus in maritimis Cæfalp.* 345. *Hec Hyofiyami species pro Hyofiyamo, Iufquiamo albo, & Dente Caballino usurpari potest*
3. *Hyoftiamus Creticus luteus minor* Inft. R. H. 118

HYPERICVM vulgare Inft. R. H. 254. * *Hec, & due subsequenter Hyperici species promiscue usurpantur pro Hyperico, Perforata, Herba S. Ioannis, & Fugadamone* Offic. vocanturque vulgo Pilatro

2. *Idem caulibus rubentibus* * *Hypericum vulgo autem Perforata Cæfalp.* 394
3. *Idem caulibus palliscentibus, flore ampliore*
4. *Hypericum crispum, triquetro & cuspidato folio* Inft. R. H. 255
5. *Hypericum frigidum frutescens* Inft. R. H. 255. *Tragium* Pon. *Astycrum legitimum* Bell. ad Clus.
6. *Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato* Inft. R. H. 255
7. *Hypericum, an Alpinum humilius, magno flore punctato* Inft. R. H. 256
8. *Hypericum palustre supinum tomentosum* Inft. R. H. 255

HYSSOPVS Officinarum cærulea, seu spicata Inft. R. H. 200. * *Hissopo* Matth. 733. *Hyssopus Cæfalp.* 462. *Hissopo domestico di Mesue, e Isopo volgare Ric.*

2. *Hyssopus vulgaris alba (latifolia)* Inft. R. H. 201



ACEA laccæ Babilonicæ maximæ similis, floribus paniculatis
D. Sherard. Raii Hist. Tom. 3. 207

2. Iacca montana foliis latis & subrotundis

3. Iacca vulgaris laciniata, flore purpureo Inst. R. H. 443

4. Iacca montana incana laciniata, flore purpureo

5. Iacca montana saxatilis atrovirens tenuifolia lutea Michel. H. Pif.

6. Iacca cinerea laciniata, flore purpureo Inst. R. H. 444

7. Iacca sive Serratula alpina, foliis subrotundis minus laciniatis, flore purpureo

8. Iacca nemorensis, quæ Serratula (maior) Inst. R. H. 444. * Cerretta & Serratula Casalp. Solidago Sarracenica Lon.

9. Iacca alpina nigra humilis foliis cichoraceis in amplas, & angustas laciniis usque ad costam divisis & nonnihil ad margines crispis, flore purpureo coronato, squamis ad extremitatem nigricantibus & pennatis, feminibus nudis

10. Eadem capitulis tenuioribus, squamis in longiusculum nigricantem & pennatum apicem desinentibus

11. Iacca montana, purpurea (maior) foliis laciniatis viridibus & asperis, squamarum capitulorum aciebus pennatis & nigricantibus (floribus coronatis, semine nudo) Michel. H. Pif.

12. Eadem minor

13. Iacca montana incana erecta, foliis laciniatis, flore purpureo coronato, calyce cum squamis ad extremitatem acutis nigricantibus & pennatis, feminibus marginalibus nudis, discoideis vero pappis

14. Iacca maritima supina incana purpurea, foliis laciniatis, capitulis parvis H. Pif.

15. Iacca (annua) foliis cichoriaceis villosis, altissima, flore purpureo Inst. R. H. 444

16. Iacca praensis caule atropurpureo, foliis cichoriaceis omnibus ample laciniatis. * Hac & sequentes Iacca species pro Stabe Offic. usurpari possunt

17. Eadem foliis imis integris, cæteris laciniatis

18. Eadem foliis saturate viridibus ac plerumque integris

19. Eadem caule viridi, foliis cichoriaceis angustioribus, laciniatis, & non laciniatis

20. Eadem præalta, caule viridi, foliis cichoriaceis omnibus integris

21. Iacca maritima supina purpurea, integro rigido nigricante folio, squamarum capitulorum aciebus fuscis & pennatis Michel. H. Pif.

22. Iacca humilis incana pratensis, folio integro Ambros. 295

23. Iacca angustifolia, flore purpureo coronato, semine nudo, calyce crassiori, squamis nigricantibus perangustis acutis & magis pennatis. Iacca supina, incana, purpurea Bot. Far.

IACOBÆA Senecionis folio incana perennis Raii Hist. 285

2. Iacobæa montana, Senecionis folio Barr. Obf. 97

3. Iacobæa Senecionis folio tenuiter laciniato, flore luteo, semisifoculis integris

4. Iacobæa, an Cineraria Lampanæ foliis Hort. Cathol. Supplem. 3

5. Iacobæa maritima Inst. R. H. 486. * Cineraria Casalp. 500

6. Iacobæa vulgaris Raphani folio. * Herba S. Iacobi Eufb.

G 2

7. Ia:

7. *Iacobza alpina*, foliis subrotundis serratis Inft. R. H. 485

IACOBÆA vide *DORIA*

IALAPA flore purpureo Inft. R. H. 129. * *Gelfimum rubrum* *Cafalp.* 154. *mirabilis Peruviana* *Ger. Solanum Mexicicanum* C. B. Gelfamin della Notte vulgo
2. *Ialapa* flore ex purpureo & luteo mixto Inft. R. H. 129

IASMINOIDES aculeatum, falicis folio, flore parvo ex albo purpureo Michel. Nov. Plant. Gen. 224. Tab. 105. Fig. 1. * *Rhamno primo* *Matth.* 177. Spina da Crocifissi vulgo

2. *Iasminoides* aculeatum humile, Halimi minoris folio, flore maiori violaceo, fructu crassiore per maturitatem flavescente Michel. Nov. Plant. Gen. 224. Tab. 105. fig. 2. * *Rhamnus Palestinus* H. Mauroc.

IASMINVM Alexandrinum, Citri folio, flore pleno Barr. Obf. 123. Icon. 63

2. *Iasminum* five *Sambach* *Arabum* folio acuminato, flore stellato maiore (femipieno) albo odoratissimo, vulgo *Mugarino* H. Mauroc. & H. Pif. Tab. 31.

3. *Iasminum* *Azoricum* flore albo Inft. R. H. 597

4. *Iasminum* vulgare flore albo Inft. R. H. 597. * *Iefiminus* *Marc.* 40. *Gelfimum* *Cafalp.* 153. *Gelfomino* *Matth.* 95. *Gelfimum* & *Iasminum* *Offic.* *Gelfomin* *salvatico* vulgo

5. *Iasminum* *Hispanicum*, flore maiore externe rubente Inft. R. H. 597. * *Gelfimini* *genus humilis primum* *Cafalp.* 153. *Gelfomino* di *Catalogna* vulgo

6. *Iasminum* *Indicum*, flavum, odoratissimum *Ferr. Flor. Cult.* 393

7. *Iasminum* five *Gelfimum* luteum Inft. R. H. 597. * *An Iefiminus* *luteus* *Marc.* 40. *Gelfomin* *Giallo* vulgo ut & *frequent*

8. *Iasminum* luteum, vulgo dictum, bacciferum Inft. R. H. 597. * *Gelfimini* *genus humilis alterum* *Cafalp.* 153. *Polemonium* *Gefn.* *Ruta* *Capraria* *quorundam*. *Ruta* *baccifera* *Tabern.* *Trifolium* *fruticans* *Dod.*

IMPERATORIA maior (femine minore) Inft. R. H. 317

2. Eadem rugosioribus foliis, femine duplo maiori. * *Ha dua Imperatoria* *species promissae usurpantur pro Imperatoria* & *Ostrutio* *Offic.*

IRIS *Florentina*, flore minore, tribus petalis inferioribus violaceis latis ac brevibus, ceteris dilute caeruleis. * *An Iride domestica* *Matth.* 18

2. *Iris* *Florentina* latifolia, flore maiore purpureoviolaceo. * *Iris* vulgo *Lilium purpureum* *Cafalp.* 421. *Gbiaggiuola* *Ric.* *Giaggiuolo* vulgo

3. *Iris* *Florentina* latifolia, flore albo, petalis angustis. *Iris* *alba* *Florentina* Inft. R. H. 358. * *Iris* cuius *flor ex toto candidus* *Cafalp.* 421. *Irios*, *Ireos*, & *Iris* *Florentina* *Offic.* ut, & *superior*

4. *Iris* *Sufiana*, flore maximo ex albo nigricante Inft. R. H. 358

5. *Iris* foetidissima, seu *Xyris* Inft. R. H. 360. * *Xiride* *Matth.* 1044. *Spasula* *fatida* *Cafalp.* 442. *Gladiolus* *fatidus*, *Xyris* *Dioscoridi* C. B. *Ricortala* vulgo

6. *Iris* angustifolia foetida, foliis procumbentibus. *An Iris pratensis angustifolia*, folio *fatido* Inft. R. H. 360

7. *Iris*

7. *Iris palustris lutea* Infl. R. H. 360. * *Aceris* sive *Iris palustris* *Cesalp.* 422. *Aceris falso* *Mattb.* 24
8. *Iris maritima humilis*, foliis latis, flore luteo diluore, Liliū conval-
lium odore
9. *Iris montana humilis*, foliis latis, flore pallido inodoro, cum tribus pe-
talis inferioribus lineis luridis distinctis. *Iris flore pallida* *Cesalp.* 422
10. *Iris angustifolia*, *Prunum redolens*, minor Infl. R. H. 361

ISATIS sativa vel latifolia Infl. R. H. 211. * *Isatis sativa* *Marc.* 155.
Glaſtum vulgo Guadum *Cesalp.* 358. *Glaſto domeſtico* *Mattb.* 669. *Guadum vulgo*
2. *Isatis*; an *sylvestris* vel *angustifolia* Infl. R. H. 211. *Glaſto ſalvatico*
Mattb. 630. *Isatis quæ ſponte in arvis naſcitur* *Cesalp.* 358

- IVNCOIDES nemorosum villosum latifolium maius, flore minore Michel. Nov. Plant. Gen. 41. num. 1
2. *Iuncoides* nemorosum villosum angustifolium minus, flore maiore Michel. Nov. Plant. Gen. 41. num. 2
3. *Iuncoides* *Alpinum* medium villosum latifolium, panicula sparſa, capi-
tulis feminum longiusculis

- IVNCVS acutus, capitulis Sorghi Infl. R. H. 246
2. *Iuncus acutus maritimus* *Anglicus* *Park. Theatr.* 895
3. *Iuncus acutus*, panicula sparſa Infl. R. H. 246
4. *Iuncus parvus* cum pericarpis rotundis Infl. R. H. 247
5. *Iuncus* foliis articulosis erectis, radice repente crassiori Michel. Nov.
Plant. Gen. 38. num. 3
6. *Iuncus* foliis articulosis, floribus umbellatis Michel. Nov. Plant. Gen. 18. n. 6
7. *Iuncus* foliis articulosis, floribus umbellatis cum utriculis Infl. R. H. 247

- IVNIPERVS media foliis liratis, baccis rubris (medie magnitudinis) Michel.
H. Pif. * *Juniperus montanus fructu ſavo* *Cesalp.* 137. *Ginepro roſſo vulgo*
2. *Juniperus vulgaris*, fruticosa (baccis rotundis) Infl. R. H. 588. * *Gi-
nepro* *Mattb.* 135. *Ginepro*, & *Ginebro Ric. & vulgo*. *Juniperus Offic.*
3. *Eadem* baccis oblongis
4. *Juniperus vulgaris*, foliis longioribus, baccis maioribus compressis
5. *Juniperus minor montana*, folio latiore, fructuque longiore Infl. R.
H. 589
6. *Juniperus maior arboreſcens*, ſive *vulgaris ſterilis* & *mas* *Flor. Aldorf.*



- ALI maius cochleato femine Infl. R. H. 247
2. *Kali spinosum* villosum annuum, foliis crassioribus & bre-
vioribus, calyce membranaceo, femine cochleato
3. *Kali hirsutum* annuum, foliis teretibus crassis, floribus in
foliorum alis nascentibus, calyce aculeato ac transverse oblon-
gato, femine ferri equini figuram mentiente. An *Chenopodium Sedi folio*
minimo, *Kali facie*, *hirsutum*, & *caudum* *Zannich. Iſt.* 64. num. VII. An
Kali

Kali parvum birsutum I. B. 3. 702. *Kali minus*, villosum C. B. Pin. 289. Prodr. 133. *Ctenopodium Sedi* foliis teretibus Buxb. Cent. 1. pag. 21. Tab. XXXI. fig. 1

4. *Kali* annuum villosum parvum, Sedi folio, calyce membranaceo, semine ferri equini figuram præferente. *Kali species vermicularis marina arborens* I. B. 704. * *An frutex tertius in maritimis asperis* Casalp. 155

5. *Kali minus album*, semine splendente C. B. Pin. 289. * *An Salsola quædam in maritimis* Casalp. 170

6. *Kali album* foliis angustioribus, semine splendente

KETMIA Syrorum quibusdam Inst. R. H. 99. * *Alcea arborens* Syriaca C. B.

2. *Ketmia* Syrorum, flore purpureo-luteo Inst. R. H. 99

3. *Ketmia* Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici Inst. R. H. 100. * *Rosa della China vulgo*

4. *Ketmia peregrina*, Populi folio subtus incano, flore amplissimo flavescente, umbilico sanguineo

5. *Ketmia palustris* foliis latis subrotundis & inferna parte molli ac subcinerea lanugine insectis, flore purpureo magno. *Aristalthea* Plinii Casalp. in H. Sic. pag. 245. num. 697. *Malva sylvestris* caule altiori, folio *Alibæa* candelate, flore specioso roseo in Op. pag. 561. *Ketmia palustris* maior folio subtus incano, flore magno purpurascente, fructu acuminato Zannich. 154

6. *Ketmia vesicaria* vulgaris Inst. R. H. 101. * *Hypococ* Matth. 1117. *Hypococum* Casalp. 576. *Alcea vesicaria* Dod.

KETMIA vide **PENTAGONOCARPUS**



ACRYMA IOB Inst. R. H. 532. * *Lacryma*, & *Lacryma* Iob. Casalp. 181. *Litbospermum arnadinaceum* forte *Dioscoridis* & *Plinii* C. B.

1. **LACTUCA** montana latifolia laciniata, flore cæruleo Inst. R. H. 474. * *Sonchus caruleus* & *Soncho* *Cichorium* Cam.

2. *Lactuca sylvestris* murorum, flore luteo I. B. 2. 1004. Vaill. in AR. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 260. * *Lactuca sylvestris* Scariola & *Serralia*, vocata Casalp. 516. *Scariola*, *Endivia* *salvatica* Ric. Hæc & sequentes in Officialis promiscue appellantur *Lactuca sylvestris*, *Lactuca agrestis*, *Scariola*, *Scariola* & *Seris*

3. Eadem foliis multum laciniatis

4. *Lactuca sylvestris* media, non amara, caule laxi ramoso, ramis simplicibus surrectis, foliis latis brevibus & usque ad spinosam costam in plures lacinias eleganter dissectis, flore maiore, intrus dilute luteo, excus purpureo

LAMIUM alba linea notatum Inst. R. H. 183. * *Milnadella*, *Vrtice* montana, & *innoxia* Casalp. 449

2. Idem

2. Idem floribus candidis
3. Idem minus, flore purpureo
4. Lamium Paretariae facie Inft. R. H. 183
5. Lamium vulgare album, five Archangelica flore albo Inft. R. H. 183
6. Lamium Garganicum tubincanum, flore purpurafcente cum labio fuperiori crenato Michel. H. Pif.
7. Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo, five Galeopsis Dioscoridis Inft. R. H. 183. * *Vrta non mordax & fatida Cluf. Dolcimele vulgo*
8. Lamium montanum faxatile ferme glabrum, flore amplo purpureo cum labio fuperiori crenato Michel. H. Pif.
9. Lamium folio caulem ambiente, minus Inft. R. H. 184

LAPATHVM folio acuto plano, ramis furrectis. * *An Lapathum feu Rumex Cafalp. 164. Hec, & fequent in Officinis vocantur Lapathum acutum, Oxylapathum, Kumex, & Romice vulgo*

2. Idem ramis expandis. * *An Oxilapatho Matth. 473. Lapathum fylveftre Cafalp. 164*

3. Lapathum folio acuto rubente Inft. R. H. 504. * *Lapathum fanguineum Cam. Sanguis Draconis Herba Gefn.*

4. Lapathum folio acuto crispo Inft. R. H. 504

5. Lapathum pulchrum Bononienfe, folio finuato, viride

6. Idem rubrum

7. Lapathum folio rotundo, alpinum Inft. R. H. 504. * *Lapathi genus quoddam in montibus Cafalp. 164. Hippolapathum, Pseudo-Rba Lob. Rhabbarum monachorum C. B. Lapathum rotundum Ang.*

8. Lapathum maius, foliis subrotundis, ramis furrectis, flaminulis florum flavefcenribus, capfularum feminalium alis a bafi ufque ad medium crenatis & quandoque etiam barbatis *An Lapathum fylveftre, magnum, vulgare l. B. 2. 983. Hippolapathum fylveftre Tabern. Icon 436. Hippolapatho falvatico Matth. 477*

9. Lapathum aquaticum, minus Inft. R. H. * *Hydralapathum minus Lugd.*

LAPPA maior, Arctium Dioscoridis Inft. R. H. 450. * *Hec & fequent in Offic. vocantur Bardana, Lappa Bardana, Lappa maior, & Perfonata*

2. Lappa maior capitulis parvis glabris Raii Synopf. Ed. 3. 178. num. 3. *Lappa maior feu Bardana foliis maximis Cafalp. 336. Lappa Eiusdem H Sicc. pag. 102. num. 258. Lappa maior Italica, capitulis parvis Michel. H. Pif. * Perfonata maggiore Matth. 1213. Lappa Bardana Kic.*

LARIX folio deciduo, conifera Inft. R. H. 586. * *Larix Offic.*

LASERPITIUM foliis laevioribus lobatis Inft. R. H. 324

2. Laferpitium alpinum minus, Peucedani folio, femine nonnihil crispo

LATHYRVS latifolius Inft. R. H. 395. * *Ervilium vulgo Rubilium Cafalp. 233. Climeno Matth. 1012. Roviglia vulgo*

2. Lathyrus fylveftis luteus, foliis Vicie Inft. R. H. 395

LAVANDVLA latifolia Hispanica tomentofa Inft. 198

2. La-

2. *Lavandula latifolia* Inft. R. H. 198. * *Nardo Italiano* Matth. 34. *Pfeu-
donardus* Cast. Spigo vulgo

3. *Lavandula latifolia* altera

4. *Lavandula angustifolia* Inft. R. H. 198. * *Lavandula* Matth. 34. *Spica
Italica Lavanda* vulgo *Casalp.* 459. *Spica Nardi* Cam. Spigo *salvatico* vulgo

LAVROCERASVS fructu turbinato Michel. H. Pif. *Laurocerasus* Cluf.
Hist. 4. I. B. 1. 420. *Cerasus folio laurino* C. B. Pin. 450. *Laurocerasus*
Tbal. Tab. XXIII.

2. *Laurocerasus* fructu rotundo Michel. H. Pif. * *Lauro*, *Lauro regio* &
Lauro di Trebifonda vulgo, ut & *superior*

LAVRVS mas & fœmina, foliis latissimis planis & utrimque acumina-
tis. *Laurus latifolia* *Θάυρον* Dioscoridis C. B. Pin. 460. *Laurus latifolia*
mar. & *fœmina* Tabern. Icon. 951. *Laurus latifolia maior* Park. Theatr. 1488.

2. Eadem foliis planis, duas uncias cum dimidio longis, unciam latis, partim
utrinque acuminatis, partim retulis, fructu subrotundo. *Laurus* Trag. 1063

3. Eadem foliis utrinque acuminatis, quatuor uncias longis sexquinciam
latis, & ad oras undulatis, fructu oblongo. *An Laurus vulgaris folio un-
dulato* Inft. R. H. 597

4. *Laurus vulgaris* flore pleno Inft. R. H. 597. * *Ha Lauri species* usur-
pary promissum possunt pro *Lauro* Offic. & *Alloro* Ric.

LEONTODONTOIDES alpinus glaber, Erysimi folio, radice crassa fœ-
tida Michel. Nov. Plant. Gen. Parr. 1. 31. Tab. 28

LEONTOPETALON foliis costæ ramosæ innascentibus Coroll. Inft. R.
H. 49. * *Leontopetalum* Matth. 862. *Leontopetalum* *Casalp.* 270

LENTICVLA palustris maior, inferne magis convexa, fructu polysper-
mo Michel. Nov. Plant. Gen. 15

2. *Lenticula aquatica trifolca* C. B. Pin. 362. * *Lenticula quadam palu-
stris in Auxeri fluvio* *Casalp.* 612. *Hederula aquatica*, seu *palustris* Tabern.

3. *Lenticula palustris quadrifolia* C. B. Pin. 362. * *Sempreviva minor*,
Matth. 1174

LENTICVLARIA maior polyrhiza, inferne atropurpurea Michel. Nov.
Plant. Gen. 16

2. *Lenticularia minor monorhiza*, foliis subrotundis, utrinque viridibus
Michel. Nov. Plant. Gen. 16. * *Lenticula palustris* *Casalp.* 612

3. *Lenticularia omnium minima arhiza* Michel. Nov. Plant. Gen. 16

LENTISCVS vulgaris Inft. R. H. 580. * *Lentiscus* *Casalp.* 77. *Lentisco*
Matth. 122. Ric. 48. *Lentistio* & *Dentistio* vulgo

LEPIDIVM latifolium Inft. R. H. 216. * *Lepidium* vulgo *Herba Pipe-
ris* *Casalp.* 364. *Lepido di Paolo* & di *Plinio* Matth. 643. *An Lepidio* Ric.

2. *Lepidio di Dioscoride* Zann. 118

3. *Lepidium humile incanum arvense* Inft. R. H. 216. * *Draba* Matth.
602. & *Casalp.* 365. *Arabis* Cam.

4. *Le-*

4. *Lepidium humile* minus incanum Alepicum Infl. R. H. 216
5. *Lepidium maius* non repens, foliis imis Scabiosis, cæteris integris, floribus albis exiguis, fructu minimo lanceolato. *Lepidium graminco folio*, five *Iberis* Infl. R. H. 216. * *Iberide* Matth. 315. *Lepidio di Dioscoride* Eiusd. 642
6. Idem minus

LEVCANthemVM Americanum ramosum altissimum & serotinum, foliis acutis dentatis, flore maximo. *Bellis Americana* procerior ferotius ramosa, flore amplissimo Herman H. L. Bat.

2. *Leucanthemum alpinum* maius, folio rigido & altius dentato, flore maximo 34. circiter semisfoculis composito. * *Hoe*, & *sequentes*, *Bellis maior*, *Bellis ramosa*, & *Consolida media vulnerariorum* in Offic. vocantur

3. Idem folio leviter dentato, flore minore 24. circiter semisfoculis composito

4. Idem folio leviter dentato, flore maximo 24. circiter semisfoculis composito

5. Idem foliis imis laciniatis, cæteris altius & raro dentatis, flore maximo 24. circiter semisfoculis non ita latis composito

LEVCOIVM hortense incanum, folio non sinuato, flore purpureo maiore simplici & habitiori * *Leucoio porpureo* Matth. 924

2. Idem folio sinuato floribus purpurascenscentibus. * *Viola alba* & *matronalis*, floribus rubentibus *Casalp.* 368

3. Idem flore pleno, maculis albis notato

4. Idem foliis sinuatis, floribus albis. * *Leucoio bianco* Matth. 924. *Viola alba* & *matronalis*, floribus candidis *Casalp.* 368

5. *Leucoium luteum* vulgare Infl. R. H. 221. * *Leucoio giallo* Matth. 925. *Viola alba* & *matronalis* lutea ramosior *Casalp.* 368. *Viola gialla* Ric. Cbeiri. *Leucoium luteum*. *Viola lutea* Offic.

6. *Leucoium luteum* pleno flore Infl. R. H. 222

7. *Leucoium maritimum* sinuato folio Infl. R. H. 221

LICHENAGARICVS terrestris digitatus niger, apicibus alborufis, feminibus griseis undique conspersus, radice membranacea longissima varie divaricata & implexa Michel. Nov. Plant. Gen. 104. num. 4. Tab. 54. fig. 4

LIGVSTICVM alpinum, foliis Cicutæ tenuioribus & glabris, radice brevi Michel. H. Pif. Tab. 39. fig. 2

LIGVSTRVM Infl. R. H. 596. * *Ruviflicum* Marc. 58. *Ligustrum Casalp.* 95. *Ligustro* Matth. 187. *Luiflico* & *Ruiflico* vulgo

LILAC Infl. R. H. 601. * *Ligustrum Orientale* *Casalp.* 120. *Lilac e Gbanda Vnguentaria* Matth. 1237. *Syringa carulea* C. B.

2. *Lilac* flore albo Infl. R. H. 601. * *An Lilac flore albo non descriptum* Donn. Cat. H. Flor.

3. *Lilac* laciniato folio Infl. R. H. 602. * *Agem Lilac Persarum* Corn.

LILIOASPHODELVS phœniceus Infl. R. H. 344. * *Liliago maior Asphodelo affinis* *Casalp.* 410

H

LI-

LILIONARCISSVS luteus autumnalis maior Inft. R. H. 386. * *Narcissus autumnalis* *Cesalp.* 414

LILIVM album vulgare Inft. R. H. 369. *Giglio* *Matth* 870. *Lilium* *Cesalp.* 418. *Lilium album* *Offic.* *Giglio bianco* & *Giglio vulgo*

2. *Lilium* floribus reflexis, montanum, flore rubente Inft. R. H. 370.
* *Martagon* *Matth* 871. *Lilium sylvestre* vulgo *Martagon* colore purpureo, *seu* potius *carneo* *Cesalp.* 419

3. *Lilium* bulbiferum angustifolium Inft. R. H. 370
4. *Lilium* purpureo-roseum maius Inft. R. H. 369. * *Hemerocallis* *Matth* 921

LILIVM CONVALLIVM album Inft. R. H. 77. * *Lilium Convallium* *Matth* 923. & *Cesalp.* 224. *Mughetto* vulgo

LIMONIVM maritimum maximum Italicum, Cynoglossi aut Glasti folio pediculo longiori fusco, caule nudo, floribus caeruleis paniculatum nascentibus, calyce stellato. * *Limonium folio Runcicis, floribus purpureis* *Cesalp.* 166. *An Limonium maximum, folio latissimo* *D. Sberard. Rasi T. III.* 247. * *Beeu rosso* *Ric. Eben Rubrum* *Offic.*

2. *Limonium* minus perenne, Bellidis folio, floribus caeruleis, calyce stellato. *Limonium alterum exiguum* *Cesalp.* 166. *An Limonium maius* *L. B.* 3. 877.

3. *Limonium* minus, Bellidis folio, flagellis feniculaceis Inft. R. H. 342. *Limonium minus densa caulium feniculacea veluti coma* *Lal. Triumf. ap. Fr.* 65. *Pluk. Phytogr. Tab.* 42. *fig. 5. An Limonium minimum comatum elegant* *Rasi Hist. Tom.* 3. 246

4. *Limonium* maritimum minus perenne & patulum, Bellidis minoris folio, ramulis pinnatis hirsutis densissime ramificatis & magis intoreis, floribus caeruleis Michel. H. Pif. *Limonium parvum Bellidis folio, caulibus subhirsutis ramosioribus, flore caeruleo, petalis cordatis* *Zannich. Opust. Botan.* 27. *An Limonium reticulatum, supinum* *Eocc. Rar.* 82. Inft. R. H. 342

5. *Limonium* lignosum gallas ferens Inft. R. H. 342

LINARIA vulgaris lutes, flore maiore Inft. R. H. 170. * *Oxyris* *Matth.* 1262. *Linaria* *Cesalp.* 350. *Oxyris* & *Linaria* *Offic.*

2. Eadem flore albo, rictu aureo

3. *Linaria* erecta sempervirens glauca, foliis imis verticillatis, cæteris alternis, floribus purpureis parvis & inodoris. *An Os Leonis in montibus similior* *Linaria* *Cesalp.* 351

4. *Linaria alpina* tetraphylla, floribus violaceis parvis. * *Fruticular quidam in Collibus saxosis* *Cesalp.* 326

5. *Linaria* Hederaceo folio glabra, seu *Cymbalaria vulgaris* (annua) Inft. R. H. 169. * *Cimbalaria* *Matth.* 1182. & *Ric. An Cimbalaria* *Cesalp.* 266

6. *Linaria* Hederaceo folio glabro, seu *Cymbalaria maior* (perennis) flore candido, rictu pene pallido Michel. H. Pif.

LINGVA CERVINA Officinarum Inft. R. H. 544. * *Phyllitide* *Matth.* 864. *Lingua Cervina* & *Scolopendria* *Cesalp.* 594. *Phyllitis* *Gesfn.*

2. *Lingua Cervina* multifido folio Inft. R. H. 545

LINVM montanum perenne, Iuniperi folio, floribus umbellatis albis tantilla rubedine infectis.

LITHOSPERMVM maius, erectum Inft. R. H. 137. * *Lithospermum* Marc. 216. *Lithospermum* minore Matth. 960

2. *Lithospermum* minus repens latifolium Inft. R. H. 137. * *Ambarum* barum *Lithospermi* specierum semina in Officinis *Lithospermum*, *Milium Solis* & *Milium foler* vocantur

3. *Lithospermum* alpinum palustre latifolium, flore caeruleo maiore, umbilico luteo

4. *Lithospermum* palustre minus, flore caeruleo Inft. R. H. 137

5. *Lithospermum* arvense minus Inft. R. H. 137. * *Echium Scorpoides* C. B.

LONGCHITIS aculeata maior Inft. R. H. 538. * *Hac*, & sequens in Officinis *Filix mas* vocantur

2. *Longchitis* aculeata latioribus pinnulis Inft. R. H. 538

LOTVS villosus altissimus, flore glomerato Inft. R. H. 403. * *Lotus Lybica Dalecampii*

2. *Lotus* villosus maior & erectus, flore albo glomerato, filiquis brevibus obefis. *An Lotus pentaphyllor filiquosus villosus* Inft. R. H. 403

3. Idem minor & procumbens. *An Lotus hemorrhoidalis humilior & candidior* Inft. R. H. 403

4. *Lotus* palustris maior rotundifolia glabra. *Lotus palustris maior glabra* D. Vaillant. *An Lotus pratensis, maior glaber* Eiusd. in Bot. Par. 120

5. *Lotus* minor lutea glabra, caulibus longissimis procumbentibus, foliis angustioribus. *An Lotus pentaphyllor minor glabra, foliis longioribus & angustioribus* Inft. R. H. 402

6. Eadem caulibus nonnihil surrectis, foliis longioribus & angustioribus

7. *Lotus* pratensis proflus glabra & procumbens, foliis rotundioribus. *An Lotus sive Melilotus pentaphyllor minor glabra* Inft. R. H. 402. *Melilotum vulgo* Cefalp. 244

8. Eadem maior foliis ad margines tantum pilosis

9. Eadem maior villosa. *An Lotus corniculata hirsuta minor* L. B. 2. 356. Inft. R. H. 403

10. *Lotus* alpina hirsuta minor angustifolia procumbens, caulibus brevioribus, floribus minoribus luteis nonnunquam externe rubescens

11. *Lotus* angustifolia, flore luteo purpureo ex Infula S. Iacobi H. Amstel. Tom. 165

LVNARIA maior annua, filiqua rotundiore. *An Lunaria maior, filiqua rotundiore* Inft. R. H. 218. * *Hac* & sequens promiscue vocantur *Viola Lunaris*, *Lunaria Græca*, & *Bulbonach*

2. *Lunaria* maior (perennis) filiqua longiore Inft. R. H. 218

LVPVLVS mas Inft. R. H. 535. * *Lupulus* Cefalp. 157. *Lupulo* Matth. 1273. *Lupus salictarius*, & *Lupulus* Offic. *Luppulo* vulgo

LVTEOLA herba salicis folio Inft. R. H. 423. * *Siruthio falso* Matth. 619

2. *Luteola* sativa arque spontanea minor

H 2

LY-

- LYCHNIS hirsuta, flore coccineo, maior Inst. R. H. 334. * *An Oculus Christi* *Casalp.* 253. *Flor. Constantinopolitanae* Dod. *Scarlattea vulgo*
2. *Lychnis hirsuta*, flore incarnato, maior Inst. R. H. 334
3. *Lychnis coronaria* *Dioscoridis sativa*, flore rubro & veluti flammeo fulgente Inst. R. H. 334. * *An Lichnide* *Matth.* 868. *Lychnis Coronaria flore rubente* *Casalp.* 252. *Hæc, & tres sequentes promiscue vocantur Iobis Flor Theophrasti* *Gesf.*
4. *Lychnis coronaria* *Dioscoridis sativa*, flore dilute rubente Inst. R. H. 334
5. *Lychnis coronaria sativa multiplex* Inst. R. H. 334
6. *Lychnis coronaria* *Dioscoridis sativa alba* Inst. R. H. 334. *Lychnis coronaria flore albo* *Casalp.* 252
7. *Lychnis silvestris alba simplex* Inst. R. H. 334. * *Ocimoide* *Matth.* 1151. *Basilicum sylvestre* *Gesf.*
8. *Lychnis silvestris noctiflora alba simplex*, quæ sterilis Michel. H. Pis. *Lychnis sylvestris alba simplex, summe vidua* *Bot. Par.*
9. *Lychnis silvestris noctiflora alba simplex*, calyce amplissimo ventricoso & striato Michel. H. Pis. Tab 41. fig. 1
10. *Lychnis perennis viscosa noctiflora subhirsuta*, *Ocymastri facie*, flore parvo leucophæo extus luteoviridi, petalis bifidis cum appendicibus
11. *Lychnis monana viscosa noctiflora hirsuta latifolia alba*, floribus absque appendicibus Michel. H. Pis.
12. *Lychnis noctiflora angustifolia odorata* Inst. R. H. 335
13. *Lychnis silvestris*, sive *aquatica*, purpurea simplex Inst. R. H. 335
14. *Lychnis arvensis hirsuta parva & procumbens*, *Ocymastri facie*, flore rubro hilari, petalis bifidis cum appendicibus, calyce ventricoso
15. *Lychnis silvestris*, quæ *Saponaria vulgo* Inst. R. H. 336. * *Saponaria* *Casalp.* 256. *Viola Agrestis* *Trag. Struthium Plinii* *Fuchs.*
16. *Lychnis silvestris*, quæ *Saponaria vulgo*, flore albo Inst. R. H. 336
17. *Lychnis sive Saponaria flore pleno* Inst. R. H. 336
18. *Lychnis pratensis*, flore laciniato simplici Inst. R. H. 336. * *Odontides* *Casalp.* 259. *Odontitis Plinii* *Flor Cuculi* *Gesf.*
19. *Lychnis pratensis*, flore laciniato pleno minore Inst. R. H. 336. * *Margheritine vulgo*
20. *Lychnis silvestris*, quæ *Behen album vulgo*, elatior, foliis longis angustis & sensim in acutum apicem productis, flore minore, petalis cordatis bifidis absque appendicibus, sectionibus latis in exteriori margine erenatis. * *Hæc, & tres sequentes, Polemonium, Behen album, Papaver spinosum* *Offic. & Behn album Ric. promiscue vocantur*
21. *Eadem foliis longis peracutis*, flore maiusculo
22. *Eadem foliis latioribus*
23. *Eadem alpina humilis*, lato breviorique folio, floribus albis maioribus, petalis cordatis bifidis cum appendicibus, sectionibus latis
24. *Lychnis multiflora elatior*, *Linariæ folio*, parvo flore Inst. R. H. 338
25. *Lychnis viscosa altissima*, flore muscoso, *Ocymastri facie* *Triunf. Præul.* 58
26. *Lychnis maritima non viscosa glabra atrovirens*, *Bellidis folio*, floribus muscosis viridibus in spicis partialibus & heteromallis dispositis, petalis capitulae integris deorsum reflexis
27. *Lychnis silvestris hirsuta annua*, flore minore carneo Inst. R. H. 337
28. *Lychnis silvestris alba*, spica reflexa Inst. R. H. 338

LY.

LYCOPERSICON Galeni Inst. R. H. 150. * *Pomi d'oro Matth.* 1136. * *vulgo. Malum insanum depressius & latius Casalp.* 28. *Poma amoris. Dod. Mala aurea Cast.*
2. *Lycopersicon fructu Cerasi rubro Inst. R. H. 150. * Solanum arbore-scent Casalp.* 215

LYCOPVS palustris glaber (foliis altius, & acute dentatis) Inst. R. H. 191. * *Siderite l. Matth.* 1056. *Marrubium aquaticum Trag. Lancea Chri-lli Gesn.*
2. Idem foliis brevioribus parum & rotunde crenatis
3. *Lycopus foliis in profundas lacinias incisus Inst. R. H. 191. * Verbenaca alterum genus foliorum scissuris ad medium nervum accedentibus Casalp.* 451

LYSIMACHIA lutea maior, quæ Dioscoridis, foliis ternis (& quaternis) caule rotundo tenuiore, flore maiore Michel. H. Pif.
2. *Lysimachia lutea maior, quæ Dioscoridis, foliis ternis (flore minore) Inst. R. H. 141*
3. *Lysimachia rotundifolia lutea, foliis quaternis, flore proflus luteo & du- plo maiori*
4. *Lysimachia lutea minor, foliis (latioribus & brevioribus) nigris punctis notatis Inst. R. H. 141*
5. *Eadem fundo floris subrufo*
6. *Lysimachia Orientalis minor, foliis glaucis annuenticibus, flore purpureo H. Pif. Tab. 40. fig. 1*
7. *Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo Inst. R. H. 141.*
* *Numularia Casalp.* 261. *Centimorbia Gesn. Numularia Offic.*



ALVA vulgaris, flore maiore, folio sinuato Inst. R. H. 95
* *Malva sylvestris, & Malva Offic. Malva vulgo, ut & 3. se- quentes*

2. *Malva sylvestris maior erecta, folio sinuato, flore albo subpurpureo mediæ magnitudinis, folliculo seu calycis involucri ampliore Michel. H. Pif.*
3. *Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo Inst. R. H. 95*
4. *Malva annua erecta glabra, foliis carnosius ad latera magis dilatatis, floribus perexiguus ex albo purpureascentibus & in foliorum alis glomeratim ag- gestis sine pediculis*
5. *Malva ulmifolia semine rostrato Inst. R. H. 96*
6. *Malva Hispanica foliis mollibus undulatis in margine, superius micis sul- phureis ad Solem lucentibus donatis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 523. n. 14*
7. *Malva rosea humilis ramosa, caule punctis purpureis inscripto, foliis in- ferioribus angulosis, superioribus vero ficulneis, flore dilute rubro, fundo luteo, amplo. * Malvone. Malva Rosa vulgo ut & sequentes*
8. *Eadem humilior, nonnihil ramosa, caule viridi, Caprifici folio, flore pleno rubro saturo*

9. Ea-

9. Eadem humilior ramosa, caule viridi, foliis parvis subrotundis & parum angulosis, flore rubro
10. Eadem humilior, caule ex rubro punctato, foliis rotundis angulosis, flore dilute rubente, fundo saturatiore
11. Eadem humilior vix ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore carneo, fundo nonnihil saturatiore
12. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore rubro saturo
13. Eadem elatior ramosa, caule viridi, foliis ficulneis non ita profunde iocifis, flore dilute rubente, fundo saturatiore
14. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, Caprifici folio, flore pleno intense rubro
15. Eadem elatior vix ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore rubro
16. Eadem elatior parum ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore rubente, fundo ampliore & saturatiore
17. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, foliis ficulneis, lobis rotundioribus, flore roseo, fundo saturatiore
18. Eadem elatior ramosa, caule viridi, foliis rotundis nonnihil angulosis, flore dilute rubente, fundo saturatiore
19. Eadem vix ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore roseo, fundo nonnihil saturatiore
20. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, foliis Althææ rugosis & magis angulosis, flore minore carneo, fundo saturatiore
21. Eadem altissima ramosa, caule viridi, foliis cucumerinis seu magis angulosis, flore carneo, fundo saturatiore
22. Eadem humilis non ramosa, caule viridi, foliis inferioribus angulosis, superioribus vero ficulneis, flore luteo amplo
23. Malva arborea sempervirens, Alchimillæ folio mollissimo, flore purpureo, striis & fundo intense concoloribus, calyce exteriori amplo, interiori parvo. * *An Malva quædam arborefcens Cefalp.* 561

MALVINDA Americana procumbens, Althææ folio, flore phœniceo parvo

MANDRAGORA maior verna ferida, foliis Lactucæ aut Brassicæ crispis & glabris, floribus parvis ex albo subæruleis, fructu rotundo amplo luteo & graviter odorato. *Mandragora fructu rotundo Insl. R. H.* 76. *Mandragoras Cefalp.* 215. * *Mandragora mas vel alba Cam.*

2. *Mandragora maior autumnalis*, foliis longis subsæperis crispis & ad oras undulatis, floribus violaceis vel ex cæruleo purpurascens, fructu *An Mandragora tertia ex Sicilia circa Æquinoctium Autumni germinans & florens, Lactucæ foliis, fructu turbinato ut parvi Sorbi Cefalp.* 216. * *Hæc & sequentes usurpari possunt pro Mandragora nigra, & fœmina Offic. & Mandragola vulgo*

3. *Mandragora minor Autumnalis*, foliis betaceis subsæperis, flore maiore ex cæruleo purpurascens, fructu exiguo ovato & odorato

4. *Mandragora minor brumalis*, foliis betaceis crispis superna parte atrovirentibus & asperis, floribus uncialibus ex albo subæruleis, fructu ovato exiguo odorato flavescens. *Mandragora florem purpureum circa brumam, promens, folio breviori tamen & latiore Cefalp.* 216. *Mandragora minor, æstiva, flore parvo ex albo subæruleo, fructu ovato exiguo H. Pif. Tab.* 43

MAR.

MARRUBIUM album vulgare Inft. R. H. 192. * *Marrubio* Matth. 876. *Marrubium* Cefalp. 447. *Fraxio Ric. Marrubium album C. B. Praxium Ang.*

2. *Marrubium album latifolium peregrinum* Inft. R. H. 192. *Marrubium candidum* Dod. & *Creticum* Offic. ut & *fequens*

3. *Marrubium album angustifolium peregrinum* Inft. R. H. 192

4. *Marrubium Hispanicum fupinum*, calyce ftellato & aculeato Inft. R. H. 192. * *Alyffon Galeni Cluf.*

5. *Marrubium annuum*, foliis fubrotundis, calyculis aculeatis, flore vario

MATRICARIA vulgaris feu fativa Inft. R. H. 493. *Matricaria dicta a quibusdam Amareggiola* five *Herba amara* Cefalp. 492. *Matricale vulgo*

2. *Matricaria flore pleno* Inft. R. H. 493

3. *Matricaria hortenfis minor glabra*, flore lacteo pleniffimo

MEDICA maior erectior, floribus violaceis Inft. R. H. 410. * *Fannum Burgundiacum* Lob.

MEDICAGO trifolia frutefcens incana Inft. R. H. 412. * *Cytifus* Cefalp. 113. *Citifo* Matth. 1223. *Lignum Rhodium*, *Cytifus verus* Belli

2. *Medicago perennis*, foliis ternis anguftis in apice incifis, floribus luteis fpicatis, filiqua falcata intorta (12vi) Michel. H. Pif.

3. *Eadem* floribus e luteo pallefcentibus

4. *Eadem* floribus e carmeo virefcentibus

5. *Eadem* floribus partim luteis partim violaceis

6. *Eadem* floribus violaceis

MELANOSCHOENVS paluftris anguftifolius, Lithofpermi femine Michel. Nov. Plant. Gen. 46. num. 1

MELIANTHVS Africanus Inft. R. H. 431

2. *Melanthus Africanus minor fætidus* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. P. 1. 300

MELILOTVS Officinarum Germaniæ Inft. R. H. 407. * *Loto domeftico*, *Tribolo*, *Trifoglio Cavallino* Matth. 1221. *Lotus fylveftreis vulgo* *Trifuli*, & *Trifuli flosculis luteis* Cefalp. 241. *Trifolium odoratum* Dod. *Tribolo vulgo* ut & *tres fequentes*

2. *Melilotus perennis erecta glabra*, foliis oblongis ferratis, floribus fpicatis albis odoratis lineam longis, filiquis rotundis rugofis exiguis, femine fingulari virefcente. *Melilotus Officinarum Germaniæ flore albo* C. B. Pin. 331

3. *Eadem* floribus fefquilineam longis, filiquis maioribus rugofis obtufis monofpermis

4. *Melilotus* filiquis longioribus acutis Inft. R. H. 407

5. *Melilotus Italica folliculis rotundis* Inft. R. H. 407

6. *Melilotus lutea minor*, floribus & filiculis minoribus fpicatim & denfe difpofitis Inft. R. H. 407

7. *Melilotus* capfulis reni fimilibus in capiculum congeffis Inft. R. H. 407

MELISSA hortenfis Inft. R. H. 193. * *Meliffa* Matth. 874. *Meliffa vulgo Citronella* Cefalp. 446. *Meliffa Ric. Cedronella* & *Cedronella vulgo*

2. *Me-*

2. *Melissa hirsuta* praeterea, caule crispo, foliis amplioribus omnibus acuminatis, minus odorata, flore albo. *Melissa sylvestris hirsutior*, minus odorata *Kaii Hist.* 571

3. Eadem humilior, caule aspero, foliis minoribus & rugosioribus, imis acuminatis, ceteris rotundioribus

4. *Melissa Pyrenaica* caule brevi, *Plantaginis folio* (flore violaceo) *Inst.* R. H. 193

5. *Melissa humilis latifolia*, maximo flore purpurascente *Inst.* R. H. 193.
* *Melissa adulterina* L. B. *Herba Sacra Lugd.*

MELONGENA fructu oblongo violaceo *Inst.* R. H. 151. * *Melannana* *Mattb.* 1134. *Pyrum insanum colore purpureo* *Cesalp.* 210. *Malum insanum*. *Dod.* *Petenciano vulgo*

2. *Melongena* fructu oblongo, albo *Inst.* R. H. 151. *Pyrum insanum candidum candore Eboris* *Cesalp.* 210. *Vovo Turco vulgo*

3. *Melongena* fructu incurvo *Inst.* R. H. 152

MENTHA rotundifolia palustris, seu aquatica, maior *Inst.* R. H. 189.

* *Sisymbro saluatico* *Mattb.* 515. *Mentha aquatica sive slymbrica* *Lob.* *Sisymbrium Fuchf.* *Mentha rubra* *Brunf.* *Calamintha aquatica* *Gesf.*

2. *Mentha aquatica hirsuta*, parim verticillata parim spicata, foliis latis ad *Melissam* accedentibus, spica longa, verticillis crassioribus, floribus purpureis, staminibus longis

3. *Mentha aquatica nigra & glabra*, Ocimi odore, foliis oblongis, spica verticillata tenuiore, floribus parvis dilute purpureis, staminibus brevibus

4. *Mentha sylvestris angustifolia glabra atrovirens*, spica dilute purpurea verticillata, florum staminibus brevissimis

5. *Mentha sylvestris glabra*, foliis brevioribus assidue crenatis, verticillis florum binis vel ternis ex caeruleo purpurascens

6. *Mentha montana*, foliis amplioribus longioribus & rugosis, spica verticillata, staminibus brevibus

7. *Mentha sylvestris longiore folio* *Inst.* R. H. 189. * *Menthastrum* *Trag.* *Mentha Equina* *Brunf.* *Sisymbrium campestre* *Ang.* *Mentastro* *Ric.*

8. *Mentha aquatica* seu *Pulegium vulgare* *Inst.* R. H. 189. * *Puleggio* *Mattb.* 742

9. *Mentha aquatica* seu *Pulegium vulgare*, flore albo *Inst.* R. H. 190

10. *Mentha aquatica* seu *Pulegium maius*, foliis rotundioribus ad *Nummulariam* accedentibus. *An Pulegium foliis Nummularia* C. B. *Pin.* 222. *Prodr.* 109

MENYANTHES palustre latifolium & triphyllum *Inst.* R. H. 117. * *Trifolium palustre* *Cord.*

MESPILVS Germanica, folio Lauri non serrato, sive *Mespilus sylvestris* *Inst.* R. H. 641

2. *Mespilus aculeata* *Amygdali folio* *Inst.* R. H. 642. *Pruno gazzerino vulgo*

3. *Mespilus Apii folio sylvestris spinosa*, sive *Oxyacantha* *Inst.* R. H. 612. * *An Oxyacantha* *Marc.* 57. *Spina alba*, *Spina acuta* *Ang.* *Spina Appendix* *Plinii* *Gesf.* *Marruca bianca vulgo*

4. *Mespilus folio rotundiore*, fructu nigro subdulci *Inst.* R. H. 642

MIL-

MILLEFOLIUM vulgare album Inft. R. H. 496. * *Millefolium maius* *Caſalp.* 482. *Achillea* *Lon.* *Stratiotes millefolia* *Fuchf.*

2. Millefolium purpureum maius Inft. R. H. 496. * *Millefoglio maggiore* *Mattb.* 1200.

3. Millefolium five Ageratum umbella candida, folio Millefolii minoris, rigidiore tamen Lælii Triumf apud *Fratr.* 65

4. Millefolium quod Tanacetum album, maritimum tenuifolium, flore candido *Bocc. Muſ. Part. 2. 33. Tab. 25*

5. Millefolium minus tenuifolium, Tanaceti odore *Barr. Obf.* 101

6. Millefolium nobile Inft. R. H. 496. * *Achillea* *Mattb.* 1061. *Scopa* *Rea* *Plinii Dalech. Stratiotes Geſn.*

MIMOSA ſpuria di Pernambuco, detta Mimosa Italica *Zannon.* 151

MOMORDICA Zeylanica, pampinea fronde, fruſtu longiori Inft. R. H. 103

2. Momordica vulgaris Inft. R. H. 103. * *Balaſtina* *Caſalp.* 194. & *Mattb.* 1349. *Cbarantia* *Dod.* *Balfimino vulgo*

MORVS fruſtu albo (foliis integris parvis) C. B. *Pin.* 459

2. Morus (foliis integris parvis) fruſtu albo minori ex albo purpuraſcente Inft. R. H. 589

3. Morus fruſtu nigro minori, foliis eleganter laciniatis Inft. R. H. 589

MOſCATELLINA folio Fumariz bulbosæ Inft. R. H. 156

MYSCARI arvenſe latifolium purpuraſcens Inft. R. H. 347. * *Bulbus ſylveſtris, qui Cæpa Canina, ſeu Anguina, primus* *Caſalp.* 402. *Hyacinthus comofus, & Hyacinthus Dioſcoridi* C. B. *Bulbus Ang.*

2. Muſcari flore candicante, ſtaminulis cæruleis

3. Idem ſtaminulis carneis

4. Muſcari arvenſe luncifolium cæruleum minus Inft. R. H. 348. *Bulbus ſylveſtris* *Caſalp.* 401. *Hyacinthus racemoſus* *Dod.*

5. Muſcari moſchatum, grifeo obſoleto flore Inft. R. H. 348

MYSCOIDES ſquamofum maius atrovirens, foliis ſubrotundis *Michel.* *Nov. Plant. Gen.* 9. *Tab. 6. fig. 3*

2. Muſcoides ſquamofum medium rotundifolium atrovirens *Michel.* *Nov. Plant. Gen.* 9. *Tab. 6. fig. 4.*

3. Muſcoides minimum, foliis alternis, ſuperioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente *Mich.* *Nov. Plant. Gen.* 9. *Tab. 6. fig. 6*

MYAGRVM monofpermon latifolium Inft. R. H. 211

MYOSOTIS incana repens Inft. R. H. 245. * *Ocymoides Lychnitis* L. B.

2. Myofotis montana perennis repens maior ſubhirſuta & ſubincana, Linnariæ folio, flore maximo, petalis anguſtis octo lineis longis, bifidis, apertura non dilatata

3. Eadem ramulorum ſummitate viſcoſa, flore magno, petalis laxis & ſeptem lineas longis

4. Eadem flore magno, petalis latis & cordatis
5. Myosotis alpina hirsuta latifolia perennis, parvo flore, calyce longiore
6. Myosotis alpina hyssopifolia, flore maiore
7. Myosotis alpina pumila repens, foliis brevibus ad margines simul cum caule pilosis, flore minusculo
8. Myosotis alpina minor glabra repens angustifolia, flore parvo, petalis angustis
9. Myosotis alpina minor repens, Polygoni foliis superna parte simul cum caule pilosis, flore parvo, petalis bifidis
10. Myosotis Orientalis perfoliata, Lychnidis folio Coroll. Inft. R. H. 18

MYRRHIS perennis alba minor, foliis hirsutis, semine aureo Inft. R. H. 315

1. Eadem caule maculato
2. Myrrhis annua, semine striato laevi Inft. R. H. 315. * *Anthriscus Plinii* I. B. *Cberophyllum sylvestre* C. B. *Onoselinum* Tab.
4. Myrrhis trifolia Canadensis, Angelicæ facie Inft. R. H. 315. * *Angelica Canadensis trifolia Quorumdam*

MYRTVS latifolia Bætica I, vel foliis Laurinis Inft. R. H. 640. * *Mortella di Spagna vulgo*

2. Myrtus communis Italica (baccis oigris oblongis) Inft. R. H. 640. * *Myrtus fructu maturo nigro Cæsalp.* 127. *Mortella vulgo, ut & dua sequentes*
3. Eadem baccis rotundis nigris
4. Eadem baccis oblongis ex rubro candicantibus * *Myrtus fructu ex rubro candicante Cæsalp.* 127
5. Myrtus minor vulgaris Inft. R. H. 640. *Myrti quoddam genus ex Hispania Cæsalp.* 127. *Mirto Tarentina Matib.* 249



ARCISSE LEVCOIVM pratense multiflorum Inft. R. H. 387. * *Narcissus aquaticus Cæsalp.* 413. *Leucoium bulbosum* C. B. *Leuconarcissiflorum* & *Opiion Theophrasti* Cam. in Matib. *Leucoium Theophrasti*, & *Viola alba Plinii* C. B.

NARCISSVS albus, circulo croceo vel luteo Inft. R. H. 353. *Narcissus primus Cæsalp.* 412. *Tazzetta vulgo*

1. Narcissus sylvestris minor, flore albo, calyce aureo, odore gravi Michel. H. Pif. * *Giracapo vulgo*
3. Narcissus sylvestris multiplex, calyce carens Inft. R. H. 357. * *Narcissi genus, cuius calyces multiplices complexu constant Rosarum instar Cæsalp.* 413
4. Narcissus latifolius albus medio aureus Inft. R. H. 357. * *Narciso vulgo*
5. Narcissus maior totus luteus, calyce prælongo Inft. R. H. 306
6. Narcissus sylvestris pallidus, tñba aurea, maior Barr. Obf. 67. n. 719. Icon. 930

7. Nar-

7. *Narcissus iuncifolius*, oblongo calyce, luteus maior Inst. R. H. 335. *
Giunchiglia *vulgo*
8. *Narcissus iuncifolius aureus multiplex*, Anemones forma Inst. R. H.
357. * *Narcissus doppia vulgo*
9. *Narcissus Illyricus liliaceus* Inst. R. H. 357

NERION floribus rubescentibus Inst. R. H. 605. * *Nerio Matth.* 1160.
Rhododaphne vulgo Oleandrum Cesp. 113. *Rhododendron Bellon.* *Laurus Ro-*
sea Lab. *Oleandrum Offic.* Mazza di S. Giuseppe, Oleandro, Ammazza l'asi-
no, & Alloro d'India *vulgo*

2. *Nerion floribus albis* Inst. R. H. 605
3. *Nerion Indicum latifolium*, floribus odoratis plenis Inst. R. H. 605
4. *Nerion latifolium Indicum*, flore variegato odorato pleno Inst. R. H. 605

NICOTIANA maior latifolia Inst. R. H. 117. * *Tornabona Cesp.* 344
2. *Nicotiana maior angustifolia* Inst. R. H. 117. * *Haec duo Nicotiana spe-*
cies. *Nicotiana.* *Petum.* *Tabacum.* *Herba Regina.* *Hofcyamus Peruvianus,*
& Herba S. Crucis promiscue vocantur & Tabacco vulgo
3. *Nicotiana minor* Inst. R. H. 117. * *Hiosciamus nero Matth.* 1121. *Tor-*
nacone congener Cesp. 345. *Hioscyamus luteus Dod.* *Priapeia Gesn.*

NIGELLA angustifolia, flore maiore simpliciter caeruleo (petalis florum la-
tis, & fructu habitiori) Inst. R. H. 258

2. Eadem flore minore, petalis angustis, & fructu non ita ventricoso. *
Haec duo Nigella species usurpari possunt pro Nigella Offic. & Pianta, che si
usa per la Nigella Ric.

3. *Nigella flore maiore pleno caeruleo* Inst. R. H. 258
4. *Nigella Orientalis*, flore flavescente, semine alato plano Coroll. Inst.
R. H. 19

NYMphaea alba maior Inst. R. H. 260. * *Nymphaea bianca Matth.* 944.
Nymphaea vulgo Nensfarum flore candido Cesp. 569. *Nensfaro Ric.* *Nym-*
phaea alba, & Nensphar album Offic.

NYMPHOIDES aquis innatans Inst. R. H. 153



BELISCOTHECA Hydrophylli folio, lobis amplioribus Vaill.
Nov. Plant. Gen. in Act. Ac. R. Sc. An. 1720. pag. 426. n. 1
2. *Obeliscothea Hydrophylli folio, lobis angustioribus Vaill.*
Nov. Plant. Gen. in Act. Ac. R. Sc. An. 1720. pag. 446. v. 2

OCIMUM caryophyllatum Monachorum, five Acinos Columnae Inst. R.
H. 203. * *Basilico Gariofillato Ric.*

2. *Ocimum vulgare* Inst. R. H. 204. * *Basilico mezzano Matth.* 563.
Ocimum italicum Cesp. 469. *Basilico Ric.* *Ocimum & Basilicon Offic.*

3. *Ocimum minus*, valde odoratum, Origani folio plano, & non serrato, floribus albis, spicis brevibus & confertis.
 4. *Ocimum Citri* odore Inst. R. H. 204. * *Ocimum Citratum* Cesp. 469. *Basilico Cedrato* Ric. & vulgo
 5. *Ocimum minimum* Inst. R. H. 204. * *Basilico minore* Matth. 564. *Basilicum nanum* Cesp. 469. *Basilico Pino* vulgo

OENANTHE maxima, bulbulis radicum crassissimis napaceis, foliis Apii Macedonici amplissimis & nigricantibus, caule altius striato, umbellis primariis nudis, secundariis foliosis aut barbatis, floribus & staminibus albis, apicibus purpureis

2. *Oenanthe Asphodeli* radice, Apii folio, umbellis amplis parulis, primariis nudis, secundariis vero foliosis & proliferis, floribus maioribus simul cum staminibus albis, apicibus subluteis. *Oenanthe stellata*, *Cretica Alp.* Exot. Rari Hist. Tom. 1. 442. *Oenanthe Cretica stellata* Park. Theatr. 894

3. *Oenanthe aquatica tenuifolia* maior, bulbulis radicum longissimis (immediate adherentibus, floribus albis, umbellis foliosis) Michel. H. Pis.

4. *Eadem minor*, bulbulis radicum longis & crassioribus, umbellis nudis, radiis brevioribus. *Oenanthe angustifolia aquatica recta vulgaris* Mor. Hist. Part. 3. 289. Sect. 9. Tab. 7. fig. 7. *Oenanthe angustifolia* Lob. Icon. 729. *An Filipendula* Cesp. 188

5. *Oenanthe aquatica trifolia*, caulibus fistulosis Mor. Hist. Oxon. Part. III. 289. Sect. 9. Tab. 7. fig. 8. Rari Synopf. Ed. 3. 210. v. 2. *Oenanthe aquatica, minor* *Imocoides trianthopboros* Pluk. Alm. 268. *Oenanthe aquatica minor* Park. Theatr. 1233. *Oenanthe sive Filipendula aquatica altera* L. E. 3. Part. 2. 192. Inst. R. H. 313

6. *Oenanthe Filipendulae* radice, foliis inferioribus Apii Macedonici, ceteris Peucedani, umbellis albis primariis & secundariis foliosis

7. *Eadem* foliis inferioribus Apii tenuioribus & altius incis. *Oenanthe, Apii folio, caule firmiore* Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 288. Sect. 9. Tab. 7. fig. 3. *Oenanthe* 11. Matth. 915. *Filipendula tenuifolia* Tabern. Icon. 141

8. *Eadem* maritima, foliis inferioribus minus incis, corymbis umbellæ sparsis. *An Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens* L. E. 3. Part. 2. 191. * *Hæ Oenanthe species in Offic. promiscue etiam vocantur Filipendula aquatica, vel palustris*

9. *Oenanthe Lusitanica* (humilis tenuifolia, umbellis primariis nudis, secundariis foliosis, floribus & staminibus albis, apicibus purpureis) semine crassiore globoso Inst. R. H.

OLEA sylvestris, foliis angustis, fructu longiusculo tenuiori & intorto

ONAGRA latifolia Inst. R. H. 302. * *Lythmachia lutea corniculata* C. B.

2. *Onagra latifolia flore dilutiore* Inst. R. H. 302

3. *Onagra angustifolia* Inst. R. H. 302

ONOBRYCHIS Italica perennis erecta, foliis Viciæ, floribus dilute rubentibus, fructu exiguo non echinato sed rugoso & cristato Michel. H. Pis.

ONOPORDON vulgare flore purpureo Vaill. in Act. Ac. R. Sc. An. 1718. pag. 193. num. 1. * *Acanthis* Matth. 708. *Hæ & sequent promiscue vocantur Acanthis, & Spina alba* 2. Idem

1. Idem foliis inferioribus ahuis incisus

OPVLVS Ruellii Inst. R. H. 607. * *Sambuco aquatico* Matth. 1332. *Sambucus in palustribus Pisanis nascitur* Casalp. 92. *Sambucus palustris*, seu *aquatica* Offic.

2. *Opulus flore globoso* Inst. R. H. 607. * *Maggio & Pallone vulgo*

OPVNTIA maior erecta, folio lato oblongo spiois longis manico, flore femipleno, inflar serici nitente, & ad xneum colorem tendente. * *Hac, & sequentes Opuntia species vulgo vocantur Fico d'India*

2. Eadem folio longiore maioribus & crebrioribus spinis munito

3. *Opuntia supina latifolia*, floribus luteis aut citrinis. *An Ficus Indica*, *humilis* C. B. Pin. 458

ORCHIS, an magoa, latis foliis, galea fusca vel nigricante I. B. 2. 759

2. *Orchis barbata*, odore hirci, brevior latioreque folio Inst. R. H. 433

3. *Orchis fucum* referens maior, foliolis superioribus candidis C. B. Pin.

83. *Tessiculus figura & colore apem flori insidentem referens* Casalp. 429

4. *Orchis fucum* referens maior, foliolis superioribus purpurascensibus C. B. Pio. 83

5. *Orchis montana Italica*, flore ferrugineo, lingua oblonga Inst. R. H. 434. * *Spens di Tessicolo* Ill. fig. 1. Matth. 930. *He Orchidiz species promiscue usurpantur pro Satyria, ac Tessiculo* Offic. & *Satirii* Ric.

6. *Orchis palmata pratensis maculata*, flore variegato Inst. R. H. 434. * *Palma Christi* Casalp. 430. & *Offic.*

OREOSELINVM Apii folio maius Inst. R. H. 318. * *Danco* II. Matth.

824. *Cervaria nigra & Libanotis nigra* Thal.

2. *Oreoselinum Apii* folio minus alterom Michel. H. Pic.

3. *Oreoselinum Apii* folio minus, ad singulos nodos ramosum, & in summitate caulis plures umbellas in praelongis & foliolis pediculis proferens Michel. H. Pic.

ORIGANVM silvestre, Canila bubula Plinii Inst. R. H. 188. * *An Origano vulgare* Matth. 739. *Origanum Italicum vulgo Regamum* Casalp. 464. *Hac, & sequent Origani species, Origanum vulgare, silvestre, & Onitis promiscue in Offic. audiunt, Regamo & Erba da Acciughe vulgo*

2. Idem foliis brevioribus subrouandis & acrioris saporis

3. *Origanum onites* Inst. R. H. 199. * *Scarapepe, & Menci-pepe* Casalp. 464. *Marum quibardum* Dod. *Hyssopus genuina* Græcorum Lob.

4. *Origanum foliis & facie Maioranz*, floribus albis, * *Maiorana Gentile* Matth. 766. *Persa* Ric. *Persia nera vulgo*

ORIGANVM vide DICTAMNVS

ORNITHOGALVM umbellatum medium angustifolium Inst. R. H. 378.

An Ornithogalo II. Matth. 572. *Ornithogalum vulgo Lac Gallina* Casalp. 405

2. *Ornithogalum maius spicatum*, flore albo Inst. R. H. 379. * *Bulbus Ornithogalo similis* Casalp. 405

3. *Ornithogalum spicatum*, flore viridi laescente Inst. R. H. 379

4. Or-

4. Ornithogalum spicatum, luteo pallescente flore Pon. Bald. Lat. in 4.
97. * *Bulbus Ornithogalo similis, floribus luteis* *Casalp.* 405
5. Ornithogalum luteum *Infl.* R. H. 379
6. Ornithogalum exoicum, magno flore minori innato *Infl.* R. H. 379
7. Ornithogalum bifolium Germanicum caeruleum *Infl.* R. H. 380. * *Hya-*
cintbus stellaris C. B. *Bulbus vomitorius* *Lon.*
8. Ornithogalum autumnale minus, flore dilute purpureo *Infl.* R. H. 381
9. Ornithogalum caeruleum Lusitanicum latifolium *Infl.* R. H. 381. * *Hya-*
cintbus Peruvianus J. E.
10. Ornithogalum Lusitanicum flore albo *Infl.* R. H. 381
11. Ornithogalum mafitimum, seu Scilla radice rubra *Infl.* R. H. 381. *
An Marina Cepulla, an Pancration *Marc.* 148. 149. *Scilla* *Matth.* 638. *Scyl-*
la cuius bulbi color ruffus *Casalp.* 403. *Squilla* *Ric.* *Scilla* *Offic.*
12. Ornithogalum eriophorum Peruvianum *Infl.* R. H. 381. * *Eriophorum*
& Bulbus eriophorum C. B.
13. Ornithogalum eriophorum Orientale *Infl.* R. H. 381

ORNVS Italica excellior latifolia, fructu longiore. * *Ornus* *Offic.* *Orni*
fructus ut ex Fraxini in Officinis promiscue vocantur *Linga* *Avis*

2. Ornus vulgaris excellior, racemis florum confertis, fructu longiore acu-
to *Mich.* *Nov. Plant. Gen.* 223
3. Ornus Italica, praecox, non ita excellior, folio minori, racemis florum
confertis, fructu ampliori acuto *Michel.* *Nov. Plant. Gen.* 223. *Tab.* 103. *fig.* 1

OROBVS alpinus, Galegae foliis minus acutis, floribus purpurascens
Michel. H. *Pif.*

2. Orobus latifolius parvo flore purpureo *Infl.* R. H. 393. * *Onobrychis al-*
tera *Casalp.* 249. *Galega Nemorensis* J. E.
3. Orobus sylvestris, Vicie foliis *Infl.* R. H. 393
4. Orobus sylvaticus, foliis oblongis glabris (radice tuberculosa) *Infl.* R.
H. 393. *Boe. Par.* 155. * *Astragalus sylvaticus* C. B.
5. Orobus angustifolius, italicus, flore vario *Infl.* R. H. 393

OSMVNDA vulgaris & palustris *Infl.* R. H. 547. * *Osmunda regalis*,
Filix florida *Park.* *Filix palustris* *Dod.* & *Offic.*

OXYS lutea *Infl.* R. H. 88. * *Oxytriphylon* *Trag.* *Luina* & *Alleuia* *quo-*
rumdam. *Hec, & sequens Oxidis species promiscue usurpantur pro Acetofella,*
& Trifolio Acetoso *Ric.* & *Offic.*

2. Oxys erecta caulifera Nostras *Michel.* H. *Pif.* * *An Oxys vulgo autem*
Alleuia *Casalp.* 564



AEONIA folio nigricante splendido, quæ mas Inft. R. H. 273.

* *Peonia mafchio* Mattb. 964. & *Ric. Peonia mar* Offic.

2. *Peonia communis* vel *fœmina* Inft. R. H. 274. * *Peonia fœmina* Offic.

3. *Peonia fœmina*, flore pleo rubro maiore Inft. R. H. 274

4. *Peonia foliis latis* subtus pubefcentibus, flore fimplici rubro calapetalo, petalis anguftis

5. *Eadem foliis prælongis*. * *Peonia Cafalp.* 588

6. *Peonia foliis latis* subtus incanis & lanuginofis

PALIVRVS Inft. R. H. 616. * *Rhamno terzo* Mattb. 174. *Iuiba fylveftris*, *fina Marruca* *Cafalp.* 109

PALMA maior C. B. Pin. 506. * *Palma Cafalp.* Palma da Palmizii *vulgo*

2. Palma minor C. B. Pin. 506. * *Palma quoddam genus humile* *Cafalp.* 80. *Chamaripbes*. *Cefagliooi*, Palma di S. Pier Martire *vulgo*

PANICVM *vulgare*, *spica fimplici & afpera* Inft. R. H. 515. * *Hoc*, & *fequens vulgo* *Panicaftrilla* *vocantur*

2. *Panicum vulgare*, *spica fimplici molliori* Inft. R. H. 515

PARIETARIA *Officinarum* & *Diofcoridis* Inft. R. H. 509. * *Helxine* Mattb. 1170. *Helxine vulgo* *autem Parietaria* *Cafalp.* 169. *Vetriola vulgo*

2. *Parietaria Alpina* *procerior*, *caule duriore*

PARNASSIA *paluftris* & *vulgaris* Inft. R. H. 246. * *Gramen Parnaffi* *Gefu. Hepatica alba* *Cord.*

PARTHENIVM *maius*, *Tanacetii folio*, *flore ampliori* Michel. Nov. Plant. Gen. 34. num. 1

2. *Partheoium*, quod *Matricaria Tanacetii folio*, *flore maiore*, *femine umbilicato* Michel. Nov. Plant. Geo. 34. num. 2

3. *Parthenium foliis tenuiffimis*, *Achilleæ cæfuris* Michel. Nov. Plant. Gen. 34. num. 6. Tab. 29

4. *Parthenium Buphtalmi folio*, *floribus folitariis*, *femiflofculis albis* & *iuxta difcum luteis*

PASTINACA *fylveftris latifolia* Inft. R. H. 319. * *Elaphobofco* Mattb. 820

2. *Paftinaca fylveftris altiffima* Inft. R. H. 319. * *Pseudocofte* Mattb. 60. *Herba cafta* *Cafalp.* 310. *Panax Caftinum* C. B. *Panax Chironium* *Thropraffi* *Can. Coflur fpurus* *Lob.*

PENTAGONOCARPOS *paluftris*, *Altheæ folio anguftiore* *virefcen-*
te & fubafpero, *flore purpurafcente parvo & patulo*, *loogo pediculo in-*
fi- deote, *fructu compreffo pentagono*. *An Altheæ hortenfis, fœve peregrinat*
Dodonæi, *nomine infignita* *D. Sherard. Raii Hift. Tom. 3. 321. numer. 18.*
Ketmia paluftris minor, *folio angufto*, *flore parvo purpurafcente*, *fructu*
depreffo pentagono *Zannich* *lft.* * *Pentagonocarpus* *eft novum plantæ gener a*
Mi.

Michelia institutum in sua Appendice altera ad primam partem Novorum Generum Plantarum iam editam, Plantas quasdam complectens cum *Keimias* baccenae commixtas. Eius characteres sunt, flor quidem *Keimias*, sed fructus compressus, pentagonus, in quinque cellulas divisus Eonymi fructuum instar desiciens, in quarum singulis unicum semen reniforme continetur

PENTAPHYLLOIDES argenteum alacum, seu *Potentilla* Inft. R. H. 298. * *Potentilla* Matth. 1070. & *Cesalp.* 557. *Argentina* Dod. *Anserina* Trag.
2. *Pentaphylloides* palustre rubrum Inft. R. H. 298. * *Quinguefolium* palustre sive aquaticum *Taberna.*

PERIPLOCA *Monspeliaca*, foliis acutioribus Inft. R. H. 93. * *Scaumones* *Monspeliaca* L. B.
2. *Periploca* foliis oblongis Inft. R. H. 93. * *Apocino* *Serpeggiante* Matth. 1156. *Periploca* *Cesalp.* 119
3. *Periploca* Americana scandens, Nummulariz folio, flore albo Inft. R. H. 493

PERSICA vulgaris, flore pleno Inft. R. H. 624

PERSICARIA Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo Inft. R. H. 38
2. *Persicaria* Salicis folio, *Potamogeton* angustifolium dicta (acida, non maculata) Inft. R. H. 509
3. *Persicaria* mitis maculosa, spicis crassioribus & tenuioribus (brevioribus potius) erectis Michel. H. Pif.
4. *Persicaria* Florentina urens non maculosa, spicis longis strigosis Michel. H. Pif. * *Persicaria* Ric. *Hydropiper* Offic. ut & duæ superiores

PERVINCA vulgaris latifolia, flore cæruleo Inft. R. H. 119
2. *Pervinca* Italica latifolia subhirsuta, flore magno violaceo H. Pif.
3. *Pervinca* vulgaris latifolia, flore albo Inft. R. H. 119
4. *Pervinca* vulgaris angustifolia, flore cæruleo Inft. R. H. 120. * *Clematide* prima Matth. 1006. *Provincia* *Cesalp.* 336. *Vinca* *Pervinca* Brunf. *Cbatmedaphne* Eurd. *Clematis* *Daphnoides* Dod.
5. *Pervinca* vulgaris angustifolia, flore rubente Inft. R. H. 119
6. *Pervinca* vulgaris angustifolia, flore albo Inft. R. H. 119
7. *Pervinca* angustifolia variegata Inft. R. H. 120

PETASITASTRUM alpioum medium, floribus albis, flosculis inaequalibus, filameotis longis leviter capitatis. * *Petasitastrea* a *Petasitis* distinctis Michelius eo quod prima (ni fallor) praeter flosculos quibus capitulum componitur, semiflosculos exiguos habeant coronae vices repraesentantes, sicut ac aciditis in *Petasitis*

2. Idem filameotis longis bifidis non capitatis
3. *Petasitastrum* alpioum minus vulgare, flosculis inaequalibus
4. *Petasitastrum*, quod *Petasites* minor, radice reptante, crasso non anguloso folio Michel. H. Pif.
5. *Petasitastrum*, quod *Petasites* monanthos rotundifolius glaber Vaill. in *Act. Ac. R. Sc. Ann.* 1719. pag. 403. num. 5

PETA-

PETASITES maior vulgaris flosculis æqualibus Infl. R. H. 451. * *An. Tussilagine maggiore* Mattb. 894. *Hac, & sequens in Officinis promiscue vocantur Petasites, Tussilago maior, & Personata*

2. Idem flaminum apicibus capitatis & ovatis

PHALANGIVM parvo flore non ramosum Infl. R. H. 368

PHASEOLVS Indicus cochleato flore Infl. R. H. 414. * *Caracollo, & Caracores vulgo*

PELLANDRIVM Infl. R. H. 306. * *Silau Plinii Casalp. 291. Cicutaria palustris* Lob. *Cicuta aquatica Gesf.*

PHILLYREA, an latifolia spinosa Infl. R. H. 596. * *Viuaastro vulgo ut & sequentes*

2. Phillyrea latifolia lævis Infl. R. H. 596. * *Mabalepum Serapionis Tab.*

3. Phillyrea foliis longioribus læviter dentatis

4. Phillyrea folio Ligustri Infl. R. H. 596. *Itatrum aliis Litterum Casalp.*
74. *Lillatro vulgo*

PHLOMIS fruticosa, Salvia folio latiore & rotundiore Infl. R. H. 177. * *Verbasci III. ovvero salvatico* Mattb. 1205. *Verbascum salicifolium C. B.*

2. Phlomis fruticosa Salvia folio longiore & angustiore Infl. R. H. 177

3. Phlomis fruticosa, lutescente tomento obdita, Salvia folio acuminato, flore luteo

4. Phlomis fruticosa Lusitanica, flore purpurascens, foliis acutioribus Infl. R. H. 178

PHYTOLACCA Americana maiori fructu Infl. R. H. 299. * *Solanum racemosum Indicum H. R. Par.*

PILOSELLA maxima non repens, utraque foliorum parte saturoviridi Raii Hist. Tom. 3. 147

2. Pilosella repens minor, canle erecto pedali, polyanthes, foliis angustis oblongis Raii Hist. Tom. 3. 147

3. Pilosella alpina minor repens glabra & multiflora

PIMPINELLA agrimonoides odorata Infl. R. H. 157

2. Pimpinella sanguisorba maior Infl. R. H. 156. * *Pimpinella maggiore* Mattb. 1087

3. Pimpinella sanguisorba media, foliis inferne villosis & canescentibus, femine crassiore profunde rugato, ac quatuor amplioribus & crispatis alis munito

4. Eadem alpina alba seu pallide virens, floribus virescentibus, femine oblongo tetragono pene rugato & nonnihil alato, alis crassioribus integris

5. Pimpinella sanguisorba minor glabra, foliis maioribus, femine profunde rugato, ac quatuor crassioribus alis ferme integris aucto

6. Eadem foliis minoribus, femine quatuor membranaceis & crispatis alis aucto

7. Pimpinella sanguisorba minor rubra lævis, capitulo oblongo flore purpureo

K

8. Ea-

8. Eadem hirsuta. * 2. 3. 4. 5. 6. 7. & 8. *Pimpinella* species usurpari promiscue possunt pro *Pimpinella*, *Sanguisorba*, & *Sorbastrella* Offic.

PINVS sativa (fructu acuto, squamis proceris acutioribus, ossiculis duris) Infl. R. H. 585. * *Pino domestico* Mattb. 108. *Pinus Casalp.* 129

2. *Pinus sylvestris montana altera* Infl. R. H. 586

3. *Pinus sylvestris montana foliis triuncialibus lacusculis glaucis, conis albicantibus turbinatis habitioribus triuncialibus, squamis parvis copiosioribus. Pinus sylvestris foliis brevibus glaucis, conis parvis albis* Rais Syn. Ed. 3. 442

PLANTAGO latifolia maior crispa, non sinuata, caulibus erectis. *Plantago media* Mattb. 236. Ed. 1571. *Valgrif.* in 4. & pag. 507. Ed. 1585. *Valgrif in fol.* An *Plantago vulgaris*, latifolia Mattb. Lugd. 1254. *Plantago maior* Dod. Pempt. 107. Tabern. Icon. 731. *Arnoglossa*, *Plantago latifolia laevis* Lob. Icon. 303. *Plantago rubra* Trag. 225. *Piantaggine* Casalp. 340

2. *Plantago latifolia glabra, non sinuata, crispa* Michel. H. Pil.

3. *Plantago lato scabro pallido laciniato folio nostras.*

4. *Plantago latifolia laciniata, caulibus reclinatis* Michel. H. Pil. An *Plantago maior* Brunf. Tom. 1. 22

5. *Plantago foliis latis oblongis pallidis, non sinuatis & utrinque acuminatis.* An *Plantago maior* Fuchs. Hist. 38. * *He Plantaginis species promiscue usurpantur pro Arnoglossa, Arnoglossa, Plantagine, Quinquenervia, & Centonertia* Offic. & *Piantaggine* Ric. Petacciola vulgo

6. *Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spicam dispositis* Infl. R. H. 126. * *Plantago foliato caule* Casalp. 327

7. *Plantago latifolia incana* Infl. R. H. 126. * *Piantaggine maggiore* Mattb. 508

8. *Plantago angustifolia maior* Infl. R. H. 127. *Piantaggine lunga* Mattb. 509. *Lanceola maior* Casalp. 328. *Plantago lanceolata*, & *Quinquenervia* Offic.

9. *Plantago alpina folio angusto longo & nigricante* Infl. R. H. 127

10. *Plantago angustifolia alba Hispanica* Infl. R. H. 127. * *Holostemum* L. B.

11. *Plantago maritima maior tenuifolia* Infl. R. H. 127

12. *Plantago gramineo folio maior* Infl. R. H. 127. * *Serpentina* Mattb.

523. *Coronopus quadam in Montibus* Casalp. 330

13. *Plantago montana crasso glabro canaliculato tenuioreque folio, profundissime radicata* Michel. H. Pil.

PLATANVS Orientalis verus Infl. R. H. 590. * *Platanus* Marc. 54. *Casalp.* 41. *Platanus* Mattb. 148

PLVMBAGO quorundam Infl. R. H. 141. * *Glaucum sylvestre vulgo Herba S. Antonii* Casalp. 359. *Dentellaria* Rond. *Molybdena* Plinii Ang. *Flammula* Gesa.

POLEMONIVM vulgare caeruleum Infl. R. H. 146. * *Valeriana graca* Dod.

POLIVM Lavandulae folio Infl. R. H. 206. * *Folio secundo* Mattb. 889. *Polium montanum quibusdam* Iva Arctica foliolis Rosmarini Coronarii Casalp. 458

2. *Polium montanum* incanum, nunc erectum, nunc supinum, foliis serratis, floribus albis, circa faucem macula sublutea notatis, capitulis subrotundis umbellatim compactis. *Polium montanum supinum alterum* Infl. R. H. 206. * *Polio* Matth. 888. *Polio montano* Ric.

3. *Polium maritimum* subinaoum serotinum & supinum, folia serrata, floribus albis, umbilico pallecente, capitulis maioribus in umbella rariore dispositis. *Polium maritimum supinum Venetum* Infl. R. H. 206

POLYACANTHA annua maior præalta latifolia, venis albis distincta, floribus purpureis. *Oniscus albus maculis notatus, flore purpureo* Infl. R. H. 450. * *Carduus luteus*, *Edeguar Arabum* Rauh-volf.

2. *Polyacantha vulgaris altissima* Vail. in Ad. Ac. R. Sc. An. 1718

POLYGALA vulgaris lutea I. B. 3. 388

2. *Polygala purpurea* Infl. R. H. 174

3. *Polygala vulgaris floribus cæruleis* Bot. Par. 160

POLYGONATVM maius, folio lato rotundo, caule striato, flore maiore albo, pediculo brevi appenso. *Polygonatum latifolium, flore maiore odora* Infl. R. H. 78. * *Hec, & quatuor sequentes Polygonati species in Officinis promiscue usurpantur pro Polygonato, & Sigillo Salomonis*

2. Idem minus, caule anguloso

3. *Polygonatum folio lato oblongo, caule lævi rotundo, floribus minoribus angustioribus*, ternis plerumque longo pediculo appensis

4. *Polygonatum latifolium vulgare* (caule rotundo, floribus pediculo brevi donatis) Infl. R. H. 78

5. *Polygonatum latifolium vulgare* (caule rotundo, floribus longo pediculo fuscis) Infl. R. H. 78. * *Fraxinella* Casalp. 224

6. *Polygonatum angustifolium non ramulosum* Infl. R. H. 78. * *Polygonatum angustifolium* Casalp. 224

POLYGONVM latifolium Infl. R. H. 510. * *Polygonum Maschis* Matth. 1001. *Polygonum vulgo Centinodia fuscis candicantibus* Casalp. 168. *Hec & sequenter Polygoni species usurpari possunt pro Polygono maiore, Centinodia, & Corrigiola* Offic.

2. *Polygonum maritimum Hispanicum, caulibus longissimis, calyce floribus albo* Infl. R. H. 510

3. *Polygonum maritimum latifolium* Infl. R. H. 510. * *Polygonum terminus in maritimis* Casalp. 281

4. *Polygonum oblongo angusto folio* Infl. R. H. 530

POLYPODIVM Cambrobritannicum, pinnulis ad margines laciniatis Infl. R. H. 540

2. *Polypodium vulgare* (pinnulis undulatis) Infl. R. H. 540. * *Hec, & sequens Polypodii species usurpari promiscue possunt pro Polypodio* Offic. & *Polypodio Quercino* Ric.

3. Idem pinnulis altius serratis

5. *Polypodium maius, acuto folio Viterbiense* Infl. R. H. 540

5. *Polypodium angustifolium, folio vario* Infl. R. H. 540

POPVLAGO maior praecox, Cacalim foliis dilute virentibus, flore luteo non splendente, petalis uncialibus subrotundis. An *Populago flore maiore*, Infl. R. H. 273. * *Farfargio* Matth. 895. *Caltha palustris* Offic. us & sequentes

2. *Populago flore pleno* Infl. R. H. 273
3. *Populago flore minore* Infl. R. H. 273
4. *Eadem petalis acutis*

POPVLVS nigra Infl. R. H. 592. * *Popolo nero* Matth. 153. *Populus nigra* Casalp. 120. *Albero Ric.* *Albero & Pioppo vulgo*

2. *Populus alba* maioribus foliis Infl. R. H. 592. * *Popolo bianco* Matth. 152. *Populus alba*, vulgo *Albarus* vocata Casalp. 120. *Farfarius antiquorum* Cord. *Gattice vulgo*
3. *Populus tremula* Infl. R. H. 592. * *Popolo Libico* Matth. 154. *Populus* quae in *Alpibus nascitur*, *nigriori aspectu* Casalp. 120

PORTVLACA latifolia five sativa Infl. R. H. 236. * *Portulaca domestica* Matth. 502. *Portulaca latioribus foliis* Casalp. 263. *Portulaca* Offic. *Porcellana domestica* vulgo

2. *Portulaca angustifolia* five *sylvestris* Infl. R. H. 236. * *Portulaca salpatica* Matth. 503. *Portulaca angustioribus foliis* Casalp. 263. *Porcellana Ric.*

POTAMOGETON alpinum, Plantaginis folio Infl. R. H. 233

2. *Potamogeton foliis crispis*, five *Lactuca Ranarum* Infl. R. H. 233

PRIMVLA veris floribus ex singularibus pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus Infl. R. H. 125. * *Hec & sequentes pro Primula veris*, & *Paralyfi* Offic. usurpari possunt

2. *Eadem foliis multiplicibus*
3. *Primula veris* floribus ex singularibus pediculis, purpureis maioribus
4. *Primula veris montana incana* (umbellata) lutea Infl. R. H. 124

PRVNVS silvestris, fructu maiore cerasiformi caeruleo dulciore ac suaviore

PSEVDODICTAMNVS acetabulis Moluceæ Infl. R. H. 188

2. *Pseudodictamnus* Hispanicus, amplissimo folio candicante & villosa Infl. R. H. 188

3. *Pseudodictamnus* Hispanicus, amplissimo folio nigricante & villosa Infl. R. H. 188

4. *Pseudodictamnus verticillatus inodorus* Infl. R. H. 188. * *Dittamo falso* Matth. 745. *Quadam ex Creta ad nos allata pro Pseudodittamo* Casalp. 440. *Dittamo falso*, & *Pseudodittamo* Ric. 35

PSEVDORVTA Patavina, floribus luteis umbellatis Micheli Nov. Plant. Gen. Part. 1. pag. 22. Tab. 19

PSEVDOSPONGIA crustacea fluvialilis Micheli. Nov. Plantar. Gener. Part. 2. . . . Tab. . . .

* *Planta hac aquis perpetuo submersa, parietes piscinae in centro horti sitae vestit Byssum & Lichenum crustaceorum in morem. Structura spongiosa simi.*

frons est, & filamentis nempe raris viriscentibus variegue implicitis contexta, quibus ad basem numerosi adhaerent fructus exigui lutescentes, bine complanati ac exenati, inde vero globosi, seminibus minutissimis reperi. Planta superficies viridis est, pluribus foliis radiatim distincta. Haec autem melius patebunt in Leone quam ante multos annos Mieselins ari incidi curavit, & in secunda Parte eius Novorum Generum Plantarum inter Submarinas proponitur

PSEVDOSTACHYS montana nigra maior, Betonica folio longiore, flore variegato, calycibus admodum villosis

PSYLLIUM maius erectum Inft. R. H. 128. * Psyllio Matth. 1122. Psyllium Offic. Psyllio Ric. ut, & sequens

2. Psyllium maius supinum Inft. R. H. 128. * Psyllio II. Matth. 1723

PTARMICA, quae Ageratum (maius) foliis ferratis C. B. Pin. 221. * Eupatorio di Meue, Canforata, Erba Giulia, Samonico Ric. ut & sequens

1. Ptarmica, quae Ageratum (minus) foliis ferratis C. B. Pin. 221. * Canforata Casalp. 480

3. Ptarmica alpina, foliis profunde incisus Inft. R. H. 497

4. Ptarmica incana, Linariae foliis angustioribus cristatis & quasi Coronopi caesuras meotientibus, floribus luteis

5. Ptarmica Linariae folio angustissima, cum margine peculiariter dentato & veluti squamoso, floribus albis

6. Ptarmica incana pinnulis cristatis Coroll. Inft. R. H. 37. * Assenso Seripho di Egitto Matth. 726

7. Ptarmica Orientalis, foliis Tanacetii incanis, semisfoculis florum pallide luteis Coroll. Inft. R. H. 37

PVLMONARIA Italicorum ad Buglossum accedens Inft. R. H. 136. * Vn alia Pulmonaria Matth. 1094. Pulmonaria Casalp. 434. Symphytum maculosum C. B. Pulmonaria Offic. ut & sequens

1. Pulmonaria maxima, foliis quasi saccharo in crustatis Raii Hist. Tom. 3. 266

3. Pulmonaria foliis magis maculatis, maculis albis

4. Pulmonaria foliis latis acutissimis, maculis albidis magnis uodique infectis

5. Pulmonaria maculosa, maculis rarioribus & minus apparentibus

6. Pulmonaria foliis minoribus & minus acutis, maculis parvis

7. Pulmonaria alpina, foliis praelongis utriusque acutis, maculis rarioribus parvis & vix apparentibus notatis

8. Pulmonaria (alpina minor,) viridi subrotundo (molli) non maculato folio Inft. R. H. 137

PVNICA flore pleo maiore Inft. R. H. 336. * Punica sterilis, sed peregrina in Italia Casalp. 141. Balauzi Ric.

2. Punica silvestris Inft. R. H. 636. * Punica cuius fructus succus acidus Casalp. 141. Melagrane forti Ric. & vulgo

QVA.



VAMOCLIT Americana, folio Hederæ flore coccineo Boerh.
Iod. Alt. H. L. Bat. 1. 247

QUINQUEFOLIUM erectum maximum, flore pallide luteo, petalis cordatis

2. Quinefolium alpioum erectum latifolium hirsutum (caule patulo, & dichotomo) flore luteo parvo, petalis aogustioribus cordiformibus Michel. H. Pif.

3. Quinefolium montanum erectum hirsutum, foliis subtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis Michel. H. Pif.

4. Quinefolium mooraoum erectum hirsutum, foliis profunde & eleganter ioclis, flore luteo, petalis cordatis Michel. H. Pif.

5. Quinefolium erectum luteum Ioff. R. H. 297

6. Quinefolium folio argeoteo Ioff. R. H. 297. * *Pentafillo bianco* Mattb. 1074

7. Quinefolium, an mious repens alpinum aureum Ioff. R. H. 297

8. Quinefolium erectum miioum luteum, radice repente, veroum

9. Quinefolium maius repeos Ioff. R. H. 297. * *Cingefoglio* Mattb. 1072. *Quinefolium Casalp.* 554. *Pentaphyllum* & *Quinefolium* Offic.

10. Quinefolium repeos maius alterum, foliis amplioribus. * *Cingefoglie* Ric.

11. Quinefolium alpinum album ramosum, foliis amplioribus, in apice incis, utraque parte lanuginosis, petalis florum cordiformibus Michel. H. Pif.



RANUNCULUS nemorosus luteus Ioff. R. H. 285

2. Ranuoculus phragmites albus vernus Ioff. R. H. 285

3. Ranuoculus nemorosus trifolius Ioff. R. H. 285

4. Ranuoculus nemorosus, flore caruleo, foliis maioribus, Apennini Montis Ioff. R. H. 285. *Anemonoides monanthos, carulea maior* Vaill. in *Alt. Ac. R. Sc. Ann.* 1710. pag. 40. num. 5

5. Ranuoculus nemorosus, flore caruleo, foliis mioribus, Apennini Montis Ioff. R. H. 285. *Anemonoides monanthos carulea minor* Vaill. in *Alt. Ac. R. Sc. Ann.* 1710. pag. 40. num. 4

6. Ranuoculus vernus maior, foliis rotundis, per basim sinuatis, vel dentatis, ooo maculatis, aut maculis glaucis vix apparentibus ioterdu nota-tis, flore decapetalo luteo, extus luteoviridi

7. Idem foliis oblongis neque sinuatis neque fpleodeontibus, sed secuodum costam linea nigra notatis, flore luteo

8. Idem medius, foliis rotundis, laeviter sinuatis, maculis albicaotibus at-que dilute viridibus vix apparentibus notatis, flore enneapetalo vel decapetalo iotus luteo extus luteo viridi, calyce triphylo. *Chelidonium minus* Trag. 113. *Cord.* 121. * *An Favagello* vulgo, & *Scrophularia minor* Casalp.

546. *He tres Ranunculi verni specier promiscue usurpantur pro Scrophularia minore, & Chelidonio minore* Offic.

9. Ra-

9. Ranunculus tridentatus vernus, foliis amplioribus, maculis albis notatis, lobis rotundis, flore dilute purpureo maiore, petalis sex lineas longis & tres latis. *An Ranunculus tridentatus vernus, folio variegato* Inft. R. H. 287

10. Idem foliis minoribus non maculatis, lobis acutis, flore purpureo minore

11. Idem foliis minoribus maculatis, lobis acutis, flore minore dilute caeruleo. * *Ha tres Ranunculi tridentati species promiscue vocantur Hepatica nobilis, Trifolium Hepaticum, Trinitatis Herba, & Trinitas*

12. Ranunculus palustris echinatus Inft. R. H. 286

13. Ranunculus arvensis echinatus Inft. R. H. 289

14. Ranunculus Lusitanicus, folio subrotundo, parvo flore Inft. R. H. 286

15. Ranunculus Alepus, grumosa radice, flore purpureofanguineo maximo Inft. R. H. 288

16. Ranunculus Alepus, grumosa radice, flore line rubris & luteis striato Inft. R. H. 288

17. Ranunculus Asphodeli radice, flore sanguineo Inft. R. H. 288

18. Ranunculus Romanus gigas, miniato flore Inft. R. H. 288

19. Ranunculus Asphodeli radice, flore pleno albo rubris striis distincto Inft. R. H. 288

20. Ranunculus Asphodeli radice, flore pleno rubello, apicibus purpureis & roseis Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Parc. 1. 33. num. 50

21. Ranunculus lanuginosus, Apii folio, Asphodeli radice Inft. R. H. 289

22. Ranunculus chærophyllus, Asphodeli radice Inft. R. H. 289

23. Ranunculus rutaceo folio, flore suaverubente Inft. R. H. 289

24. Ranunculus alpinus Fumarie folio Inft. R. H. 289

25. Ranunculus grumosa radice, folio Ranunculi bulbosi Inft. R. H. 291

26. Ranunculus pratensis erectus dulcis & maculatus

27. Ranunculus nemorosus, Vitis folio non maculato, lobis in acutas lacinias incisus, flore aureo, calyce non reflexo, fructu rotundo

28. Ranunculus alpinus hirsutus serotinus, foliis parvis non maculosis, flore aureo, calyce non reflexo, fructu rotundo

29. Ranunculus alpinus hirsutus, foliorum sectionibus in acutas lacinias divisus, flore aureo, calyce non reflexo

30. Ranunculus nemorosus, foliis profunde sectis, fuscis & albopallidis maculis notatis

31. Ranunculus rectus, foliis pallidioribus hirsutis Inft. R. H. 289

32. Ranunculus repens flore pleno l. B. 3. 420

33. Ranunculus pratensis repens, foliis pallidioribus rugosis non maculatis & nonnihil pilosis, flore luteo. * *An Ranunculo II. Matth. 645*

34. Idem foliis parvis viridibus & maculis albis notatis

35. Ranunculus alpinus pratensis, repenti similis, sed minor Micheli H. Pil.

36. Idem foliis minoribus

37. Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda, minor hirsutus, foliis pallidioribus dumtaxat trilobatis, lobis contiguis acute incisus & ab exortu albidia macula notatis, flore luteo splendente, calyce reflexo. * *An Ranunculus V. Matth. 648. Hic & tres sequentes Flammula aquatica in Officinis vocantur*

38. Idem foliis parvis atrovirentibus, lobis contiguis minus lacinatis, lacinis obtuse mucronatis & ad sinus albidia macula notatis

39. Idem

39. Idem foliis in tres lobos divis, lobis inferioribus in suprema basi parti admodum sinuatis, omnibus ad laciniarum exortum alba macula notatis

40. Idem maior & minus hirsutus, foliis trilobatis, lobis inferioribus ab intermedio longe distantibus, omnibus secundum margines nigricantibus, & laciniiis secundariis minus laceratis

41. *Ranunculus alpinus* serotinus hirsutus non maculatus, foliis parvis

42. *Ranunculus montanus* *Aconiti* folio, albus, flore maiore *Inst. R. H.* 290

43. *Ranunculus palustris* *Apii* folio, laevis *Inst. R. H.* 291. * *An Ranunculo I. Matth. 644. Ranunculus & Sardonias Dioscoridi C. B. Apiastrum Cord.*

44. *Ranunculus arvensis* annuus laevis, interdum hirsutus, foliis trilobatis lobis parum incisis, & ad exortum macula nigra notatis, flore luteo splendente, calyce reflexo, capitulo subrotundo, seminibus ad latera subasperis. *Ranunculus III. Matth. ed. Valgrif. lat. in fol. 458. & Ital. 646.*

45. *Ranunculus arvensis*, foliis Chamæmeli, flore minore aërorubente *Inst. R. H.* 291. * *Flor Adonis Clus. Eranthemum Dod.*

46. *Ranunculus palustris*, *Plantaginis* folio ampliore *Inst. R. H.* 292. * *Plantagine aquatica Matth. 510. Plantago aquatica Casalp. 552*

47. *Ranunculus palustris*, *Plantaginis* folio angustiore *Inst. R. H.* 292

48. *Ranunculus palustris* (annuus) *Plantaginis* folio, humilis & supinus *Inst. R. H.* 292

RAPISTRVM maximum rotundifolium monospermon *Inst. R. H.* 211

RAPVNCVLVS spicatus albus *Inst. R. H.* 113

2. *Rapunculus alpinus* caeruleus, angusto raro & subinde dentato folio *Michel. H. Pic.*

RESEDA *Plin. L. 17. cap. 12. Reseda candida Lugd. 1199. An Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo Inst. R. H.* 423

RHAMNOIDES fructifera, foliis salicis, bacis aureis *Coroll. Inst. R. H.* 53

RHAMNVS Catharticus *Inst. R. H.* 593. * *Spina infectoria Matth. 175. Spina Cervalis Casalp. 101. Spincervino Ric.*

RHAMNVS vide **IASMINOIDES**

RHVS Africanus trifolius, foliis non serratis angustis & acutis *H. Pic.*

2. *Rhus Virginianum Inst. R. H.* 611

3. *Rhus* folio *Vitæ* *Inst. R. H.* 611. * *Rhu Matth. 233. Rhus obsoniorum Casalp. 77. Rhus Coriaria Dod. Sommacco Ric.*

RICCIA minima pinguis, foliis laticusculis ample sulcatis & glauco virecentibus *Michel. Nov. Plant. Gen. 107. num. 2. Tab. 37. fig. 4*

RICINOIDES ex qua paratur *Tournesol* Gallorum *Inst. R. H.* 655. * *Heliotropio minore Matth. 1364. Heliotropium, Tricoccum Casal. 381*

RICI-

RICINUS vulgaris Inft. R. H. 537. * *Phastus Romanus* Marc. 29. *Ricino* Matth. 1210. *Ricinus* vulgo *Girafole* *Cafalp.* 381

- ROSA rubello flore maiore multiplicato five pleno, incarnata vulgo I. B.
2. 36. * *Rofa* Offic.
3. *Rofa* omnium Calendarum, flore pleno, carneo Inft. R. H. 639. *
Rofa d'ogni Mefe vulgo
4. *Rofa* centifolia Batavica Cluf. Hift. 113. * *An Rofa Centifolia* *Cafalp.* 96
5. *Rofa* flore albo pleno (flaminulis donato) Inft. R. H. 637
6. *Rofa* flore albo pleno (flaminulis deftituto) Inft. R. H. 637. * *An*
Rofa Anconitana Marc. 60
7. *Rofa* rubicunda, faccharina dicta, Gracula Plinii Cam. Hort. *Bottomi* dē
Rofe *roffe* Ric. *Rofa* Offic.
8. *Rofa* verticolar Inft. R. H. 637
9. *Rofa* lutea simplex Inft. R. H. 637
10. *Rofa* lutea multiplex Inft. R. H. 638
11. *Rofa* mufcata limplici flore Inft. R. H. 637. * *Rofa Damascena* Marc.
60. *Rofa mufcata* *Cafalp.* 96. *Rufellina* Dommafehina vulgo ut & *fequens*
12. *Rofa* mofchata flore pleno Inft. R. H. 637
13. *Rofa* filveftris feu dumetorum fcandens fempervirens, Myrri folio-lu-
cido, flore albo odorato (in umbellam difpofito) fructu parvo rotundo, &
hifpidi Michel. H. Pif. * *Hec, & dua fequentes pro Rofa Canina, Cynof-*
bato, & Cynorrhodo Offic. *ufurpari poffunt*
14. *Rofa* filveftris repens, foliis parvis acuminatis glabris & fimpliciter
dentatis, flore albo odorato, petalis cordatis, fructu ovato laevi
15. *Rofa* alpina, foliis fubrotundis molliter hifcutis & quali canefcentibus
ac multipliciter dentatis, flore incarnato odorato, petalis cordatis novem
lineas longis & tres latis, fructu rotundo hifpido
16. *Rofa* spinofa pumila, foliis odoratis & pulchre dentatis, flore odorato,
externe aureo, interne phœniceo, fructu rotundo Michel. H. Pif.
17. *Rofa* pumila spinofiffima, caule non ramulo fingulis annis pereunte,
foliis Pimpinellæ glabris, flore albo odore parvo, petalis cordatis, fructu py-
riformi depreffo glabro. *An Rofa pumila spinofiffima* Inft. R. H. 638

ROSMARINVM spontaneum feu maritimum, foliis longioribus angu-
ftioribus & peracuris, flore cæruleo minore

1. Idem foliis anguftis brevioribus & minus acutis
2. Idem latifolium, flore cæruleo maiore, cum labio inferiori fimbriato.
* *Ha Rofmarini fpecies* *Rofmarinus coronarius, Caffia Latinorum, Caffia ni-*
gra *Theophrasti, Libanotis coronaria* Offic. & *Ramerio* Ric. *promifcue vocantur*

RVBEOLA alpina latifolia lævis, floribus purpufcentibus

1. Rubeola, quæ Aparine latifolia humilior montana Inft. R. H. 114
2. Rubeola rotundifolia glabra, floribus albis paniculatim nafcentibus
3. Rubeola maritima quadrifolia, viculis eraffioribus (foliis ad radicem
hifcutis latifculis & rotundioribus) floribus purpufcentibus (aut albis)
Michel. H. Pif.
4. Rubeola arvenfis fupina annua, floribus cæruleis quadripartitis, in par-
vis & foliofis umbellis difpofitis, fructu coronato. *Rubeola arvenfis repens*
L. *caym.*

carulea C. E. Fin. 334. Prodr. 145. *Rubia parva*, flore caruleo, se spargens I. B. 3. 719. *Aparine supina pumila*, flore caruleo Insl. R. H. 114
6. *Rubeola arvensis erecta* flore caruleo H. Pif.

RVBIA tinctorum sativa Insl. R. H. 114. * *Rubia domestica* Matth. 970. *Rubia quam Officina Rubia Tinctorum vocant sativa* Casalp. 323. *An Robbia da Tintori* Ric. Erythreodanum, *Rubia* Offic.

2. *Rubia silvestris Monspessulana maior* Insl. R. H. 114. * *An Rubia silvestris* Casalp. 323. *Rubia* Offic.

RVBVS vulgaris, sive *Rubus* fructu nigro Insl. R. H. 614. * *Rovo* Matth. 1063. *Rubus floribus subrubentibus* Casalp. 98. *Huius fructus vocantur Mora, Mora bati, Mora rubi, Vaccinia & More di Siepe* Ric.

2. *Rubus vulgaris spinosus*, flore plenissimo roseo H. Pif.

3. *Rubus flore albo* Insl. R. H. 614. * *Rubus floribus candidis* Casalp. 98

4. *Rubus vulgaris spinis carens* Insl. R. H. 614

5. *Rubus montanus repens*, sarmentis longissimis & rotundis, spinis tenuissimis exasperatis, amplo *Coryli* folio, flore albo, fructu nigro crassiore Michel. H. Pif.

6. *Rubus vulgaris repens*, sarmentis rotundis spinosis, flore albo, petalis subrotundis parvis. * *Ab Rubi genus alterum humilior* Casalp. 98

7. *Rubus spinosus*, foliis *Cotylaceis* subtus incanis, flore roseo, petalis oblongis

8. *Rubus repens*, fructu caesio Insl. R. H. 614

RVSCVS myrsifolius aculeatus, fructu rubro Insl. R. H. 79. * *Rufco* Matth. 1274. *Rufcus* Casalp. 221. *Brusco* Ric. *Rufcus* Offic. *Pugnitopo vulgo*

2. *Rufcus myrsifolius aculeatus*, fructu ochroleuco Michel. H. Pif.

3. *Rufcus latifolius*, fructu folio innascente Insl. R. H. 79

4. *Rufcus angustifolius*, fructu folio innascente Insl. R. H. 79 * *Hippoglossa* Matth. 1254. *Bonifacia & Birlingua* Anguil. *Voualaria* Brunf. *Laurus Alexandrina* Tab. *Radix Idaea Dioctordis* Column.

5. *Rufcus angustiore folio*, fructu folio innascente Insl. R. H. 79

6. *Rufcus angustifolius*, fructu summis ramulis innascente Michel. H. Pif.

RVTA hortensis latifolia Insl. R. H. 257. * *Rosa* Matth. 775. *An Rosa* Casalp. 574

2. *Rosa hortensis altera* Insl. R. H. 257



ABINA folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487. * *Sabina* fenna *Bacche* Mattb. 138

2. *Sabina* folio Cupressi (baccis rubris) C. B. Pin. 487. * *An Sabina vulgaris* Casalp. 136. *Sabina con le bacche rosse* Mattb. 136

3. *Sabina* folio Cupressi (non fructifera) C. B. Pin. 487. * *Hac, & superior Sabina species promiscue usurpantur pro Sabina, & Savina Offic.*

SALICARIA vulgaris purpurea, foliis oblongis Inft. R. H. 253. * *Vn altra Lysimachia* Mattb. 1000. *Lysimachia qua purpureum edit florem* Casalp. 261

2. *Salicaria* Hyssopi folio angustiore Inft. R. H. 253

SALICORNIA geniculata sempervirens Coroll. Inft. R. H. 51. *Salfolae* genus multis ramulis fruticans, lignosum & grandius, perpetuum Casalp. 173

2. *Salicornia* geniculata, annua Coroll. Inft. R. H. 51. * *Salfolae* genus simplicius & brevius, dodrantali altitudine, rectum annuum Casalp. 171. *Hae duae Salicorniae species pro Kals Arabum in Offic. usurpantur*

SALIX vulgaris alba arborecens Inft. R. H. 590

2. *Salix* Tini folio utrinque glabro, inferne subcinereo, auriculato, & non auriculato H. Pif.

3. *Salix* folio subrotundo latiore, utrinque glabro, anrino

4. *Salix* arborecens, Mespili folio aurito & villoso

5. *Salix* alpina, foliis laurinis ample auriculatis, ad oras crispis & dentatis

6. *Salix* humilis, capitulo squamoso Inft. R. H. 591

7. *Salix* Orientalis flagellis deorsum pulchre pendencibus Coroll. Inft. R. H. 41

SALVIA montana maxima, foliis Hormini, flore flavescente (punctato) Inft. R. H. 180. * *Melinum alius Melligo* Casalp. 443. *Colus loris* Lob.

2. *Salvia* Orientalis frutescens, foliis circinatis, acetabulis Moluccae Coroll. Inft. R. H. 10

3. *Salvia* Orientalis latifolia hirsutissima viscosa pennata, flore & calyce purpureis, inodora Boerb. Ind. Alt. H. L. Bar. Part. 2. 167

4. *Salvia* bifanrica, floribus ex caeruleo purpureis. * *An Salvia minore, Mattb. 748. Hac, & sequentes Salvia species promiscue usurpantur pro Salvia Offic.*

5. *Salvia* foliis auritis & non auritis, floribus candidis

6. *Salvia* maior, foliis ex luteo & viridi variegatis Inft. R. H. 180

7. *Salvia* maior, foliis verticilloribus Inft. R. H. 180

8. *Salvia* latifolia maior (tota viridis) flore purpureo, verticillis florum foliosis Michel. H. Pif.

9. *Eadem* tota rubra vel purpurea. *An Salvia nigra vel rubra* I. B. 3. 304

10. *Salvia* maior incana, caule tomentoso, flore purpureo parvo, calyce ventricoso

11. *Eadem* flore albo

12. *Salvia* foliis subrotundis undulatis & serratis. *An Salvia latifolia, serrata* Inft. R. H. 180

13. *Salvia* foliis tenuissime serratis, flore parvo violaceo

L. 2

14. Sam-

14. *Salvia Hispanica angustifolia*, Lavandulæ odore (flore magno) Michel.
H. Pil. * *Salvia* di Spagna vulgo

SAMBVCVS fructu in umbella nigro Inft. R. H. 606. * *Sambucus Cæfalp.* 91. *Sambuco Ric.*

2. *Sambucus laciniato folio* Inft. R. H. 606

3. *Sambucus humilis*, five *Ebulus* Inft. R. H. 606. * *Ebulus Cæfalp.* 209. *Ebulo Mattb.* 1333. *Ebbio Ric.* *Ebnur Offic.*

4. *Sambucus humilis*, five *Ebulus folio laciniato* Inft. R. H. 606. * *Ebulus Creticus laciniatis foliis* Donn. *Cat. Hort. Flor.*

SAMOLVS Valerandi Inft. R. H. 143. * *Anagallis aquatica* C. B.

SANICVLA officinarum Inft. R. H. 326. * *Diapensia* ovvero *Sanicola*.
Mattb. 1073. *Sanicula Cæfalp.* 556. *Consolida quinqüefolia* Tabern.

SANTOLINA non viscosa, glauca & glabra, foliis inferioribus angustis & vermiculatis, cæteris Holochei aut Psyllii, capitulis maioribus aureis, flosculis erectis, ramulorum cacuminibus striatis. *An Santolina foliis Rorismarini, maior* Inft. R. H. 461. *An Abrotanum fumina viridis* C. B. Pin. 137. *Mor. Hist. Part. 3. pag. 12. num. 22. Seff. 6. Tab. 3. fig. 22.*

2. *Santolina viscosa glabra viridis*, foliis graveolentibus, imis vermiculatis, cæteris planis & ad latera cristatis, capitulis aureis maioribus, flosculis surrectis, ramulorum cacuminibus striatis. *Santolina foliis Ericæ vel Sabinae* Inft. R. H. 460. *Santolina foliis obscure virentibus, flore anro* Einsd. 461. *Vaill. Atl. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 412.*

3. *Santolina alpina humilis atrovirens tota glabra & ferme inodora*, foliis vermiculatis, capitulis maioribus albis, flosculorum tuba & vagina luteis

4. *Santolina Garganica glabra*, foliis obscure virentibus vermiculatis, caulibus canescentibus, capitulis maioribus albis, flosculorum tuba & vagina ochroleucis

5. *Santolina fruticosa erecta*, foliis vermiculatis, imis magis tomentosis & incanis, cæteris viridibus, & ferme glabris, capitulis maioribus luteis, flosculis reflexis. *Santolina flore maiore, foliis villosis & incanis* Inft. R. H. 460. *Pollii altera species maior* Col. Part. 1. 49

6. *Santolina foliis vermiculatis, primariis incanis tomentosis brevibus cum denticulis dense congestis, cæteris virentibus, capitulis mediæ magnitudinis luteis, floribus reflexis, cauliculis fummitatibus pilosis & striatis.* *An Santolina tomentosa crispa Hispanica* Vaill. *Atl. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 412. num. 5.*

7. *Santolina viscosa, foliis vermiculatis brevibus, imis viridibus vermiculis minus confertis, cum furculis canis & lanuginosis, cæteris vero pallide virentibus, capitulis luteis mediæ magnitudinis, flosculis reflexis.* *An Santolina subviridis, glutinosa* Vaill. *Atl. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 412. num. 6.* *Santolina foliis minus incanis* Inft. R. H. 461. *An Abrotanum fumina Hispanicum tenuifolium virens* Barr. *Obs. 91. num. 1020. Icon. 429.*

8. *Santolina foliis vermiculatis, primariis subincanis cum caulibus canescentibus, cæteris pallide virentibus, capitulis mediæ magnitudinis luteis, flosculis reflexis.*

9. *Eadem foliis superioribus viridibus, ramulis secundariis candidis & tomentosis*

10. San-

10. *Santolina* foliis vermicularis viridibus, caulibus canescentibus, capitulis mediæ magnitudinis luteis, flosculis reflexis

11. *Santolina* foliis vermicularis viridibus, caulibus novellis & secundariis incanis & tomentosis, capitulis sulphureis mediæ magnitudinis, flosculis reflexis. *An Santolina foliis obscure virescentibus flore sulphurei coloris* Inft. R. H. 461. *An Abrotanum fœmina ex viridis femine degener, flore sulphureo* Schol. Bot. Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 12. sub num. 22

12. *Santolina* foliis vermicularis, primariis simul cum caulibus incanis & tomentosis brevibus cum vermiculis dense congestis, secundariis viridibus, capitulis parvis luteis, flosculis admodum reflexis

13. *Santolina* foliis vermicularis subviridibus, vermiculis minus confertis, ramulis prælongis, primariis canescentibus, cæteris glabris, capitulis parvis luteis, flosculis nonnihil reflexis

14. *Santolina* foliis vermicularis brevibus, vermiculis minus confertis, imis subincanis, cæteris viridantibus, capitulis parvis, flosculis luteis reflexis, tuba aurea

15. *Santolina* erecta, ramis novellis confertioribus & brevioribus incanis & tomentosis, foliis vermicularis viridibus, vermiculis confertis, capitulis parvis luteis, flosculis non vel vix reflexis

16. *Santolina* parva repens, foliis vermicularis, imis incanis & tomentosis, cæteris subincanis, capitulis parvis luteis, flosculis semper erectis, calyce turbinato. *An Santolina repens, & canescens* Inft. R. H. 460. * *Santolina speciei Abrotanum fœmina in Officinis vocantur, & Crespolina vulgo*

SATVREIA lativa Inft. R. H. 197. * *Satnreia* Il. Matth. 762. *Santoreggia vulgo*

SAXIFRAGA verna annua humilior Inft. R. H. 252. * *Sedum tridactylites tellorum* C. B. *Paronychia altera* Dod.

SCABIOSA montana latifolia non laciniata rubra & prima Inft. R. H. 464

2. *Scabiosa latifolia*, an rubra non laciniata secunda Inft. R. H. 464

3. *Scabiosa folio integro hirsuto (capitulo rotundo)* Inft. R. H. 466. * *An Morsus Diaboli* Matth. 658 *Hæc & sequens usurpari possunt pro Succisa, & Morsu Diaboli* Offic.

4. *Eadem minor*, capitulo oblongo

5. *Scabiosa fruticans angustifolia alba* Inft. R. H. 464

6. *Scabiosa Fraxinellæ folio* Inft. R. H. 466

7. *Scabiosa peregrina (glabra) capitulo oblongo nigricante, odore Zibethi* Inft. R. H. 465

8. *Eadem hirsuta*

9. *Scabiosa perennis Italica peregrinæ similis, capitulo oblongo odore nigricante. An Scabiosa Lusitanica peregrina similis* Inft. R. H. 465

10. *Eadem capitulo rubro*

11. *Eadem capitulo albo*

12. *Scabiosa, an altissima annua, foliis Agrimoniz nonnihil similibus* Inft. R. H. 464

13. *Scabiosa maritima perennis minima tenuifolia laciniata subhirsuta, flore cæruleo, semine stellato* Michel. H. Pif. *Scabiosa maritima parva* Inft. R. H. 463

SCAN-

SCANDIX femine rostrato, vulgaris Inst. R. H. 326. * *Pettine di Vene-
re* Matth. 557. *Scandix vulgo Acicula Cefalp.* 290

SCIRPOCYPERVS maritimos altissimus, caule rigido pallide virente,
panícula ampliore sparsa, capitulis oblongis inter se distantibus ferrugineis
Michel. Nov. Plant. Gen. 47. num. 1. Tab. 31

2. *Scirpocyperus palustris*, caule molli atrovirente, panícula sparsa mino-
re, capitulis subrotundis pluribus simul iunctis Michel. Nov. Plant. Gen. 47

3. *Scirpocyperus maritimus humilis*, caule pallide virenti, panícula glome-
rata Michel. Nov. Plant. Gen. 47

SCIRPOIDES maritimum, capitulis non omnibus in pediculis insidentibus
foliis & scapo supra pauculam carinam ferentibus albicantem Michel.
Nov. Plant. Gen. 52

SCIRPVS Equiseti capitulo maiori Inst. R. H. 528

2. *Scirpus omnium micimus*, capitulo longiori Inst. R. H. 528

SCLAREA Inst. R. H. 179. * *Sclarea* Matth. 939. *Sclarea alius Scar-
leggia Cefalp.* 442. *Gallitricum Cam. Orvola Cefalp.*

2. *Sclarea maxima*, foliis amplissimis subrotundis rugosioribus, coma
purpurea odorata, floris labio inferiori albo, superiori subcaeruleo. *Sclarea Sy-
riaca flore albo* Inst. R. H. 179

3. *Sclarea Asphodeli radice* Inst. R. H. 179

4. *Sclarea Italica (longifolia)* maxima altius radicata, sanguineis maculis
(interdom) notata, flore ex caeruleo purpurascens Michel. H. Pis.

5. *Sclarea Italica praeterea*, flore albo parvo Michel. H. Pis. *Horminum syl-
vestre maius, flore albo, integris foliis* Barr. Icon. 187

6. *Sclarea*, quæ *Horminum Orientale*, *Betonice* folio acutissimo, flore
caeruleo Coroll. Inst. R. H. 10

7. *Sclarea*, quæ *Horminum Orientale*, *Betonice* folio acutissimo, coma
purpurascens Coroll. Inst. R. H. 10

8. *Sclarea pratensis*, foliis serratis, flore caeruleo Inst. R. H. 179. * *Gal-
litricum vulgo*, & *Sclarea sylvestris* appellata, ab aliis *Chiarella Cefalp.* 442

9. *Sclarea folio Salviae minor* sive glabra (floribus violaceis parvis) Inst.
R. H. 180

10. *Sclarea folio Salviae subtilissime dentato*

11. *Sclarea Italica pratensis*, foliis in profundas lacinias & crenas incisus,
flore caeruleo Michel. H. Pis.

12. *Eadem folio subrotundo ampliori, in rotundas lacinias inciso, ac aesti-
vo tempore viridi, brumali vero purpurascens*

13. *Sclarea Aethiops minor*, foliis brevioribus profunde incisus, flore caeruleo

14. *Sclarea minor angustifolia*, *Verbone* lacinias, flore caeruleo diluore.
Horminum Verbena lacinias, angustifolium Triumf. Obf. 66

SCOLYMVS Chrysanthemus perennis, folio venis lacteis simplicioribus &
vix apparentibus notato, caule albicante

2. *Idem foliis latis obscure virentibus, caule admodum alato, floribus ra-
rioribus*

3. *Idem foliis obscure virentibus altius lacinias, caule vix alato*

4. *Idem*

4. Idem spinosior, foliis obscure virentibus profunde laciniatis ac laetis venis & maculis notatis, floribus crebris

5. *Scolymus* foliis latis longioribus ac venis albis simpliciter notatis, caule albicante, flore aureo maiore & rariore, semine tribus dumtaxat aristis munito

SCORZONERA alpina angustifolia perennis, caule ramoso fistuloso, flore maiore suavepurpureo inodoro, semine striato laevi octo lineas longo

2. *Scorzonera latifolia sinuata* Inft. R. H. 476. *Scorzonera* Matth. 569. & *Casalp.* 518

3. *Scorzonera latifolia non sinuata*, semine aspero * *Scorzonera* Offic. ut & *superior*

SCROPHULARIA flore luteo Inft. R. H. 166

2. *Scrophularia scetida*, radice strumosa, foliis Vrticæ ad petiolum æqualibus. * *Scrophularia* Matth. 1188. *Scrophularia* & *Millemorbia* Offic. ut & *sequent*

3. Eadem foliis ad petiolum acutis

4. *Scrophularia* foliis Vrticæ nigricantibus altius incisif, incisuris dentatis, flore saturo rubro

5. *Scrophularia subhirsuta*, Vrticæ folio profunde dentato Michel. H. Pif.

6. *Scrophularia hirsuta*, Melissæ rugoso nigricante & altius dentato folio, ad petiolum Aristolochiæ Saracenicæ instar excavato, flore tres lineas longo, rubro, cum labello inferiori viridi, fructu pyramidato acuto. *An Scrophularia Melissæ folio* Inft. R. H. 166

7. *Scrophularia Teucrii* folio, glabra, flore parvo, superne saturorubro ad phœniceum tendente, labello inferiori viridi

8. *Scrophularia aquatica maior* (caule alato) Inft. R. H. 166. * *Betonica aquatica*, & *Scrophularia aquatica* Offic. ut & *sequent*

9. Eadem flore ochrolenco

10. *Scrophularia palustris non scetida seu aquatica minor* Inft. R. H. 166. * *Scrophularia famina* Cam.

11. *Scrophularia Hispanica*, Sambuci folio glabro Inft. R. H. 166

12. *Scrophularia maxima Lusitanica*, Sambuci folio lanugineoso Inft. R. H. 167

13. *Scrophularia Raphani* folio, flore maximo phœniceo, fructu habitiori peracuto

14. *Scrophularia*, an *Lusitanica* frutescens Verbenacæ foliis Inft. R. H. 167

15. *Scrophularia*, seu *Ruta canina maior*, Ambrosiæ folio, flore partim saturate purpureo partim albicante, fructu erassiore acuto. *An Sideritis* III. Matth. 1058. *Sideritis* III. Matthioli Lugd. 118. *Sideritis altera Diofcoridis Tabern. Icon.* 118

16. Eadem fructu crassiore rotundo. *Scrophularia affinis minor in montibus, foliis brevioribus, divisa ferme Ruta Casalp.* 350. *An Herba mora* Lugd. 1339

17. Eadem folio tenuiter diviso, racemis florum longioribus & magis sparsis, fructu rotundo exiguo. *An Scrophularia minor Ruta Canina dista.* Inft. R. H. 167

SECVRIDACA lutea maior Inft. R. H. 399

SE-

SEDVM maius arborefcens Infl. R. H. 262. * *Vn altro Semprevivo* Matth. 1179. *Sempervivum maioris alterum genus ex Sicilia Casalp.* 577

2. Sedum maius vulgare Infl. R. H. 262. * *Semprevivo maggiore* Matth. 1175. *Sempervivum maius Casalp.* 577. *Sedum & Sempervivum maius Offic. Sopravivolo & Semprevivo vulgo*

3. Sedum montanum tomentosum Infl. R. H. 262

4. Sedum Romanum pallide luteum, ramulis inflexis, maius (umbellis florum semper erectis) Michel. H. Pis.

5. Sedum alpinum minus teretifolium luteum non acre, umbellis & radiis florum semper erectis

6. Sedum minus luteum ramulis inflexis, foliis teretibus pallide virentibus, umbellis & radiis florum initio pendula deinde erectis

7. Idem foliis tenuioribus glaucis acutis & expansis

8. Idem foliis crassius acutis glaucis & expansis

9. Sedum parvum acre, flore luteo Infl. R. H. 263. * *An Semprevivo minimo* Matth. 1177. *Aizoon acre Cord. Vermicularis sive Illecebra Ger.*

10. Sedum minimum luteum non acre Infl. R. H. 263

11. Sedum minus teretifolium album Infl. R. H. 262. * *Semprevivo minore* Matth. 1179. *Vermicularis & Illecebra maior Lob. An Vermiculare An. Semprevivo Ric. Erba Pignuola & Pinocchiella vulgo*

12. Sedum montanum tetraphyllum floribus albis, foliis planis Michel. H. Pis.

13. Sedum echinatum vel stellatum, flore albo Infl. R. H. 263. * *Coryledon stellata C. B.*

14. Sedum minus, folio circinato Infl. R. H. 263

SENECIO minor vulgaris Infl. R. H. 456. * *Senecio* Matth. 1191. *Casalp.* 537. *Erigeron I. B. Senecio Offic.*

SERIPHIVM maritimum Italicum incanum, foliis Lavandulae, in furculis non floriferis partim integris partim multifidis, in floriferis vero integris, panicula surrecta contracta seu cupressina, capitula bilinearibus erectis invicem appressis. *Abfinthium maritimum, foliis superioribus in aliquot lacinias divisis C. B. Pin.* 139. *Infl. R. H.* 458. *Artemisia subincana, foliis inferioribus trifidis vel quinquedidis Bot. Par. in Alt. Ac. R. Sc. Ann.* 1739. pag. 375. n. 5. * *An Affenzo Marino* Matth. 725. *Abfinthium maritimum Offic.*

2. Idem foliis inferioribus multifidis, superioribus integris & ad Linnariam accedentibus. *Seriphium Lavandulae folio minus ramosum Zannich. lfl.* 135

3. Idem foliis ab imo ad medium lacinatis, in summis partibus vero integris & obscure mucronatis

4. Seriphium maritimum Italicum incanum, foliis multifidis, coma sparsa, capitulis cylindraceis bilinearibus nutantibus & inter se distantibus. *Seriphium Lavandulae folio Zannich. lfl. Tab.* 156

5. Idem montanum Italicum, foliis tenuissime divisis, capitulis angustioribus. *Abfinthii alterum genus in collibus argillofis agri Senensis, brevius, odoris & saporis minus ingrati Casalp.* 479. * *Abfinthium montanum Offic.*

SERPILLVM maius latifolium (glabrum, floribus albidis perexiguus) C. B. Pin. 220. *An Serpillo* Matth. 763. *An Serpillum Casalp.* 465. *Sermollino vulgo ut & sequentes*

2. Ser-

2. *Serpillum maius*, caulibus hirsutis, foliis Maioranæ glabris, floribus maiusculis purpurascens, staminibus longis
3. Idem foliis Maioranæ longioribus, caulibus subhirsutis, spica interrupta, floribus exiguis ex albo purpurascens, staminibus brevioribus
4. *Serpillum latifolium hirsutum*, floribus purpureis maioribus. *An Serpillum latifolium hirsutum* Inst. R. H. 197
5. *Serpillum glabrum*, foliis minoribus subrotundis, flore purpureo maiusculo
6. *Serpillum alpinum latifolium præcox* glabrum, foliis Maioranæ, floribus purpurascens exiguis, in spicam brevem & deorsum coactis, staminibus brevissimis
7. *Serpillum vulgare minus* Inst. R. H. 197. * *Vn altro Serpillo* Mattb. 764. *Serpillo* Ric. *Serpillum* Offic.
8. *Serpillum maritimum* glabrum, Hyssopi folio, ferme inodorum & quasi insipidum, flore maiusculo purpurascens

SHERARDIA Dill. Nov. Plant. Gen. in Suppl. Floræ Gif. 96. *Verbena* *Nodeflora* C. B. Prodr. 125

SIDERITIS; an Orientalis, Phlomisidis folio Coroll. Inst. R. H. 12

2. *Sideritis frutescens*, folio incano Olæ Boeth. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 172

3. *Sideritis vulgaris hirsuta erecta*, foliis oblongis, floribus albidis vel pallidis, eirea faucem & in inferiori labio maculis & punctulis sanguineis notatis. *An Sideritis vulgaris hirsuta erecta* C. B. Pin. 233. * *Tetrabis* Lugd. *Sideritis* *Heraclea* Cord. *Ferruminatrix* Lob.

4. *Sideritis vulgaris hirsuta*, foliis brevibus subrotundis

5. *Sideritis maritima procumbens*, folio angusto crenato, flore maiore albedo vel ochroleuco punctulis sanguineis notato

SILIQVA edulis Inst. R. H. 578. * *Siliqua* Mare. 70. *Casalp.* 110. *Silique* Mattb. 257. *Carrubio* Ric. *Siliqua dulcis* Alp. *Ceratia* Bellon. *Ceratonia* Dod.

SILIQVASTRUM Inst. R. H. 647. * *Siliqua sylvestris* *Casalp.* 111. *Arbor lutea* Bellon.

SINAPI Indicum maximum, Lactuæ folio Inst. R. H. 228

SISARVM Germanorum Inst. R. H. 309. * *Sisaro* Mattb. 470. *Sifer Germanicum* *Casalp.* 314

SISYMBRIUM aquaticum Inst. R. H. 226. * *Sifmbro aquatico* Mattb. 516. *Sisymbrium aquaticum vulgo Crescione* *Casalp.* 362. *Sisymbrium aquaticum* Offic.

2. *Sisymbrium palustre repens latifolium maius*, foliis inferioribus Erythralis instar lacinialis, cæteris integris, floribus luteis, siliquis brevissimis

3. *Sisymbrium aquaticum repens minus*, foliis in profundas lacioias divisis, sectionibus palehre dentatis, floribus luteis, siliqua brevi nonnihil incurva. *An Raphanus minimus repens luteus, foliis tenuiter divisis, seu Ra-*

pbanus minimus repens latear, Nasturtii vulgaris bortenſis facie Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 236. Sell. 3. Tab. 7. fig. 1

4. Idem foliis in profundas anguſtas & acutas lacinias diviſis. *An Raphanum aquaticum Tabern. Icon. 475. Rapiſtrum aquaticum Ger. Emac. 234 An Siſymbrio aquatico affinis prima Caſalp. 361*

5. Siſymbrium paluſtre minus, ſiliqua glabra Inſt. R. H. 226

6. Siſymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo, maius, ſiliquis expansis

7. Idem ſiliquis ad caulem ferme contractis

8. Siſymbrium Erucæ folio anguſtiori, in multos aſſiduos & non auritos lobos diviſo, floribus luteis, petalis obtuſis quatuor lineas longis ac decuſſatim poſitis, ſiliquis duas uncias cum dimidio longis craſſioribus & expansis. *Barbarea foliis minoribus & frequentius ſinuatis Raii Hiſt. Tom. 1. 809*

9. Siſymbrium, quod Sinapi aquaticum Patavinum l B. 2. 867

10. Siſymbrium annuum, Abſinthii minoris folio Inſt. R. H. 226. * *Acipitrina Caſalp. 361. Sophia Chirurgorum Dod.*

SISYRINCHIVM maritimum Apulum polyanthes

SIVM aquaticum ad alas floridum Inſt. R. H. 308

2. Sium (aquaticum) ad alas floridum, caule tenuiori, erectius & elatius Michel. H. Piſ.

3. Sium, ſive Apium paluſtre, foliis oblongis Inſt. R. H. 308. * *Sio vera Matth. 511. Laver, Creſcione vulgo, & Herba Cannella Caſalp. 300*

4. Sium arvenſe ſive ſegetum Inſt. R. H. 308

5. Sium aromaticum, Siſon Officinarum Inſt. R. H. 308. * *Siſone Ric. Anomum C. B.*

SMILAX ſarmentis aculeatis & non aculeatis, Ariſtolochiæ rotundæ folio plerumque lævi, flore ſubrubente H. Piſ.

1. Smilax folio haſtato longiſſimo maculato. * *Smilace aſpra Ric.*

2. Smilax aſpera, Thamni folio minus aculeato, fruſtu rotundo rubro H. Piſ.

4. Smilax ſpicata, Polygonati folio Inſt. R. H. 654

5. Smilax unifolia, humiſſima App. Inſt. R. H. 654. * *Vniſolium Dod.*

SMYRNIVM vulgare annuum, Angelicæ folio & facie, umbellis pallidis, primariis nudis, ſecundariis vero folioſis, ſemine craſſiore nigro. *Smyrnum Inſt. R. H. 316. * Smirnio Matth. 817. Oluſtrum, vulgo Macerone Caſalp. 303. Hippoſelinum Dod.*

2. Smyrnum Luſitanicum minus, Apii folio Inſt. R. H. 316

SOLANVM Officinarum acinis nigricantibus Inſt. R. H. 148. * *Solatro Hortolano con le bacche nere Matth. 1127. Solanum minus, fruſtu in maturitate nigro Caſalp. 213. Solatro Ric.*

2. Solanum Officinarum acinis puniceis Inſt. R. H. 148. * *Solatro Hortolano con le bacche verdiccie Matth. 1187*

3. Solanum Officinarum acinis e luteo viſcentibus Inſt. R. H. 148. * *Solanum minus fruſtu in maturitate flavo Caſalp. 213*

4. Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara Inſt. R. H. 149. * *Vite Salvatica Matth. 1345. Salicaſtrum Plinii Caſalp. 20*

5. Solanum pomiferum frutescens Africanum spinosum nigricans, flore Borraginis, foliis profunde laciniatis H. L. Bat. 572. * *Solanum spinosum perenne arborescent non descriptum* Donn. Cat. H. Flor.
6. Solanum flore purpurascens, foliis parvis integris, baccis perexiguis rubris
7. Solanum ruberosum, esulentum Inst. R. H. 149. * *Arachidna Theophrasti*, *Papas Peruanorum Clus.*
8. Solanum Guineense fructu magno instar Cerasi, nigerrimo, umbellato Boerh. Ind.
9. Solanum fruticosum bacciferum Inst. R. H. 149. * *Strychnodendros L.* *Pseudocapsicum* Dod.

SOLDANELLA alpina rotundifolia Inst. R. H. 82

SOLIDAGO palustris altissima, Salicis folio serrato & subens incano: *Virga Aurea*, sive *Solidagini angustifolia affinis*, *Lingua Asis Dalecampii* l. B. 2. 1063. *Lingua maior* Lugd. 1037. *Conyza maxima serratifolia* Tbat. Tab. III.

2. Eadem folio altius serrato, utrinque virente aut inferne dumtaxat subcinereo, & per basim auriculato. *An Consolida Palustris* Tabern. Icon. 555

SONCHVS laevis laciniatus latifolius Inst. R. H. 474. * *Soncho liscio* Matth. 526. *Cicerbita* Ric. & vulgo. *Sonchus laevis* Offic.

2. Sonchus asper laciniatus, folio Dentis Leonis Inst. R. H. 474. * *Soncho aspero* Matth. 525. *Sonchus alia in rudibus* Casalp. 511. *Sonchus aspera* Offic. *Cicerbita* vulgo

3. Sonchus asper non laciniatus Inst. R. H. 474. *Sonchus* quae vulgo *Cicerbita* vocatur, & alicubi *Crespinulus* Casalp. 511. *Linybus sylvestris*, seu *craticata* Offic.

4. Sonchus repens, multis Hieracium maius Inst. R. H. 474. * *An Hieracio maggiore* Matth. 808

5. Sonchus angustifolius maritimus Inst. R. H. 474

SONCHVS vide CREPIS

SORBVS sativa Inst. R. H. 630

2. Sorbus aucuparia Inst. R. H. 634. * *Sorbo salvatico* Matth. 283. *An Sorbus sylvestris in Alpibus* Casalp. 145. *Fraxinus Bubula* Dod. *Fraxinus aucuparia* Gesn.

SPHONDYLIVM, an maius, sive Panax Heracleum quibusdam Inst. R. H. 320. * *An Panace Heracleo* Matth. 783. *An Panax Herculeum vulgo a nostris Panacea* Casalp. 311. *Panace Herculeo di Dioscoride* Ric.

SPIRAEA Hyperici folio non crenato Inst. R. H. 618

STACHYS maior Italica, foliis amplioribus undulatis

2. Stachys maior, Germanica Inst. R. H. 186. * *Stachi falso* Matth. 878. *An Salvia sylvestris a quibusdam Matrisalvia appellata* Casalp. 441

3. Stachys, an alba latifolia maior Barr. Obf. 26. n. 243. Icon. 297. *Stachys Cretica latifolia* Inst. R. H. 186. & *Voyag. du Levant. Tom. I. 11. Tab. 1*

M 2

4. Sta-

4. *Stachys maior latifolia*, flore variegato, verticillis spinosis crassis & rarius dispositis
5. *Stachys maior Italica*, spica florum tenuissima, flore purpureo variegato, calyculis non pungentibus
6. *Stachys maior*, Salviz folio pyramidato flore dilute purpureo variegato
7. *Stachys minor Italica* Inft. R. H. 186. * *Stachi Matth.* 877
8. *Stachys alba angustifolia* Salviz folio Barr. Icon. 279
9. *Stachys incana*, Salviz folio, floribus luteis, punctis purpureis notatis
10. *Stachys alpina omnium maxima*, Viburni folio, flore dilute purpureo variegato
11. *Stachys*, quæ *Galeopsis montana*, *Betonice* folio angustiore, flore variegato Michel. H. Pf.

STAPHYLODENDRON Inft. R. H. 616. * *Staphilodendro* Matth. 295.
Staphylodendron Casalp. 120. *Nux Vesicaria* Trag.

STATICE Inft. R. H. 341

STOECHAS purpurea Inft. R. H. 201. * *Stecha* Matth. 736. *Spica Italica* genus *sylvestre* *Stichados* vulgo vocatum *Casalp.* 459. *Stachas Arabica*, & *Stichas* Offic.

STRAMONIVM fructu spinoso oblongo, flore albo Inft. R. H. 119. * *Solanum somniferum* Bellon. *Solanum Manicum* Col. *Datura Turcarum* Eyz.
2. *Stramonium Ægyptiacum*, flore pleno intus albo foris violaceo Inft. R. H. 119
3. *Stramonium ferox* Inft. R. H. 119

STYRAX folio Mali Cotonei Inft. R. H. 598. * *Stirace* Matth. 100. *Arbore simile al Melo Cotogno, del quale è Gomma lo Storace Calamita Ric.* 68

SVBER latifolium perpetuo virens Inft. R. H. 584. * *Phellos* Dod. *Sughero vulgo*
2. *Suber* perpetuo virens, cortice tenuiori, Cerri folio, glande maiore cylindracea obrufa, cupula crinica H. Pf. * *Phellodrys* C. B. *Cetrofughero vulgo*

SYLIBVM albis maculis notatum, flore purpureo Vaill. in A& Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 219. num. 1. * *Cardo Santa Maria*. *Herba del Lasse* Matth. 702. *Cardus sylvestris aliud genus* Lac Diva Maria appellatum *Casalp.* 527
2. *Sylibum* non maculatum, flore purpureo Vaill. in A& Ac. R. Sc. An. 1718. pag. 219. num. 2

SYMPHYTVM *Consolida maior*, flore purpureo, quæ mas Inft. R. H. 138. * *Consolida maggiore da fiori porporci* Matth. 1012. *Consolida Casalp.* 434. *An Consolida maggiore Ric.*
2. *Symphytum* *Consolida maior*, flore variegato Inft. R. H. 138
3. *Symphytum* *Consolida maior*, flore albo vel pallide luto, quæ formi-na Inft. R. H. 138. * *An Consolida maggiore da fiori gialli, e bianchi* Matth. 1012

4. Sym-

4. Symphytum maius, tuberosa radice Inst. R. H. 138. * *An Consolida al-
tera minor Casalp.* 435. *Consolida Ric. Consolida tuberosa vel nodosa. Sym-
phytum tuberosum Offic. ut, & sequens*

5. Symphytum, an minus, tuberosa radice Inst. R. H. 138

6. Symphytum Echii folio angustiore, radice rubra, flore luteo Inst. R. H. 138

SYRINGA alba, sive Philadelphus Athenæ Inst. R. H. 617. * *Siringa
Casalp.* 95. *Salindia vulgo*



AMARISCVS Germanica Inst. R. H. 661

2. Tamariscus Narbonensis Inst. R. H. 661. * *Myrica Ca-
sulp.* 126. *Tamarix. Tamariscus Offic. Tamerigia vulgo*

TAMNVS racemosa, flore minore luteopalescente Inst. R. H. 103. * *An Vite nera Matth.* 1348. *An Tamarum vulgo, aliis Cerafiola
Casalp.* 206. *Bryonia nigra Offic.*

TANACETVM vulgare luteum Inst. R. H. 461. * *Tanacetum Matth.
958 Tanacetum Casalp.* 479. *Athanasia Lac. Artemisia Dioscoridis Tab. Ta-
nacetum Offic.*

2. Tanacetum foliis crispis Inst. R. H. 461

3. Idem maius

TANACETVM vide BALSAMITA

TAXVS florifera, & non fructifera H. Pif. * *Taxus vulgo Naffus voca-
ta, flosculor amentaceos ferent interfolia sine fructu Casalp.* 134. *Smilax ar-
bor Cam. Albero della morte & Naffo vulgo*

TELEPHIOIDES Græca humifusa, flore albo Coroll. Inst. R. H. 50

TEREBINTHVS vulgaris Inst. R. H. 579. * *Terebinto Matth.* 125. *An
Terebintbus Casalp.* 78

2. Terebintbus Indica Theophrasti, Pistacia Dioscoridis Inst. R. H. 580.
Pistacchi Matth. 294. *Pistacchio vulgo*

TEVCRIVM lupinum perenne palustre Apulum glabrum, foliis lacinia-
tis, flore albo Michel. H. Pif. Tab. 49. fig. 1

THALICTRVM maius, filiqua angulosa aut striata Inst. R. H. 270.
* *Ruta sylvestris altera humilior Casalp.* 371. *Saxifraga lutea, & Ruta pra-
tensis Gels.*

2. Thalictrum maius flavum, staminibus luteis, vel glauco folio Inst. R. H. 270

3. Thalictrum minus, Adianti folio, floribus pendulis, staminibus glaucis,
seminibus crassioribus bulneararibus striatis

4. Tha-

4. *Thalictrum alpinum* præcox, caule purpurascente, foliis Aquilegiæ, flaminulis florum albis cum apicibus citrinis, fructu trilatere acuto quinquelineari

5. Idem flaminulis florum purpurascencibus, fructu dense collecto

6. Idem ferocinum, caule subpurpureo, foliis atroviridibus minoribus & quasi complicatis, apicibus pallidis

7. Idem caule viridi, Aquilegiæ foliis minoribus quasi complicatis, flaminulis florum purpurascencibus, apicibus subpallidis, fructu obtuso femunciali

8. Idem ferocinum foliis minoribus, apicibus subluteis, fructu obtuso femunciali

9. Idem humile, foliis minoribus & rotundioribus ac parum incis, fructu habitiori femunciali

10. Idem humile, caule viridi, foliis rotundioribus rugosis, floribus purpurascencibus, apicibus citrinis, fructu brevi obtuso, pediculo longo appenso

THAPSIA sive Turbith Garganicum, semine lacillimo Infl. R. H. 322.

* Turpetum ex Gargano Apulia Monte de Thapsia radicibus concinnatum Garz.

2. Thapsia montana omnium maxima, foliis lobatis (umbellis luteis) Michel. H. Pif.

THLASPI alpinum fruticosum sempervirens, foliis carnosissimis sesquianciam longis & duas latas, floribus albis, petalis latiusculis inæqualibus. *Thlaspi Alpinum fruticosum sempervirens album, foliis angustioribus carnosissimis* Michel. H. Pif.

2. Thlaspi fruticosum sempervirens, foliis biuncialibus lineam latis, floribus albis spicatis, petalis angustis inæqualibus. *An Thlaspi e Racufa non descriptum* Donu. Cat. Plant. H. Flor. 64

3. Thlaspi Creticum quibusdam, flore rubente & albo Infl. R. H. 213.

* Thlaspi IIII. Matth. 600. Thlaspi Creticum Casalp. 367

4. Thlaspi arvense filiquis latis Infl. R. H. 212. * Thlaspi II. Matth. 598. Thlaspi Casalp. 366. Thlaspi Ric. 69

THLASPIDIVM fruticosum, Leucoli folio, semperflorens Infl. R. H. 214

2. Thlaspidium Apulum spicatum Infl. R. H. 215

THYMBRA altera vulgaris, radicibus tenuibus sparsis H. Pif. * *Saffragia vera di Dioscoride* Matth. 1028

THYMELAEA Lauri folio, sempervirens, sive Laureola mas Infl. R. H. 595. * Laureola & Mezereon Arabum Offic.

THYMVS vulgaris, folio tenuiore Infl. R. H. 196. * *An Pepolina ab aliis Piperella* Casalp. 466. Thymo Ric. 69

2. Thymus vulgaris subincanus, foliis lanceolatis, floribus subpurpureis

3. Thymus vulgaris, repens vel supinus, vix aut nequaquam incanus, Serpilli folio angusto, floribus purpurascencibus. *An Thymus supinus candicans odoratus* Infl. R. H. 196

4. Thymus virens, odore Hirci, Italicus Barr. Obf. 29

TILIA femina folio maiore Infl. R. H. 611. * *Tilia Marc.* 58. *Tilia*, femina Matth. 191. *Tilia femina* Cæsalp. 41. *Tilia* Offic. Tiglia vulgo
2. *Tilia* femina folio minore Infl. R. H. 611

TINVS prior Infl. R. H. 607

1. *Tinus* alter Infl. R. H. 607

3. *Tinus* tertius Infl. R. H. 607

4. *Tinus* live *Laurus sylvestris*, femine rotundo H. Pis. * *Laurus sylvestris* Offic. ut, & *superiores* & *Lentaggine vulgo*

TITHYMALVS Glvaticus, lunato flore Infl. R. H. 85

2. *Tithymalus caracas* Cæsalp. 373

3. *Tithymalus latifolius*, *Cataputia dictus* Infl. R. H. 86. * *Latbiri Matth.* 1321. *Cataputia* Cæsalp. 377. *Catapucia*, & *Latbiris* Offic.

4. *Tithymalus palustris fruticosus* Infl. R. H. 87. * *Tithymalus palustris* Cæsalp. 374. *Efula maior* Offic.

5. *Tithymalus myrsinites latifolius* Infl. R. H. 86. * *Tithymalo Mirfinite* Matth. 1312. *Tithymalus Myrsinites* Cæsalp. 376

6. *Tithymalus* live *Efula exigua* Infl. R. H. 86. * *Tithymalo leptifillo* Matth. 1317

7. *Tithymalus montanus*, non acris Infl. R. H. 85

8. *Tithymalus cyparissias maior*. * *Hac*, & *duæ sequentes Tithymali species usurpari promiscue possunt pro Efula minore*, & *Tithymalo Cyparissia Ric.*

9. *Tithymalus cyparissias* Infl. R. H. 86. * *Tithymalus Efula in Officinis vocatus* Cæsalp. 374

10. *Tithymalus cyparissias* Matth. 1315

11. *Tithymalus palustris repens*, *Salicis folio*, caule punctis sanguineis notato H. Pis.

12. *Tithymalus repens*, folio *Efulæ minoris Dodonæi*, glauco tamen, & elatior Lel. Triumf. ap. fratr. 65

13. *Tithymalus repens elatior*, *Salicis* aut *Olezæ folio* glauco, umbella amplissima, fructu ad angulos verrucoso

14. *Tithymalus arboreus altissimus*, folio *Salicis*, caulibus rubescentibus Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Parc. 1. 255. * *Tithymalus arboreus* Cæsalp. 376

15. *Tithymalus*, an folio longa glauco, caule rubente, feminibus verrucosis Raii Syll. 249

16. *Tithymalus nemorosus*, acutiori folio, dulcis Barr. Obs. numer. 24. Icon. 834

17. *Tithymalus faxatilis*, glauco folio, umbella lutea, altius radicans

18. *Tithymalus maritimus*, glauco folio. * *Tithymalo Parasio* Matth. 1313. An *Maritimus Tithymalus* Cæsalp. 375

19. *Tithymalus arboreus linifolius* Infl. R. H. 87

20. *Tithymalus Lini folio*, maior, *Italicus* Barr. Icon. 821

21. *Tithymalus (annuus)* argenteus maritimus leptophyllus Lel. Triumf. ap. fratr. 65

22. *Tithymalus Helioscopius* Infl. R. H. 87. * *Tithymalo Helioscopio* Matth. 1314. *Tithymalus Helioscopius* Cæsalp. 378

23. *Tithymalus rotundis foliis non crenatis* Infl. R. H. 87. * *Peplio* Matth. 1322. *Peplus* Cæsalp. 378. *Efula rotunda* Ric.

24. Ti-

24. *Tithymalus exiguus glaber*, Nummulariz folio Inst. R. H. 87. * *Chamaesyce* Offic. ut & sequens

25. *Tithymalus exiguus villosus*, Nummulariz folio Inst. R. H. 87

TORDILIVM *Italicum*, minus Michel. H. Pif. *Seseli Creticum maius* C. B. Pin. 161

TORMENTILLA maior erecta, foliis altius crenatis. An *Tormentilla sylvestris* Inst. R. H. 398. * *Tormentilla* Matth. 998. & Ric. Hac, & sequentes promiscue usurpantur pro *Tormentilla*, & *Heptaphyllo* Offic.

2. *Tormentilla minor procumbens*, foliis laxiter crenatis

3. *Eadem gracilior*, foliis angustioribus

TOXICODENDRON triphyllon glabrum Inst. R. H. 610. * *Hedera trifolia Canadensis* Corn.

TRACHELIVM azureum umbelliferum Inst. R. H. 170

TRAGOPOGON pratense luteum maius Inst. R. H. 477. * *Tragopogon* Matth. 567. *Tragopogon vulgo* *Saxifraga* *Cesalp.* 517

TRAGOSELINVM maius, umbella candida Inst. R. H. 309. *Pimpinella saxifraga* Matth. 1086. *Saxifraga Hircina* maior I. B.

2. *Tragoselinum minus subhirsutum*, foliis Apii tantum circa radicem, caule nudo altiori & ramosiori, umbellis albis primariis & secundariis non foliosis, semine candicante

3. *Tragoselinum minus foliis inferioribus Sanguisorbæ, cæteris Millefolii, umbella alba*

4. *Idem foliis superioribus Oenanthes, umbella nuda, semine glabro*

TRIBVLVS terrestris, Ciceris folio, seminum integumento aculeato Inst. R. H. 266. *Tribolet terrestre* Matth. 1026.

TRIFOLIASTRVM pratense corymbiferum maius repens, folio subrotundo duabus falcatis maculis insignito, quarum maior albida altera ferruginea, capitulis suave rubentibus, siliquis

2. *Trifolium pratense corymbiferum repens minus, folio subrotundo macula alba sagittata minima, siliquis tetraspermis* Michel. Nov. Plant. Gen. 27. num. 11

3. *Trifolium pratense annuum corymbiferum album & procumbens, folio cordato subtus atroviresente splendente, siliqua tetrasperma inferne falcatim discriminata* Michel. Nov. Plant. Gen. 27. Ord. 2. n. 2. Tab. 25. fig. 6

4. *Trifolium pratense arvense sive Lupulinum minus, folio cordato, partim supinum partim erectum, capitulis florum crassioribus initio e luteo virescentibus postea albicantibus & tandem fulvis, pediculis semiuncialibus & uncialibus insidentibus, siliqua compressa monosperma* Michel. Nov. Plant. Gen. 29. Ord. 6. n. 5

TRIFOLIUM bitumen redolens Inst. R. H. 44. * *Trifoglio Asphaltite* Matth. 882. *Trifolium bituminosum* *Cesalp.* 242. Hoc, & sequens *Trifolium* promiscue in Officiis vocantur *Trifolium Asphaltite, seu Bituminosum*

2. Tri.

2. *Trifolium bitumen redolens, angustifolium* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bar. Part. 2. 32.
3. *Trifolium pratense (præcox) flore monopetalo* Inst. R. H. 404. * *Hæc, & sequens Trifolii pratensis species promiscue in Officiis usurpantur pro Trifolio vulgari, & vulgo Trifoglio vocantur.*
4. *Trifolium pratense (ferotinum) flore monopetalo* Inst. R. H. 404.
5. *Trifolium pratense hirsutum maius (foliis oblongis retusis & nonnihil abscissis) flore (monopetalo) albosulphureo seu ochroleuco* Raii Synops. Ed. 2. 193. & Ed. 3. 328. num. 3.
6. *Trifolium montanum, spica longissima rubente* Inst. R. H. 405. * *Cystisus Trag. Pet. Miloi Pandellarii.*
7. *Trifolium montanum purpureum maius* Inst. R. H. 404.
8. *Trifolium montanum, foliis oblongis ad margines pilosis.*
9. *Trifolium Fragiferum nostras purpureum folio oblongo* Inst. R. H. 406.
10. *Trifolium arvense humile spicatum, live Lagopus* Inst. R. H. 405.

TVLIPA præcox lutea Inst. R. H. 373. * *Hæc Tulipa species Lilionarcissus quibusdam vocantur.*

2. *Tulipa præcox rubra* Inst. R. H. 373. * *Narcisso V. Matth. 1305.*
3. *Tulipa præcox alba* Inst. R. H. 373.
4. *Tulipa minor lutea Italica* Inst. R. H. 376. * *Lonchitis Casalp. 412.*
5. *Tulipa variegata Persica* Inst. R. H. 376.

TVRRITIS Inst. R. H. 223. * *An Accipitrina quadam cauculo simplicis*

1. *Turritis Lob. Turrita Clus. Vaccaria Tabern.*
2. *Turritis foliis inferioribus Cicboriaceis, cæteris Perfoliatis* Inst. R. H. 224.
3. *Turritis vulgaris ramosa* Inst. R. H. 224. * *Pilosella filiquata Thal.*

TVSSILAGO vulgaris Inst. R. H. 487. * *Tossilagine Matth. 893. Tussilago, quæ vulgo Farfara, ab alijs Vngula Caballina vocatur* Casalp. 490 *Becbium, Vngula Caballina, Ladluca Vjularia, & Tussilago Offic.*



- VALERIANA hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis Inst. R. H. 132. * *Valeriana Marc. 12. Phu maggiore Matth. 43. Valeriana Casalp. 48. Phu verum, vel maius. Valeriana optima. Carpesium Offic. Valeriana Domestica, o maggiore Ric.*
2. *Valeriana silvestris maior* Inst. R. H. 132. * *Phu minore Matth. 44. Valeriana silvestris Casalp. 148. Hæc, & sequens promiscue usurpantur pro Valeriana silvestri, seu minore Offic. & Valeriana salvatica e minore Ric.*
 3. *Eadem foliis angustioribus, floribus prorsus albis.*
 4. *Valeriana alpina prima* Inst. R. H. 131. * *An Valeriana inodora Casalp. 150?*
 5. *Valeriana rubra* Inst. R. H. 131. * *Valeriana tertia inodora Casalp. 150. Beben rubrum Offic.*

6. *Valeriana alpina* Nardo Celticæ similis Inft. R. H. 131.

VERATRUM foliis glabris, caule simplici virefcente, floribus parvis atropurpureis in spicis hinc inde ad caulem dispositis. *An Veratrum flore, atrorubente* Inft. R. H. 273. *An Ellebori albi alterum genus* Cæfalp. 580?

2. *Veratrum* flore subviridi Inft. R. H. 273. * *Elleboro bianco* Matth. 1274.
- & *Ric. Elleborus albus* Cæfalp. 580. *Veratrum album*, & *Elleborus albus* Offic.
3. *Veratrum alpioum* parvum præcox.

VERBASCUM tomentosum ramosum latifolium maximum, & minus incanum, foliis serratis (per basim laciatis) caule non alato, flore luteo magon Michel. H. Pis.

2. *Verbascum mas* (annuum tomentosum) latifolium loteum (caule alato, foliis non serratis, flore parvo) Inft. R. H. 146. * *Verbafco primo* Matth. 1202. *Verbafcum. Taffus barbatus* Offic. Taffo Barbalfo Matth. 1206.
3. *Verbascum nigrum* latifolium annuum, pulvisculo candidissimo undique obductum (caule rotundo) flore luteo parvo, staminulis croceis lanugine alba præditis Michel. H. Pis. * *An Verbafco Lichnide* Matth. 1206.
4. *Verbascum montanum* annuum tomentosum lutescens, caule non alato, foliis non serratis, spica compacta, floribus parvis luteis, staminulis & lanugine cincolore, apicibus croceis. *Verbafcum montanum tomentosum luteum, unica florum spica densissima* H. Pis. Tab. 50. fig. 1
5. *Verbascum nigrum* perenne, foliis cubitali crenato, caule non alato, flore luteo parvo, staminulis concoloribus, & lanugine alba (purpurafcente potius) præditis Michel. H. Pis.
6. *Verbascum maritimum* perenne incanum & tomentosum, caule rotundo simplici, foliis angustis serratis, flore luteo parvo, staminulis cum lanugine purpurafcente.
7. *Verbascum* perenne glabrum, angusto & viridi subtus incano folio (caule non alato) flore luteo parvo, staminulis croceis & lanugine alba cæcis Michel. H. Pis.
8. *Verbascum* annuum præaltum, *Mandragora* folio læviter serrato inferne subincano, caule præalto ramoso & striato, floribus parvis albis, staminulis & lanugine concolore, apicibus croceis. *An Verbafcum Lycnitis flore albo parvo* Inft. R. H. 147.
9. *Verbascum nigrum*, folio *Papaveris* coriiculati Inft. R. H. 147. * *Vn altro Verbafco* Matth. 1207.

VERBENA communis cæruleo flore (foliis dissectis) Inft. R. H. 200. * *Verbena Cæfalp. 450. * Hac, & sequens promiscue usurpantur pro Verbena, Herba Sacra, Microbotane, Herba S. Iohannis, & Berbera.*

2. Eadem foliis non, vel parum dissectis * *Verbenaca* Matth. 1207.
3. *Verbeoa Vrticæfolia* Canadeosis Inft. R. H. 200.
4. *Verbeoa Vrticæfolia* Canadeosis, foliis incis, flore maiore Inft. R. H. 200.

VERONICA minor (frutescens, caule rotundo) foliis imis rotundioribus (superioribus oblongis & acuminatis, floribus purpureis vel saturate cæruleis) Inft. R. H. 144. * *Tenerium pratense Chamædryoides* Lob.

2. Eadem foliis profunde & eleganter incis, floribus amœne cæruleis.
3. Ve-

3. *Veronica mas supina* & vulgarissima Inst. R. H. 143. * *Veronica Maschio* Matth. 730. *Veronica mas* Offic.
4. *Veronica minor angustifolia* ramosior & procumbens Inst. R. H. 144
5. *Veronica maxima* Inst. R. H. 144
6. *Veronica*, an *pratensis* serpillifolia Inst. R. H. 144
7. *Veronica alpina* glabra, rotundo Alifines *Plantaginis folio* Bocc. Mus. Part. 2. 18. Tab. 7
8. *Veronica aquatica minor*, folio subrotundo Inst. R. H. 145. * *Becabunga*, *Anagallis aquatica*, *Veronica aquatica* Offic.
9. *Veronica spicata* purpurea erecta ramosa hirsuta & subincana (foliis brevibus leviter & rotunde crenatis, floribus compactis) Michel. H. Pis. *Auricula muris quarta in Pratis Casalp.* 336
10. *Veronica spicata* subhirsuta erecta, foliis acutis, rarioribus crenis incisis, floribus caeruleis parvis non compactis
11. *Veronica spicata* erecta ferme glabra, foliis rarius dentatis, floribus majusculis rarius dispositis
12. *Veronica spicata* ferme glabra, foliis imis rotundioribus serratis, ceteris angustis & a medio ad summum leviter crenatis, floribus caeruleis rarius dispositis
13. *Veronica spicata* erecta angustifolia
14. *Veronica minima*, *Clinopodii minoris folio*, glabra Romana Inst. R. H. 144

VIBURNUM Inst. R. H. 607. * *Viburno* Matth. 235. *Lantana Casalp.* 76

- VICIA* maxima dumetorum Inst. R. H. 397
2. *Vicia multiflora* *Castubica frutescens*, *Lentis siliqua* Breyn. Prodr. I. 45
 3. *Vicia*, an *sylvestris multiflora maxima* Raii Hist. 913
 4. *Vicia annua* glabra, foliis latis ex rotunditate acuminatis, floribus pallidis amplioribus ad singulos nodos quaternis, siliquis fuscis glabris, semine parvo variegato subamaro
 5. *Vicia supina*, laeissimo folio non serrato Inst. R. H. 397. * *Fava saluatica* Matth. 446

- VIOLA* maritima foliis nitidis, flore pleno purpureo. An *Viola Martia*, *multiplici flore purpureo* Inst. R. H. 419. *Viola Mammola doppia vulgo*
2. *Viola maritima purpurea*, flore simplici odore Inst. R. H. 419. * *Viola porpuree* Matth. 1239. *Viola purpurea vulgo Mammola Casalp.* 391. *Viola*, & *Vivivole Mammole Ric. Viola & Viola purpurea*, Offic. *Viola Mammola vulgo*
 3. *Viola maritima inodora* *silvestris*, an foliis maioribus & rotundioribus Inst. R. H. 419
 4. *Viola maritima alba* Inst. R. H. 419. * *Viola purpurea vulgo Mammola candida Casalp.* 393
 5. *Viola alpina rotundifolia lutea* Inst. R. H. 420
 6. *Viola maritima silvestris caulifera*, foliis mucronatis, flore violaceo inodora
 7. *Viola maritima glabra*, foliis mucronatis, vicularis longis, flore dilute caeruleo inodoro
 8. *Viola maritima arborefcens purpurea* Inst. R. H. 420
 9. *Viola arvensis annua erecta fruticosa*, foliis crenatis, imis rotundioribus, ceteris longis & angustis, omnibus per basim pulchre auriculatis, flore minimo tricolore * *Suocera* e *Nuora vulgo ut & sequentes*

10. Eadem flore albo, & luteo
11. Eadem flore luteo, & caeruleo
12. Eadem flore luteo
13. Eadem flore albo

VIRGA AVREA vulgaris latifolia Inst. R. H. 484. * *Virga Aurea* *Casalp.* 503. *Virga aurea* *Offic.*

2. Virga Aurea, foliis longioribus serratis subhirsutis & nonnihil crispis, floribus luteis, semisfoliis plerumque septenis perangustis & utrinque acuminatis

3. Virga Aurea, foliis minoribus serratis glabris & non crispis, floribus luteis, semisfoliis plerumque quinis obtusis & tricuspidatis. *An Virga aurea latifolia ferrata* *Zamichb. Tab.* 271

4. Virga aurea foliis Laurininis asperis & non serratis, semisfoliis obtusis & tricuspidatis

5. Virga aurea Canadensis hirsuta, panicula minus speciosa Inst. R. H. 484

6. Virga aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita Inst. R. H. 484

7. Virga aurea maior, foliis glutinosis, & graveolentibus Inst. R. H. 484

* *Coryza mai* *Tropaeasti*, maior *Dischoridis* C. B. Cespita & Cespita vulgo

8. Virga aurea angustifolia, minus serrata, flore albo Inst. R. H. 484

9. Virga aurea Virginiana annua Inst. R. H. 484

VITEX foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis (non serratis) Inst. R. H. 603. * *Vitice* *Matth.* 214. *Vitex* vulgo *Agnus Castus* *Casalp.* 128. *Agno*, & *Agno Casto* *Ric.* *Agnus castus* *Offic.*

VITIS quinquefolia Canadensis scandens Inst. R. H. 613

VLMARIA Inst. R. H. 265. * *Regina Prati* *Dod.* *Vlmaria* *Offic.*

VRTICA maior vulgaris urens perennis, foliis angustioribus. *Vrtica* maior *Fuchs. Hist.* 107. *Dod. Gall.* 98. *Brunf. Yam.* 1. pag. 151. *Vrtica vulgaris* maior *L. B.* 3. 445

2. Eadem foliis amplioribus. *Ortica* *II. Matth.* 1184 *An Vrtica vulgaris* urens *L. Trag.* 2. *Vrtica sylvestris* *apertior* *Tabern. Icon.* 534. *Vrtica* urens altera *Dod. Pempt.* 151. *Vrtica* urens *Ger. Emac.* 706. *Vrtica media sylvestris* *Park Theatr.* 441. * *Vrtica* *Offic.* ut, & superior

3. *Vrtica peregrina* perennis non urens, amplo *Coryli* folio, racemis florum magis sparsis, semine cordato. *An Vrtica racemosa Americana*, amplo *Coryli* folio Inst. R. H. 535. *An Vrtica maxima racemosa Canadensis* *Eiusdem* *libd.*

4. *Vrtica* annua minor magis urens, foliis subrotundis, racemis florum longissimis purpurascens, feminalibus vero brevibus & viridibus. *Vrtica* minor annua magis urens, foliis subrotundis, floribus purpurascens *H. Pis.* *Vrtica* tertia, foliis purpurascens *Casalp.* 157. *An Vrtica in eodem caule racemulis floriferis, & fructiferis* *Raii* *Meib. Plant.* 19

5. Eadem racemis florum viridibus. *Vrtica* minor annua magis urens, foliis subrotundis, floribus subviridibus *H. Pis.*

6. Eadem minus urens, foliis altius & eleganter incisus & fere splendidibus, racemis florum purpureis

7. *Vrtica minor annua urens* (vicidis) foliis subrotundis, fructifera & non florifera H. Pif. *Vrtica urens minor* C. B. Pin. 232. *Vrtica minor annua* I. B. 3. 449. *Vrtica minor acrior* Lob. Icon. 522. *Vrtica urens minor* Dod. Pempt. 152. *Vrtica* 3. Matth. 1185. *An Vrtica quarta flosculis candicantibus* Casalp. 157

8. Eadem rubra, foliis simpliciter dentatis, spicis brevissimis. *Vrtica* III. Matth. 1185. Lugd. 1244. C. B. in Matth. 790. *Vrtica minor acrior* Lob. Icon. 522. *Vrtica urens minima* Dod. Pempt. 152

9. Eadem foliis oblongis. *Vrtica minor* Park Theatr. 441

10. *Vrtica Florentina annua* ucens minor & eleganter (foliis oblongis parvis, altius & simpliciter dentatis, spicis brevibus florem fructumque simul fecentibus) Michel. H. Pif. *Vrtica minor* Brunf. Tom. 1. 154

VVLNERARIA pentaphyllos Inst. R. H. 391. * *Trifolium Halicabum* sive *vesicarium* I. B.



ANTHIVM album, fructu crassiori creberrimis spinis in apice hamatis munito. *Xanthium* Inst. R. H. 439. * *Xanthio* ovocero *Lappa minore* Matth. 1263. Hac, & subsequens *Xanthii* species promiscue usurpantur pro *Xanthio*, *Lappa minore*, *Bardana minore*, & *Strumarina* Offic.

2. Idem rubrum, fructu angustiori rarioribus spinis in apice hamatis munito.

3. *Xanthium Canadense* maius, fructu aculeis aduocis munito Inst. R. H. 439

4. *Xanthium Lusitanicum* facioiatum, validissimis aculeis munitum Inst. R. H. 439

5. *Xanthium Creticum* praealtum, fructu subrotundo validioribus aculeis munito D. Sessler

XIPHION angustifolium violaceum Inst. R. H. 364. * *Iris Bulbosa* C. B.



VCA foliis Aloes C. B. Pin. 91

2. *Yucca Indica* arborea, radice non tuberosa, foliis Aloes rigidis serratis & acroventibus, floribus albis

* *Ad duodecim* quandoque *spithamarum* altitudinem assurgit hac *Yucca* biemis rigoribus inuilla. Caudex spithamam crassus ab imo ad medium usque levis est, superne vero scaber & foliorum marcidiorum reliquiis muricatus. Summitas in plura capita diuiditur, quorum unumquodque densa stipatur congerie foliorum (fig. 1.) robustiorum ac crassiorum quam *Yucca* foliis Aloes C. B. Pin. saturatius virentium, marginibus dense minutis.

nutissimeque ferratis, & in oblongum ac validum aculeum abeuntiam. Ex borum foliorum sinu quotannis erumpit elegans spica ramosa floribus (fig. 2.) cernuis onusta, structura, odore, & colore floribus supradictæ *Yuccæ* foliis *Aloes* similibus, magis tamen carnesis ac sectionibus nonnihil angustioribus. Pistillus singulorum florum, sive embryo, abis in fructum (fig. 3.) per maturitatem nigropurpureum, propendens, fructibus *Aloes* Americanæ a *Thobias* Aldino in Horto Farnesiano depictis pag. 96. similem, sed per omnia quadruplo maiorem. Tribus hic latis laminis nullus videtur, quæ marginibus foliaceis non congruentibus sulcos tres latus constituunt, adeo ut fructus sex veluti alii & tribus sulcis per longitudinem distinguatur. Præterea ad petioli inferiorem circulo prominente seu corolla instructus est, sex armata dentibus, qui staminum reliquia sunt. Semina (fig. 4.) ex rotunditate in acumen desinentia compressa dura & cortice nigro rugoso tella, in sex cellularum (fig. 5.) seu loculamentorum series universam fructus longitudinem (fig. 6.) excurrentes digesta sunt. Quoniam vero cellularum singulorum ordinum plana non in eadem præcise linea disposita sunt, fit ut horizontaliter secto fructu (fig. 5.) tria tantum appareant semina, quæ nempe in eodem Plano superiori collocata sunt, at in tribus aliis intermediis ordinibus vix ullum appareat seminis vestigium, nisi tantillum adhuc eadem directione secetur fructus. Tunc enim & hæc quoque inferiora conpacta se præbent superioribus jam seve oblitteratis omnino similia. Pulpa parietum & septorum mollis est, nigropurpurea, sapore dulci, levi aromatico vinosoque admixto, per siccitatem vero pulpa Cassiæ solutiva quodammodo similis. Huius *Tuca* arbor satis procera conspicitur in prædio quodam prope Regiam Villam Castellæ; *Alia* insuper in Horto Nostromo Senensis in Horto Pisano, & in Horto Nostro. *Yuca* foliis *Aloes* C. B. licet communis Nobis sit, & quotannis floreat, nunquam tamen (quod sciam) fructum edidit.



ANNICHELLIA palustris maior, foliis gramineis acutis, flore cum apice quadricapulari, embryonis clypeolis integris, & vasculo non barbato, capsulis seminum ad costam dentatis Michel. Nov. Plant. Gen. 71. n. 1. Tab. 34. fig. 1

ZIZIPHVS sativa, fructu rotundo H. Pil. * *Iuiaba* Offic. Giuggiolo ton-do vulgo

F I N I S

APPEN-

IO. TARGIONII TOZZETTII
A P P E N D I X

A D

PETRI ANTONII MICHELII
CATALOGUM PLANTARUM
HORTI CAESAREI FLORENTINI

Qua PLANTAE a MICHELIO descriptae
illustrantur,

*Pluresque aliae vel ab eo praetermissae, vel post
eius obitum in Hortum inlatae recensentur.*



IO. TARGIONII TOZZETTII

A P P E N D I X.



Pag. 1.



ABROTANI speciebus præfige:

ABIES Taxi folio, fructu sursum spectante Inft. R. H. 585. **Abies** Offic.
2. **Abies** tenuiore folio, fructu deorsum inflexo Inft. R. H. 585. **Picea**, &
Abies rubra Offic. Priorem e Monte Baldo attulit Michelinus; posteriorem ex
Alpibus nostris Vallis Umbrosæ deferri curavi.

ABROTANO 1. subiunge.

Hujus speciei flores in spicas laxas trinnciales distributi sunt duodecim, vel
ad summum viginti: constant autem flosculis exiguis duplicis formæ, quod &
tribus insequentibus speciebus contingit. Calycis squamæ in prima hac specie
albicantes, nonnihil lanuginosæ, margine foliaceo auctæ, dorsum compressum,
& fere complanatum habentes, Capitulum totum vestiunt. Thalamus (quemad-
modum & in insequenti specie) tenuissima, ac brevissima lanugine obductus est.
E Gargano Appulsæ Monte olim attulit Michelinus.

ABROTANO 2. subiunge.

Corymborum basis, & discus latus est, & fere complanatus: squamæ calycis
adeo brevæ sunt, ut dimidiam tantum Capituli molem vestiunt; duplo item la-
tiores sunt, quam in præcedenti specie, & margine foliaceo auctæ; dorsum præ-
terea gibbosum habent, & valde prominentem. In quibusdam Agri Florentini
locis sponte provenit.

O

ABRO.

ABROTANO 3. subiunge.

E Glandulis per universam Plantae superficiem sparsis & intra villas latiusculis extillat, diebus praesertim siccioribus, Balsamum quoddam pellucidum, Campborae odorem spirans, quod magni usus in Medicina esse possit. Nostri cerit Agriculae ad contusiones, & ecchymosis resoluendas felici cum successu utuntur Oleo Olivarum, in quo huius Abrotani folia diebus Cauticularibus infusa Solique exposita diu fuerint.

ABROTANO 5. subiunge.

Capitula habet rotunda, nutantia, quorum singula duodecim circiter flosculos perfectos, seu vagina flaminea instructos, & sex imperfectos continent. Placenta villis omnino destituta est, sed papillis quibusdam exasperatur, quibus adhaerent flosculi; quod & Absinthio Pontico tenuifolio incano Ioss. R. H. contingit.

Pag. 2.

ABSINTHIO 2. subiunge.

Ex seminibus a Michelo in ultimo suo Itinere collectis nata est Absinthii Pontici, seu Romani Officinarii species, cuius folia profundius incisa sunt, divisiisque in praetenuis, & acutae laciniae; talem vero se constanter bullens exhibuit. Duae praecedentes species capitula lata, compressa, & nutantia praefertunt, flosculos luteos duplici formae (non secus ac superiores Plantae) ibidem villis obstituto adhaerentes, & semina glabra.

ABUTILI species, adde sequentes.

1. Abutilon Althaeodes, flore carneo, fructu globoso H. Eltham. 1. Tab. 1.
2. Abutilon Lavaterae flore, fructu cristato H. Eltham. 3. Tab. 2.
3. Abutilon vesicarium crispum, floribus Melinis parvis H. Eltham. 6. Tab. 5.
4. Abutilon perenne, molle, & incanum, flore roseo, non descriptum, ex Providentiae Insula D. Dillenii, qui huius, & superiorum specierum semina nobiscum perbunumiter communicavit.
5. Abutilon repens Alcaeae foliis, flore helvolio H. Eltham. 5. Tab. 4. quod Michelo in hoc ipso Catalogo Pag. 62. appellaverat Malvindam Americanam procumbentem, Alcaeae folio, flore phoeniceo parvo.

Descriptioni ACACIAE 2. adde sequentia.

Flor accuratius observatus conicus apparuit, ore in sex partes, quales descripsi, ad medium usque diviso, quae rotati complanantur Alaterni florum instar. Ex angulis quos sectiones illae efficiunt, perpendiculariter surgunt flamina villis pellucidis ad basim obstita. Nullum embryonis rudimentum in masculinis hinc floribus videre licuit: nec vero seminuor, seu secundos, qui in celsiore arboris parte proveniunt, in tot florum exiguum ciliatibus distingere facile est. Anno 1740. filiquas tres protulit ab ea quam pingi curaveram novumhil aberrantes: breviores siquidem, latiores, magis complanatae, acutiores, & tortuosiores erant; adeo ut perbelle referrent filiquam Acaciae Americanae Abruzae foliis triacande, sive ad axillas foliorum spina triplici donatae Pluk. Mant. 2. cuius icon exhibetur Tab. 21. Catalogi Plantarum tum exoticarum, tum domesticarum, quae in Hortis haud procul a Londino sitis in venditionem propagantur.

pagantur: Quinimo totius Plantae facies ab illa non multum abludit, si valis-
dissimas, & triplices spinas excipias, quibus nostra prorsus caret. Pulpa pa-
rietum, & septorum filiquae stupposa est, initio acida, deinde resinosa, au-
stera, ingrati, & fere urentis saporis: tandem filiqua sicca, & quassata strepit.

ACANTHI speciebus adde.

4. *Acanthus* mollis minor *Asplenii* folio.

Folia plerumque palmaria, atrovirentia in plures subrotundos lobos *Asplenii*
vel *Dentis Leonis* in morem divisa sunt. Flor a prima specie non abludit: Ca-
lycis squama, seu valva superior integra, & linguata est; inferior in apice
dentata, & foliolis duobus longis graminiformibus ad latera stipata; ventra
vero spinosa est. Ex ultimo *Michellii* itinere per Venetam Ditionem habemus.

ACARNA maior, caule folioso C. B. Pin. 379. Vaill. in A& Acad. R. Sc.
A. 1718. Pag. 208. n. 1. *Cnicus polycephalus cautescens*, aculeis flavescens
munitus Insl. R. H. 451.

Pag. 3.

ACERI 5. subiunge.

Huius arboris flores petala decem, totidemque stamina habent.

ACETOSAE 1. subiunge.

Florifera & fructifera simul est. Eius fructus vestiuntur tribus alis mem-
branaceis, quae tria calycis, seu floris folia interiora fuerant; exteriora enim,
& minora in fin suo manent.

In speciei quinquae, & duarum sequentium floribus animadvertens dignum est,
quod tria folia minora & exteriora calycis, quae pendula primum erant, dum
embryo maturescit, eriguntur, & petiolo applicantur: tria vero interiora, &
ampliora persistunt in eodem fere situ, & nullatenus embryonem vestiunt. Con-
tra vero in speciebus 10. & 11. (de 12. enim certus non sum) quae individua
alia florifera tantum seu sterilia, alia vero florifera & fructifera simul profe-
runt, florum secundorum tria folia exteriora pendula semper consistunt; tria autem
interiora, & exigua embryoni ita exacte applicantur, ut capsulam, seu folliculum
fructus quodammodo constituent. Speciei 14. flori, seu calyci folia tria exteriora
habet non dentata, sed Corbularis instar excavata; tria vero interiora den-
tata, seu laciniata. Stamina quinque e centro attolluntur, inter quae sedet embryo
arigonus, e cuius vertice acetabula, seu nectaria tria sinuata erumpunt, &
calycis foliis interioribus applicantur, petalo tenuissimo adnexa.

Pag. 4.

ALATERNO subiunge.

Huius Plantae flor non monopetalus, sed proculdubio rosaceus est, ut a *Mi-
cheleo* quoque adnotatum reperi. Quinque enim segmenta, in quae dispersi
creditis est, sunt totidem petala pyramidata exigua, quae simul cum stamini-
bus decem numero, brevissimis, pistillum stipantibus, adhaerent sinibribus, seu
mar.

margini calycis: decidunt autem sorsim petala singula, ut in rufis floribus contingit, & calycem sentellatum relinquunt. Embryo globosus tuba trifariam scissa in apice munitur duobus fundo calycis, coque ad medium usque constitur, non secus ac Glandes Cupula.

ALCEAE species addo.

4. Alcea serrata flore incarnato Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. 270.

ALCHIMILLAE species addo.

4. Alchimilla alpina Linariae foliis, calyce florum albo in foliorum aliis (ferme sine pediculis) Mich. H. Pil. Casus lignae similis parvus frutex in Alpibus primus Caesalp. 155.

ALKEKENGII 2. subinuge.

Huius species flores a reliquis congeneribus abstant; infundibuliformes enim, seu campanulati sunt, non rotati.

3. Alkekengi Indicum minimum, fructu virescente Inst. R. H. 151.

ALNO 1. subinuge.

Folia nuncia quatuor longa sunt, tres cum dimidia lata: fructus 5. ferme lineas longus est, quatuor vero in ampliore diametro habet. In siccis solo colitur.

ALOES species 1. subinuge.

Planta haec ex America primum ad nos delata, climati nostro adeo adfuerit, ut non solum ubique frigoribus invicta perennes, & radicem ope propagetur ad ornatum summopere expetita; sed etiam pluribus in locis flores ferat. Prope Liburnum circa Valetudinarium D. Iacobi quotannis id accidit. Apud Morronum etiam, apud Castrum Florentinum, & in Agro Imbrunetano nuper floruit. Quinimo in ipsa Urbe Florentia in interioribus Moenibus ad Hortum Sanctimonialium Annae Helenae quandoque Populo mirante floriferam caulem extulit. Anno 1739. floribus onustam videre mihi contigit in suburbano DD. Bellucciorum in Agro Quercetano. Nihil autem in ea diversum deprehendi a descriptione & icona proposita in Horto Farnesiano Thobias Aldius, seu verius Petri Castelli Pag. 95. Peenlurem huius ipsius Aloes varietatem a paucis annis in hac Regio Horto colimus, quae scilicet folia elegantius pallido Margine vincta profert; non tamen balanus compertum mihi est quo nomine a ceteris distinguitur.

ALOES species 3. subinuge.

Est Aloe Africana maculata spinosa maior H. Eltham 17. Tab. 14. Apud nos quotannis in vere libero flores, & fructus perficit. Caulis flores sublimet in tres vel quatuor ramos divaricatur. Neque haec tantum Aloes species in Horto nostro quotannis absque hypocaustii auxilio flores producit; sed quinta etiam, & haec a Michelio omittitur.

8. Aloe Africana erecta triangularis & viscosa Commel. Prael. 82. H. Amst. 13. Tab. 13.

9. Aloe Africana erecta rotunda, folio parvo, & in acumen rigidissimum exeunte Commel. Prael. 83. H. Eltham. 16. Tab. 13.

10. Aloe Africana margaritifera minor Commel. H. Amst. Part. 2. 21. H. Eltham 19. Tab. 16.

11. Aloe

11. Aloe Africana Margaritifera minima Commel. Prael. 43. H. Eltham. 20. Tab. 16.

Pag. 5.

ALSINANTHEMO 2. subiunge.

Fructus vasculosus in apice tantum debilem, Lychnidis fructuum ad instar, ab *Alfines* speciebus hoc coniungit. Vaillantius in Bot. Par novum Genus constituerat nomine Lychnoidis, quod nomen a Rais T. 3. 489. aliis plantis tributum fuerat.

ALSINE 3. subiunge.

Planta annua est, foliis Hederaceis vestita: Calycis florum sessiones sesquilineam longae sunt; Petala vero quinque alta, duas tertias lineae partes longa sunt, quartam lata, & usque ad centrum bifida.

ALSINE 10. subiunge.

An *Alfina* *Spergulae* facie marina perennis, flore violaceo Moris. Hist. Oxon. part. 2. 551. *Alfina* *Spergulae* facie media C. B. Pin. 251. Bot. Monsp. 14. *Spergula* marina nostras l. B. 3. 722. *Spergula* marina Lugd. 1385. ex Mich. Rar. Petala sesquilineam longa sunt; margo seminum albicans, & fere pellucidus est. In Maritimis Pisani abunde provenit.

ALSINE 13. subiunge.

Est *Alfina* Alpina saxatilis glabra perennis, folio capillaceo in externa parte tribus nervis instructo, flore pentapetalo albo, petalis subrotundis lineam longis, & indivisis, &c. Mich. Rar.

ALSINE 14. subiunge.

Annua est, proindeque diversa ab insequenti; glabra item, folio capillaceo, flore herbido tetrapetalo, petalis subrotundis vix conspicuis, fructu orbiculato: Ex Mich. Rar.

ALSINE 15. subiunge.

Petala florum ferme orbiculata sunt.

ALSINE 16. subiunge.

Est *Alfina* Alpina saxatilis glabra, caulibus longioribus, foliis perangustis deorsum reflexis, floribus pentapetalis albis, petalis angustis trilinearibus, & indivisis, semine reniformi nigro splendente. *Alfina alpina glabra foliis reflexis* Pluk. Phytogr. Tab. 75. fig. 5. saxifraga Bavarica Ponce Bald. Ital. 159. Park. Theat. 427. Mich. Rar.

17. *Alfina* maritima annua glabra, sive *Spergula* marina media, foliis longioribus angustis succulentis, floribus pentapetalis purpurascensibus ferme sine pediculo, petalis subrotundis integris lineam longis, semine exiguo non marginato Mich. Rar. In palustribus Agri Liburnensis, praecipue in vestigiis Portus Pisani inventi.

Quaedam ad *ALTHAEAS* spectantia habet inferius in adnotatis ad *Malvae* species.

ALYSSO 3. subiunge.

Petala florum alba sunt, & bifida: siliqua autem oblonga est, trilinearis.

ALYSSO 4. subiunge.

Petala florum alba sunt, & integra. Ob siliquarum formam speciem hanc, & superiorem ad Camelinae genus revocavit Michelus Rav.

AMARANTHO 3. subiunge.

Planta annua est, foliis macula sagittata alba Persicariae instar distinctis ornata. Flores florum spicas ramosas profert, quarum medietas superior floribus masculinis, seu sterilibus tantummodo constata est. Hi ad centrum usque dividuntur in quinque acutas sectiones cochlearis instar excavatas, in aculeum inferne desincentes, externae virides, intus vero candidantes, calycis Nymphaeae albae florum ad instar, & stamina quinque alba apicibus citrinis instructa in sua gerunt. Inferiori spicae parti cohaerent flores feminini, seu embryonem foventes, quorum perianthium dimidio minus est quam sterilitum. Germen bovini crassius forma, album, hirsutum, duobus coraculatis tubis in apice munitur. Capsula horizontaliter debescit, & nunc seminem nigrum splendens includit.

AMARANTHO 5. subiunge.

Flores masculinos, seu steriles in hac planta nullos inveni; sed eorum vicem gerunt squamae coloratae cristas efformantes: feminini vero, seu secundi calycem habent tribus linearibus, & acutis foliolis constantem, quorum duo corollam arcte complectantur; medium vero simul cum brevissimo pediculo florem subsistente erumpit. Corolla quinque, vel sex foliolis constat lineas duas cum dimidia longis, in acumen desinentibus, rubris, margine albo donatis. Stamina quinque sunt, capillaria, rubra, longitudinae calycem aequantia, circa centrum coacta, & saccum globosum membranaceum efformantia, in quo Embryo adalatur tuba exerta per foramen apertum in sacci summitate, quo loci stamina divaricantur. Apices carnei sunt, Tubae stigma simplex. Embryo crescent saccum descriptum distrahitis, basin versus comprimit, itaque via sibi facta erumpit, & abit in capsulam globosam lineari ferme diametro, hilo sesquilineari in vertice donatam, transversa trifariam debescens, & 7. vel 8. semina splendentia fundo affixa continentem.

6. *Amaranthus caudatus* Phytanozaic. Tab. 59. *Amaranthus maior* serotinus arborescat nutantibus roseis flagellis, semine carneo Barr. Ic. 663. Discipline vulgo.

7. *Amaranthus tricolor* luteus ruber viridis H. Eyst. Aut. o 2. f. 6. f. 1. Phytanozaic. Tab. 94.

8. *Amaranthus tricolor* luteus albus & viridis Phytanozaic. Tab. 95.

De AMBERBOI speciebus V. adnotata ad Cyanum pag. 31.

AMBROSIAE subiunge.

Flores huius plantae in spicam digesti duplicis naturae sunt, alii nempe masculini, alii feminini: masculini superiori caulis, ramulorumque parti adfixi, calycem

calycem habent campanulatum in ore dentatum, Thalamo seu placenta in centro donatum, & qua erumpunt 35. circiter stiloculi rotam calycis cavitatem occupantes. Stiloculi hi monopetali sunt, lutei, ad medium usque conici & solidi, deinceps ampliantur, concavique evadunt, rursusque coarctantur, ita ut oboles quodammodo appareant quinquefariam in apice scissi sectionibus acutis. Ex horum fundo tuba surgit, quam stipantur quinque brevissima stamina apices prolongos breventres, tubamque respicientes, gerentia, & in cuspidem lanceatam desinentia. Tandem singulorum ferme stiloculorum basi adnascuntur filamenta quaedam peculiaria, succosa, tortuosa capreolorum iustar, superfusis scabra, sen verrucosa, quae longitudine stiloculos nonnihil excedunt.

Pag. 7.

ANEMONI. 1. subinje.

Huius flores petala duodecim proferunt unciam longa, lineas tres, vel 4. lata.

ANEMONI. 2. subinje.

Serratina est; folia Aconiti proferit coniugata; ramusculos item coniugatos. Flores calyce desituntur, & sex vel septem petalis constant leucophaeis, exaeque hirsutis, internis glabris & concavis. Embryo fragaeformis, glaber, pluribus staminibus virgulentibus stipatur, apice lanceolato instructis.

ANONIDI. 3. subinje.

Est Cicer Sylvester Theriacaria vocatus Caesalp. 238. Ononis in montibus Semnibus Spigellii Isagoge in Rem Herbariam lib. 1. cap. 18. Planta annua est decem plerumque uncias alta, tenuibus, & fibratis, lignosis tamen radicibus praedita. Ramulos plures quaqueversum emittit, & ferme in globum diffunditur. Universam eius superficiem, exceptis florum petalis, brevissimi, teretes ac pellucidi pili vestiunt, e quorum summitate erumpit exilissima guttula Balsami pellucidi, odoris medicati ad Theriacam accedentis. Balsamum hoc nixae plauram odoratam facit, illo enim deterse, nullum alium nisi berbaceum odorem habebit. Extrillare ipsum in maiori copia observavi in planta adulta, & tempestate sicca; Augusto vero mense, dum planta ferme effusa est, densius, & ferme cerceum apparet, colorem lutescentem assumit, gravius olet, & plantae etiam siccae diu adhaeret, ut notavit Spigellius. Folia primaria verus ovalia sunt, novem lineas longa, quinque lata, in ambitu serrata, mollissima, Ciceris foliorum acmula, ut Caesalpinus recte adnotavit, & alternatim disposita, ad basin praeterea appendices duas habent acuminatas, quae conniventes nodum cingunt. Ex harum finem ad angulum ferme rectum erumpit capreolus, sen pediculus teres, reclus, & sesquiquincialis, in aculeum incernem, quem Caesalpinus appendicem vocat, desinens, qui ad decem linearum ab origine distantiam pediculum secundarium linearem emittit, cui flori pendulus adfigitur. Flor dilute foetilis linearibus. Calycis quinquefidi sectiones longae, & acutae florem quodammodo occultant. Siliquae ferme cylindricae sunt, sementiam longas, sesquilineari diametro, & ipsae pendulae, ac laeves. Semina tandem Apbucae similia sunt, rotunda, subflava. In Agro Florentino locis sterilibus abunde procedit: Rustici Millaghera, vel Erba baccia vocant eius enim pulverem adperjur Lunbricos

brices exhibent felici, ut aiunt, eventum, quemadmodum animadvertit etiam Caesalpinus. Praeflantiores tamen, si fallor, in Medicina habere possent usque, praesertim in morbis Nervorum.

4. Anonis Asiatica frutescens, floribus luteis amplis Insl. R. H. 409. Boerh. Ind. Ale. H. Lugd. Bat. II. 34.

Pag. 8.

ANTHEMIDI 3. subingae:

Aetate Anni 1744. semisflosculos coronales protulit, non flosculis discoideis eum-
colores, nempe antheos, sed pallidos, albidiores, lingua lineari rotunda infundulos.

ANTIRRHINI specierum nomina ita emendari debent.

1. Antirrhinum maius Italicum sempervirens, Leucoli silvestris folio angustiori, flore maiore rubro cum rictu ex albo pallido. Antirrhinum l. Mattb. 1255. Ed. Valgr. Ital. in fol. A. 1585. Os Leonis vulgo, Linariae folio, flore roseo Caesalp. 350. Mich. Rar. In montibus Urbis nostrae in quibus Caesalpinus etiam observavit, copiose provenit & perennat. Folia inferiora tres uncias longa sunt, utrinque acuminata, quatuor linear lata, & ferme rhomboidalia; superiora vero, & ramorum secundariorum, dimidio minora. Flores 15. linear longi sunt, galea vero 8. latu. Calyx in quinque bilinearia foliola dividitur; fructus tandem linearis sex longus est.

Huius varietas est Antirrhinum secundo loco descriptum, cuius synonyma ex Micheli Rar. sunt: Antirrhino 11. Mattb. 1256. Os Leonis vulgo Linariae folio, flore albo Caesalp. 350. Ex iisdem montibus in quibus sponte provenit, in Hortum translatum est, simul cum insequenti.

Idem flore purpureo dilutiore, & fere albicante.

Species tertia florem purpureum saturatiorem praefert, variatque rictus colore albo & aereo.

4. Antirrhinum maius Italicum brevioribus & latioribus foliis subhirsutis, amplo pallescente flore. Os Leonis foliis brevioribus latiusculis subhirsutis, floribus pallescentibus Caesalp. 350. Antirrhinum luteo flore C. B. Pin. 211. Insl. R. H. 168. Antirrhinum latifolium pallido amplo flore Barr. Obs. 20. num. 190. Icon. 556. Boc. Mnf. part. 2. 49. Tab. 41. Insl. R. H. 168. Mich. Rar. Flos quatuordecim linear longus est, pallescent, labio superiori bifido, interne venit rubris distincto; inferiori circa rictum aereo, quadrifariam fissis, cordato, villisque pellucidis obfuso. Notari meretur flores antequam pateant foliolo cochlearis instar excavato occultari. A pluribus annis in Horto colitur; sponte autem, & latissime germinantem inveni circa Stazsemam Pagum Comitatus Petrasanti.

APARINE 3. subingae.

Est Aparine annua minor foliis brevibus lineam circiter latis, spinis creberrimis deorsum spectantibus in margine munitis, floribus albis, seminibus asperis Mich. Rar.

Aparine 4. est Aparine annua minor foliis brevibus, spinulis rarioribus perexiguis sursum spectantibus in margine munitis, floribus albis, fructu verrucoso Eiusd.

5. Tandem est Aparine minima annua foliis tres lineas longis, semina eam latius, in margine spinulis sursum spectantibus munitis, floribus obsolete purpureis, fructu subsaepo Eiusd.

APHACAE subiuuge.

2. Aphaca semine nigro Caesalp. 236. Aphaca Lob. Icon. 70. Inst. R. H. 399. Siliquae longiores, & graciliores quam superior praefert.

Pag. 9.

APOCYN 4. subiuuge.

Planta ferme arborea, sic caudicem spectes, videri potest; truncus tamca per se non subsistit, sed varias arbores complectitur. Sarmenta vetustiora cinerea sunt, iuniora aemum virentia, & foliis coarctatis subrotundis, seu potius cordiformibus vestita. Verno tempore in ramulis recentibus ex alis foliorum ramulculis prodis in quatuor alios subdivisus, quorum singuli quinos flores pediculus quinque lineariibus sulcorum subfasciatis. Flores campaniformes, multifidus fig. C. Tab. 20. Inst. R. H. similis, ad centrum usque scissi, segmentis lineae quatuor longis, lineam ubique latis, & in vertice rotundatis, candidi primum sunt, effecti vero palliescunt. In eorum centro embryonis exiguum rudimentum nidulatur pyramidatum, ex duabus siliculis invicem appressis constans, ad cuius basin quinque adnascuntur antherae infescentes, & in apicem foliacum desineat. Stipatur hac staminulis quinque brevissimis, complanatis, pelucidis, in quorum summitate apices reperire nullatenus contingit: nullum propterea odorem spirant, & steriles sunt flores hi, nec unquam, quod sciam, fructum protulerunt, eo fortasse quia pro lubitu summa arborum fastigia conscendere Planta non potest. Idem prorsus accidit Periplocae foliis oblongis Inst. R. H. quemadmodum pluries observavi in nemoribus Agri Pisani, praesertim la Fagiania, & le Calcine dictis; cae siquidem Periplocae plantas, quae celsissimas arbores conscenderant, folia amplissima ferme rotunda, flores innumeros, siliquasque plurimas Nerii similes proferebant; contra vero illae quae tali fulcra carebant, strigosae erant, steriles, & folia oblonga angustaque gerebant. Granadilla item descripta pag. 46. Bignonia Fraxini folio, Vitis Canadensis quinquefolia scandens; quinimmo plures aliae Plantae scandentes lacte non virent, & fructus nullatenus perficiunt nisi fastigia summa petierint, & libero aere perfruantur. Phaenomeni huius causas, & corollaria quae ad Agriculturam perficiendam peti inde possunt, Physicis relinquo, adnotare contentus Apocynum nostrum radicem repentem ope nullatenus propagatum fuisse. Planta tota foetidissima est, & lac subpallidum inspidum vel levissima incisione fundit. Unde nam in Hortum transata fuerit, ignoramus, iam eam ibi colebatur An. 1718. quo Hortus Societati Botanicae datus fuit, & fortasse aliqua est ex plantis a Calabona delatis; eius namque stela observavi in quibusdam Herbariis faculo superiori confectis. Plurimum accedit figurae & descriptioni Apocyni primi latifolii Clus. Rar. 124. Banh. in Matth. 774. & descriptioni Periplocae Syriacae non repentis Caesalp. 119.

5. Apocynum Americanum foliis Androsacmi, flore Lilii convallium suarum verubentis Par. Bat.

6. Apocynum ex Barbados nomine Radicis Indicae missum D. Dillenii; P AQUI.

AQUIFOLIUM, five Agrifolium vulgo l. B. l. 114. Inft. R. H. 600.

De ARISARO 2. Vide inferius adnotata ad Arum, eique subiunge.

3. Arisarum flore in tenuem caudam abeunte Inft. R. H. 160. *Arisarum minus probofideum* Bocc. Obs. Mas. Part. 2. 61. Tab. 50. *Arisarum latifolium minus repens cespitosum* Bar. Obs. 19. n. 182. Icon. 1250.

ARTEMISIAE 3. subiunge.

Specierum harum flores, seu corymbi coarcti sunt, calyce squamoso muniti. Flosculi autem duplicis formae sunt; tres siquidem in quolibet capitulo includuntur perfecti, octo autem imperfecti, at vocant, seu tubo unico donati, e quo embryonis filus divaricatus erumpit. Thalamus coarctus est, & nudus, cui flosculi immediate adhaerens nullis squamis seu dissepimentis intercedentibus.

ARTEMISIAE 4. subiunge.

Planta infipida est, & caules nitidos rubentes profert. Folia ianiora Verno tempora hirsuta sunt, & Abrotani maris similia; in Aestate vero atrovirentia, glabra, & quasi splendentia. Capitula proferi exigua, pyramidata, erecta, ia quibus flosculi duplicis naturae, quemadmodum in superioribus speciebus continentur.

5. Artemisia tenuifolia caulibus rubentibus Vaill. in A& Acad. R. Sc. 1719. pag. 376. num. 7.

Pag. 10.

ARI speciei 1. subiunge.

Fructus protulis A. 1740. Ari vulgaris similes, sed maiusculas, acuminatas, & intestates. Flores odore non insuavi se commendant: An igitur est Arum Aethyopicum flore albo odorato Commel. H. Amstel. T. I. 95. Arum Aethyopicum flore albo odorato Moschum olente Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. P. 2. 74. Phytanozic. Tab. 174.

ARO 2. subiunge.

In huius, & trium insequentium specierum flore adnotari meretur Spadicia graciliori parti adnasci series aliquot papillarum, quae crassiuscula hirsutae pubescent, & in oblongum, ac praeterea filameatam terminantur, exiguo deinde intervallo succedere series aliquot apicum, seu corporum pyramidalium, quae quatuor tubis conoideis cavis iavicem adnatis, & ia apice perforatis consistunt; e quatuor autem foraminulis bifide erumpere pulvisculum seminale, qui in tuborum cavitate nidulatur; aequali deinde intervallo alias papillarum prioribus similium series spectari, quae immediate subsequantur embryones imam spadicis, seu pistilli partem occupantes.

ARO 6. subiunge.

Saepius flores protulit, quorum structura a superiorum specierum floribus abhinc. Spadix quidem Ari vulgaris facie est, sed crassior, sermo coriacea, & undulata, colore luteo extus saturo, intus dilutiore. Ex eius basi evolvitur
crum.

erumpit penit exiguis acuminatur, eandae murinae similis, ochroleucus, cuius basi confertim adnascuntur plurimae serices apicum, seu antherarum, quae constant quingue, sex, vel septem filamentis, vel tubis invicem connexis, in inferiori parte communis quodam brevique pediculo sulctis, in superiori vero excavatis & dilatatis, ut flosculum exapetalum quodammodo referant. Haec inter, & embryonum serices spectantur aliquot, sed laxiores, serices corpuscularum (qua Nectaria appellare possis) conicorum, ex angusta basi sensim crassescens, & in haemisphaerium granulatum desinentium. Haec immediate consequuntur serices embryonum, quibus admixta cernere est aliquot ex superius descriptis Nectariis. Embryones autem globosi, brevi stigmate in summitate instructi, abeunt in baccam unilocularem exilibus, oblongis, ac ferme cylindricis seminibus fetam. Planta, utpote iuxta rivulos nasci solita, in fillilibus non perforatis, ac uberrime irrigatis colitur, & lactissime germinat; Hieme vero, quo tempore foliorum decore orbatur, & veluti morina apparet, in hibernaculo adseruatur, variisque irrigatur.

7. Arum Scortoneræ folio Inst. R. H. 160. quod superius pag. 9. inter Aristari species num. 2. descriptum fuerat.

Pag. 11.

ASPARAGO 2. subiunge.

Folia capillaria sunt, linear 7. longa. Flores plerumque duo, raro tres & singulis nodis pendunt. Eorum pediculus capillaris linear quatuor cum dimidia, longus, duobus segmentis articulatis constat, quorum prius portio, seu ramulus plantae est, posterius autem, & trilinare, floris propago. Flor monopetalis potiore iure accensendus, pendulus semper est, linear tres longus & quodammodo cylindricus, lineari diametro. Petala ad basin coalita tria exteriora herbacea, seu lurida, & acutiora sunt, tria vero interiora latiuscula, in summitate dilatata, & alba. Stamina pariter alba & fundo floris egredientia, & petalis ad medium usque inserta, intra florem latent, & apices luteos sublimis pulvisculo aureo resecros.

ASPARAGO 3. subiunge.

Flor dio 1. Mali observatur, Strigoser quam subsequens speciei apparet.

ASPARAGO 6. subiunge.

Flores fructusque protulsi Vere Anni 1740. & eorum strucluram in peculiari scheda adnotavi, quam nescio quomodo amisi; sed, ni male memini, ad Smilacis potius, quam ad Asparagi speciei plantam hanc referendam esse cognovi.

ASPHODELO 4. subiunge.

Aprili initio flores proferit in praelongis spicis digestos, Liliaceos monopetalos, in sex partes ad centrum usque fissos, quarum quingue erectae sunt, sexta vero & inferior pendula; omnes autem retro reflexae, luteae, necnon viridi utrinque conspicuo per medium distinguuntur. Stamina sex, & embryonis filus in apice bifariam fissus, falcata pariter sunt. Speciem. 5. in Horto Elthamensi descriptam, & affabre pictam cernere est pag. 310. & 231.

Pag. 12.

ASTERI 10. *subiunge.*

Semina villosa & pappo instructa proferat, thalamo cellulato affixa.

ASTERI 11. *subiunge.*

In singulis floribus duodecim, vel quindecim semistlosculis coronales gerit.

ASTERI 14. *subiunge.*

Annus est, corona floris rosea, vel purpurea, disco aureo:

25. Idem corona candida.

26. Alter ramosus annuus Canadensis H. R. Bles. 236. Inst. R. H. 482.
Leucanthemum Bellidis facie, umbelliferum, semine papposo Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 108. num. 11. Vaitl. in Ast. Ac. R. Sc. 1720. pag. 404. num. 45.

17. Alter annuus flore papposo rubente: sub hoc titulo ex Sibiria missus D. Amman.

18. Alter maritimus Salicis folio longiore & angustiore peracuto, floribus caeruleis parvis, semistlosculis copiosioribus. *An Aster Salicis folio, flore caeruleo, radice repente Mor. Hist. Oxon. part. 3. fcll. 7. Tab. 22 fig. 26. Amel. in Virgilii Matth. 1734. Ed. Valgrif. 1585. in f. Tripolium Camerarii Hort. 179. Mich. Rar. ex Insulis Venetis adtulit Michelius.*

19. Alter montanus luteus, Salicis glabro folio. C. B. Pin. 266. *Aster Adiscus alter in rudibus Caesalp. 469.*

20. Alter montanus luteus subhirsutus nigrovirente folio Mich. Rar.

21. Aster palustris parvo flore globoso Inst. R. H. 483. *Aliquis ex bis Asteris specibus Vaillantius ad Helenii speciem revocavit in Ast. Ac. R. Sc. A. 1720. pag. 391.*

ASTEROIDI 1. *subiunge.*

Plantam hanc Michelius Rar. Vaillantium sequutus ad Asterisci genus revocavit, appellavitque: Asteriscus perennis, villosus, serratus, imo calyce non folioso Vaitl. in Ast. Ac. R. Sc. A. 1720. pag. 430. num. 10. Asteriscus calyce brevi, angustifolius Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 105. n. 10. Asteroidea hirsuta latifolia Patavina Michelii H. Pis. Aster luteus maior foliis Succisae C. B. Pin. 266. Aster III. Austriacus Clus. Hist. XIII. In Plavine quae ad radices Collium Arguae in Agro Patavino est, invenisse se ait, & exempla etiam ex Agro Viennensi accepisse. In Adversariis autem alterius operis quibus paucis ante mortem mensibus incumbabat, diversum fecit ab Asterisco Vaillantii, eo quod illa squamar, quae semina ab invicem distinguunt aristatas proferat, hic vero partim aristatas, partim retusas, & velut laceras.

ASTEROIDI 2. *subiunge.*

Lin. 2. semilineam latis, corrige sesquilineam latis. In libro Rar. Michelius huius nomen fecit: Asteriscus Alpinus Salicis folio angusto, & subhirsuto, flore minore, calyce nudo, &c. Praeter Bocconii synonymon aptari hoc etiam ei possit suspicari: Asteriscus alpinus simpliciter caule, floribus luteis Caesalp. 496. Folia

lia Mense Februario circa radicem renascentia angusta erant, hirsuta praefertim in margine, quaedam subinde deutata, sive verrucis vesiculisque Balsamo rubente repletis donata, non sicut ac in hyperici petalorum margine accidit. In Alpibus Petrae Apuanae sponte provenit.

ASTEROIDI 3. subiunge.

Semilineam circiter latis, corrige lineam circiter latis.

Hanc quoque ad Asterisum revocavit Michelius, atque aptari illi posse iconem Asteris Montani flore luteo magno, hirsuti, quibusdam Oculis Christi I. B. 2. 1046. Folia prima Februario Mense observata maiora quam superioris sunt, ex angusto principio magis dilatata, hirsuta, & verrucis, vesiculisque, similibus donata.

Pag. 13.

ASTRAGALO 6. subiunge.

7. Astragalus purpureus perennis spicatus Pannonicus Mor. Hist. Oxon. part. 2. 106. Inst. R. H. 415.

8. Astragalus pumilus siliqua Epiglottidis forma Inst. R. H. 416.

9. Astragalus Orientalis altissimus, Galegae foliis amplioribus, flore parvo aefescente Coroll. Inst. R. H. 29.

ASTRANTIAE subiunge.

Astrantia lutea C. B. Pin. 379. Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. 1718. pag. 217.

ATRIPLICI 4. subiunge.

Semen unum in pericarpio quolibet continetur coarctatum istar seminis Kalé Gramineae folio, seu Chenopodii maritimi semine splendente, inclusum folliculo lentiformi in basi tantummodo pervio, ac tuba bifurcata instructo: Flor hermaphroditus laciniis acutis habet.

ATRIPLICI 5. subiunge.

Flores profert unus tantum format, hermaphroditos nempe. Calyx constat duobus foliolis virescentibus, cucullatis, ad basin conianctis, & pelocin quamdam constituentibus, e qua embryo surgit ellipticobomboidalis compressus, stylo ac stigmatibus laciniatis muuitur: stipatur hic ternis ex utroque latere staminibus ad originem pyramidalis, & apices carnosos sublineatis. Ambiant haec petala, seu foliola duo elegantissima, candida, cochlearis instar excavata, quae enisio expansa sunt Circaeae florum instar, deinde vero eriguntur, & invicem adpressantur, adeous embryonem maturentem claudant, quemadmodum ceteris Atriplicis speciebus contingit.

6. Atriplex hortensis alba, sive pallide virens C. B. Pin. 119. Inst. R. H. 505. Spicaeone vulgo. Duas huius varietates observasse me memini, unam nempe perianthiodiphylla floris feminei acuminato, alteram eo rotundo. Notari mereur ad floris feminei basin duos ex utroque latere flosculos hermaphroditos nasci, minimos, herbaceos, monopetalos rotatos, quinquifariam fellores, & staminibus quinque donatos apicem sublineatis, ac ex incisuris florum prodeuntibus. Flosculi bi plerumque steriles sunt: in nonnullis tamen embryo abis in fructum orbicularem depressum nigrum, quem laciniis florum arte amplexantur.

Pag. 14.

Pag. 14.

AURANTIO 14. subiunge.

12. Aurantium foliis angustis ex flavo albo & subluteo variegatis, fructu subrotundo sessili luteo, costis vitrescentibus, cortice trilineari amaro, succo acido. *An Aurantium virgatum angustifolium* Inst. R. H. 620. *Malus Anranzia angustioribus foliis*, & fructu variegatis H. L. Bat. *Anrantrum virgatum multiflorum folio, fructuque striato Clarici* Istor. & Colt. delle Piante 738. *Arancio con fructo, e foglia variegata Wolkam* Hesp. Norib. T. 2. 193. *Araacio Turco* vulgo Mich. Rar.

16. Autantium Laurinis foliis H. Pif. *Malum Aurantium Lauri angustis foliis* Bocc. Rar. 3.

AZEDARACH subiunge.

Præcox est; floris item petala caerulea profert, & nectarium saturocaeruleum; proindeque distinguenda est ab insequenti specie, quæ serotina est, petalæque habet albida, vel dilute carnea, trilinearia, in acutum apicem definentia, & externe nervo rubente notata; Nectarium tandem nigro purpureum.

2. Azedarach foliis ramosis amplioribus, flore albo, vel carneo. *Pseudosycomorur* H. Eyst. Aut. O. 1. f. 2. *Tuber, quam vulgo fuscum Sycomorur vocant* Caesalp. 107. In pluribus Etruriae locis, ac præsertim in nemoribus Aucupariis lactissimæ ambæ proveniunt, & folia vel hinc retinent, licet peregrinae sint.

BALSAMITAE 1. subiunge.

Flosculi integri & unius omnes formæ sunt, invicem stipati, nullisque foliolis, seu squamis ab invicem distincti. Folia adulta alveolis quibusdam repleta conspiciuntur villo incurvo in margine munitis, in quorum fundo glandula hæmispærica nidulatur, e qua Balsamum peculiare pellucidum exsudat, quod odoris plantæ sedes est, & n. Sole inspersum lutescentem colorem assumit, resinaque insur concrevit. Exsudat vero potissimum Aëstatis initio, dum folia non nimis tegera ac succosa sunt.

BALSAMITAE 2. subiunge.

Flosculi similes superioribus sunt, verum ii qui floris peripheriam occupant, folioli quibusdam imbricatis, & acuminatis ab invicem distinguuntur.

BARBAE CAPRAE 1. subiunge.

Flor sesquilineam longus petalis quinque constat ex angusto principio sensim dilatatis ac rotundatis, & cochlearis instar excavatis. Calyx stellatus est, flor in quinque acutis laciniis divisus. Dum hæc fructus ad maturitatem perducit, sequens species flores suos explicat, qui petalis ferme ovalibus componuntur, & staminibus duodecim circiter albis, apice luteolo munitis, adeo ciliis ut vix a centro se attollant, & nudum oculum eludant.

Pag. 15.

BARBAREAE 2. subiunge.

Respondet signæ Eurnæ Palæstris Lugd. 650. & *Herbat S. Barbaræ* Cass. 287. n3

287. ut adnotavit Mich. Rar. Petala florum cordata sunt, duas lineas longa, unam lata; siliquae autem unciam circiter longae sunt.

BARBAREAE 4. subiunge.

Eadem est cum *Sisymbrii* specie 8. per errorem descripta pag. 90. Ad hoc *Barbareae* genus pertinent alias quoque *Sisymbrii* species ibidem descriptae sub numer. 5. 6. & 7.

BELLIDI subiunge.

2. Bellis hortensis flore pleno, eoque magni, albo C. B. Pin. 261. Inst. R. H. 491.

3. Bellis hortensis flore pleno, eoque magni, varii C. B. Pin. 261. Inst. R. H. 491.

BERMUDIANAE subiunge.

2. Bermudiana Graminea flore minore caeruleo H. Eltham. 49. Tab. 41. fig. 49.

BETONICAE 4. subiunge.

Odorem *Chamaedryos* vulgaris spirat. Folia utrinque acuminata sunt, uncias duas plerumque longa, lineas novem lata. Flores verticillatim digesti sunt, eorumque labium superius intus & extra candidum est, in margine autem circa fauces punctulis sanguineis notatum; inferius e luteo pallescit. In ceteris convenit cum descriptione Ravi Hist. T. 1. 566. Figura *Alyssi* maioris Tabern. le. 541. optima est.

5. Betonica maior Danica Inst. R. H. 203.

6. Betonica maritima (Salvine folio) flore ex luteo pallescente Inst. R. H. 203. *Sideritis* *Heraclea latifolia* *Dioscoridis*. *Sideritis marina* *Salvisfolia* nostra Donat. Boc. Mus. 164. Mich. Rar.

BIDENTI 1. subiunge.

Semina *Spondylii* seminum similia sunt, duas lineas longa, transversim fissura, & squamis canaliculatis in aculeum desinentibus ab invicem distincta.

Pag. 16.

BIDENTI 6. subiunge.

Semina lineas quatuor longa sunt, duas lata, aristis sesquilinearibus munita, circulariter disposita, & squamis foliaceis ab invicem distincta.

BIDENTI 9. subiunge.

12. *Bidens palustris* annua, caule anguloso, foliis oblongis serratis, non divisis, flore parvo luteo minus specioso & erecto, semine binis aristis munito. *Bidens* folio non dissecto Caesalp. 488. an *Eupatorium Cannabinum* femina Septentrionalium stellato & odorato flore Lob. le. 528? Mich. Rar.

11. *Bidens palustris* annua, caule rotundo, immo versus nonnihil hirsuto, ac purpurascente, foliis Salicis longiore & angustiore, nitido, semunciam lato, & nonnihil serrato, flore specioso aureo nutante, semine quatuor aristis munito. An *Eupatorium Cannabinum chrysanthemum* Barr. Icon. 1209. ? Mich. Rar.

Uram.

Utramque attuli A. 1742. e Palustribus Blentinensibus, in quibus lactissime proveniunt, floresque Octobri Mense explicant.

12. *Bidens* palustris annua foliis subrotundis, latioribus, imis plerumque trilobatis, ceteris integris, flore luteo minus specioso, semine binis aristis armato Mich. Cat. Plant. A. Flor. In salictis Arni fluvii prope Uniani Pagum repertam in Hortum olim transfudit Michelinus, quum autem perisset, attuli ego A. 1743. e Paludibus inter Petram sanctam & Massam Rosam obvii, ubi copiose germinantem inveni simul cum sequenti.

13. *Bidens* quae *Verbesina* palustris annua, caule rotundo purpurascete, foliis Salicis coniugatis & serratis, flore luteo radiato, semistiloculis sterilibus. Eupatorium aquatico folio non diviso, flore auris undique petalis radiato Lael. Triumph. apud Fratrem 63. Mich. Rar.

BLATTARIAE 1. subiunge.

Flores ampliores quam sequentium specierum sunt: Stamina, & lanugo quae ipsa stipantur purpurea est, apices autem crocei. Villi quibus spicae florum in hac, & sequentibus speciebus vestiuntur, vascula excretoria sunt, e quorum summitate Verno & matutino tempore succus quidam pellucidus, & nonnihil glutinosus exsudat.

Pag. 17.

BLITO 2. subiunge.

3. *Blitum* totum purpureum, spicatum, latifolium, erectum, foliis Betaceis acuminatis, calyce pentaphyllo, semine spadiceo splendente. *Figurae Blitis* Cam. Epit. 233. & *Blitis* maximi, sive *Amaranthi* maioris L. B. 2. 968. huic perbelle aptari possunt. Mich. Post. Flores masculini lineares sunt, rubri, foliolis quinque ovatoacuminatis constantes, & staminutis quinque albis apices lateos sustententibus instructi, nullo embryonis vestigio apparente. Inter acervos florum masculinorum feminini flores conspiciuntur; calyces nempe quinquefarariam scissi, in quorum fundo embryo nidulatur, filamentis quatuor pennatis in apice instructus, qui deinde abit in fructum globosum Octobri Mense maturescens, bifariam horizontaliter debentem, valva superiori purpurea, inferiori constanter viridi, & semine unicum lentiforme erectum includentem. Haec florum steriliu & fecundorum differentia in superioribus etiam duobus *Blitis* obtinet; sed notari meretur ipsorum flores trifariam tantum, non vero quinquefarariam divisos esse, ac masculinos seu steriles tribus staminibus donari; Embryonis item apicem tribus tantum filamentis instructum esse.

4. *Blitum* fragiferum maximum polyspermon Amman. Rarior. 166.

BOLETO subiunge.

Talem *Boletus* huius descriptionem ex Michelinis sebedis elieni. Pollicis ferme quatuor longus est, quorum duos pileolus occupat. Pediculus interne cavus, non proorsus albus, sed leucophaeus, ad radicem ventricosus, & septem lineas in diametro habens, sensim deinde angustior fit, praesertim qua parte extremo pileoli margini subest. Pileolus autem subfuscus olivaceum quodadmodum figuram induit; e margine siquidem collecto, pediculoque appresso, sensim dilatatur, & in acutum fastigium desinit, crebris per longitudinem costulis seu sulcis undique distinctus, quos inter frequenter lacunas, seu cellulae conspiciuntur.

Horti Florentini

121

siuntur figura irregulari. Die 30. Martii in Arboreto Horti collegii Micholius.

BRYONIAE subiunge.

Fertile, seu fructifera est. V. Pontad. Anthol. 280. Florum sellionem acuminatae linear tres longae sunt, unam ferme latae, ex albo pallentescentes; Tuba autem revoluta pelvisformis est, & quinquiesariam scissa.

Pag. 18.

BUGULAE 4. subiunge.

Huius folia quandoque inferius purpureasunt; secundae autem speciei dum tenera planta est, viridia prorsus sunt, dum vero senescit Mense Iulio prorsus atrovirentia.

Bupthalmi species, quae in Horto coluntur sic aptius describentur. BUPHTHALMUM Tanacetii minoris foliis (flore luteo minore) C. B. Pin. 134. Inst. R. H. 495. Chrysanthemum in rudribus Caesalp. 444. Buphtbalmo Martb. 959. Cass. 81. Mich. Rar.

2. Idem flore maiore Mich. Rar.

3. Buphtbalmum Tanacetii minoris folio, flore albo Inst. R. H. 495.

4. Idem maius. Chrysanthemum Tanacetii folio, flore albo, montanum italicum Barr. Leon. 466. au Buphtbalmum alpinum flore candido Triumf. Obs. 79. Mich. Rar.

BUPLEUROIDI subiunge.

Plantae huius, quae bieme Auni superioris perit, florem procul dubio rosaceum, qualemque describit Boerhaavus observasse me memini, cuiusque petala scorsim singula, non autem cohaerentia decidere.

Pag. 19.

CACHRYDI 3. subiunge.

Est Panacis Hercules alterum genus ex Sicilia Caesalp. 311.

CACHRYDI 4. subiunge.

Præcox est, foliorum lobos profert angustiores, nitidos, & quasi lucidos, serratos, umbellaeque albas nudas.

CALAMINTHAE 3. subiunge.

Utraque foliorum juniorum facies, praesertim inferua, undò oculo inspecta apparet quodadmodò perforata, per microscopium vero alveolis rotundis excavata, in quorum fundo glandula videtur baemispbaerica laevis, assidue Balsamum pellucidum exsiliant, quod in guttulas coarctatur, & crassificat, plantamque odoratam facit: Reliqua foliorum superficies rarissimis villis vestitur.

CALAMINTHAE 6. subiunge.

Humilis Planta est, in plures ramulos divaricata: Folia linear decem la-

ta profert, duodecim longa, raris pilis vestita, & glandulis odoriferis undique confersa. Verticilli florum lati & rarius digesti sunt, pediculi autem florum lineat ferme quatuor longi sunt, & calyces sesquilineam longi; flores tandem dilute carnei sunt, tubo quadrilincari instructi, ac labio inferiori macula circulari alba, punctulisque rubris variegato.

CALAMINTHAE 7. subiunge.

Est *Thymra flosculis candidis* Dod. Pempt. 288. *Satureia montana flosculis candidis* C. B. Pin. 288. *Satureia durior* L. B. 3. 272. *Thymum italicum floribus candidis* Caesalp. 460 Mich. Rar. Flos quandoque totus nreus est, quandoque circa rictum punctis carneis variegatus. Apices tutto carnei sunt, deinde violaceum colorem induunt. In Monsi D. Istriani, & Montium Aouanensium Agri Pisani facie meridionali ipsa etiam hieme tepida, in Alpibus item Lucensibus Anxeri Fluvio proximis, & in ipsis Petrae Apennae ingit, licet frigori ferme persistit damuatis, lactissime in rupium fissuris germinat simul cum sequentis specie, seu maioris varietate.

9. *Calamintha frutescens Satureiae folio facie & odore, flore dilute purpureo. Satureia montana floribus purpureis* C. B. Pin. 218. *Thymra flosculis dilute purpureis* Dod. Pempt. 288. *Thymum italicum floribus modice purpureiscentibus* Caesalp. 461. Mich. Rar. Colore florum vel dilutiore vel saturatione plurimum variat. Utraque autem species odorem suavissimum & vivacem spirat, cuius sedes est Bussanum, quod larga fassit copia & Glandulis per totam foliorum superficiem conspicuis exundat.

CALCITRAPAE subiunge.

2. *Calcitrapa Officinarum flore purpurascente* Vaill. in A& Acad. R. Sc. 1718. pag. 209. num. 1. *Carduus stellatus, sive Calcitrapa* Insl. R. H. 440.

3. *Calcitrapa Officinarum flore albo* Vaill. Ibid. *Carduus stellatus, sive Calcitrapa flore albo* Insl. R. H. 440.

CALCITRAPOIDI 3. subiunge.

Flosculi bisformes sunt; marginales nempe steriles, tuba destituti, quinqueviam & inequaliter fecti; discordei viro integri, coronati, tuba vaginamque instructi. Semina papposa non sunt, verum corolla lineari villosa ornantur, insidentque Thalamo villis vestito.

Pag. 20.

CALTHAE subiunge.

Planta perennis est, semperque virens, & fruticosa. E radice plures emittit caules lignosos ulnam ferme longos, procumbentes, & extrema tantum parte in aliam sese attollentes: folia ipsos undique ornantia crassa sunt, valida, integerrima, ad oras undulata, aut crispata; iuniora stem cuticula squamosa albo decedna in margine vestiantur. Basis foliorum caulem dimidium amplectitur, eorumque costa per caulis superficiem tantillum propagatur. Flores & summi ramulis prodeuntes intus, & extra lutei, unciam lati, semiflosculis 23. corollis confusis, lineas novem longis, tubo hirsuto, linguamque in tres uentus partes leviter fissa; flosculos item discordeos gerunt tubo pariter hirsuto donatos. In ceteris, ac praesertim seminum forma, a Caliba vulgari non abindit, si villos

los excipias densiores, quibus planta universa integitur, quique Balsamum non adeo glutinosum, nec gravosius ut in Caliba armeni, & vulgari fundant.

2. *Caltha vulgaris* flore pallido C. B. Pin. 275. Inft. R. H. 498.
3. *Caltha vulgaris* flore citrino C. B. Pin. 275. Inft. R. H. 498.
4. *Caltha vulgaris* flore rufo C. B. Pin. 275. Inft. R. H. 498.
5. *Caltha polyanthos maior*, flore aureo C. B. Pin. 276. Inft. R. H. 498.
6. *Caltha polyanthos maior*, flore melino C. B. Pin. 276. Inft. R. H. 498.
7. *Caltha prolifera maioribus floribus* C. B. Pin. 276. Inft. R. H. 498.
8. *Caltha prolifera maioribus floribus*, flore mellino H. R. Par. 35. Inft. R. H. 498 V. Vaill. in *Act. Acad. R. Sc. A.* 1720. pag. 372. Fior rancio vulgo promiscue vocantur a colore *Mali Aurantii* corticem imitante.

CAMPANULAE 1. *subinng.*

Fœtida est, glabra, & lactescens, floribus caeruleis.

CAMPANULAE 2. *subinng.*

Flores intus pilosi sunt, infidentque calyci patulo.

CAMPANULAE 13. *subinng.*

14. *Campanula Alpiua saxatilis*, foliis angustis serratis subincanis & tomentosis, floribus parvis albis in capitulum sphaericum digestis. *Campanula Alpiua sphaerocephala* C. B. Pin. 94. Inft. R. H. 110. *Trachelium minus pentraeum* Ponae Bald. in folio CCCXXXIII. I. B. 2. 801. *Trachelium maiori pentraeum* Ponae simile, si non idem I. B. 2. 802. Mich. Rar. qui e Monte Baldo attulit.

CAMPHORATAE *subinng.*

Calyx florum bilinearis est, ventricosus, ore angusto in quatuor tantummodo partes fello, quarum duae se invicem respicientes ceteris ampliores sunt. Semen oblongum est, ferri Equini figura, seu seminis Kali hirsuti simile; proindeque a charactere Camphoratae Tournesfortiani abluat. In Littore Liburnensi inter Urbem Montemque Nigrum copiose fruticat.

CANNABINASTRO 4. *subinng.*

Floris labium superius integrum est, & cochlearis instar excavatum; inferius autem in tria segmenta divisum, quorum medium longius est, & sinuatum, lateralia vero exigua, obtusa, & prominentiis filiformibus circa faucem munita. Pistillus abis in quatuor semina pyramidata, quae nidulantur in calyce campaniformi.

5. *Cannabinastrum campestre* annuum foliis oblongis serratis ad petiolum rotundatis, flore parvo albo, calycibus brevibus, radiis trilinearibus. Mich. Rar.

6. Idem flore rubente Eiusd. In Agro Bargeusi in reditu Bargam a Melandino quod Corjonae Fluvio adiacet, copiosum utramque sordens florens excurrente Ostiobri.

Pag. 21.

CAPRIFOLIO 3. *subinng.*

Flores seni & quolibet verticillo seu acetabulo prodeuntes sesquiuales sunt, inter.

interne candidi, externe carnei, per senectutem flavicantes, odorati, quorum labium superius latius est, in quatuor rotundas lacinas eleganter divisum. Stylus, & stamina breviora sunt quam in praecedentibus speciebus. Semina rotatum posita, nullis squamis ab invicem distincta, ovata sunt, & eleganter coronata.

CARDAMINE 1. subiungetur.

Radice repente donata est, floribusque albis.

CARDAMINE 5. subiungetur.

Petala obtusa sunt, sesquilineam ferme longa, semilineam lata, & candida: Stamina item candida sunt, apices ochroleucos sustinentia.

CARDIACA 2. subiungetur.

3. Cardiacae foliis tenuius & profundius iocosis, villosa Amman. Rar. 50.

CARDUO 2. subiungetur.

3. Carduus molchatus flore amplo, capite reflexo Flux Alm. 83. Carduus mutans L. B. 3. 56. Infl. R. H. 440. Vaill. in Alt. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 195. num. 1.

Cardui species duas in Catalogo descriptas Michelin Rar. ad Cirsii genus revocavit; Primam autem appellavit Cirsium palustre altissimum, Alphodeli radice, foliis laeocatis, caule alato, capitulis parvis confertis. Cirsium palustre lanseatum, caule alato, polyanthemum Vaill. in Alt. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 202. num. 14. Alteram vero Cirsium parvum annuum, Acanthi folio, flore purpurascens.

Pag. 22.

CARLINEAE 3. subiungetur.

4. Carlina cauliscens magno flore albicante C. B. Pio. 380. Vaill. in Ab. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 220. num. 3. In Alpibus Apuanis copiosam invenit, praesertim circa Mercurii Metalla Levittawensia, & Argenti Metalla vulgo il Bostino dicta.

Thalamus, seu fundus florum Carlinae duplici substantia constat, quae per senectutem facile distinguitur, quemadmodum in pilcolis Suillorum accidit. Inferior enim Thalami pars carnea est, & per senectutem fungosa; superior vero ebaritilaginea, & in plurimas cellas quadratas distincta, Onopordi instar. Cellulae singulae fundum convexam habent, & foramine ovali perosum, quo per arterias ab inferiori parte nutrimentum in semina distribuitur. Membrae quae cellulae parietes constituent ab invicem distinguuntur, & in filamenta plura sciuntur eleganter capitata, flosculorumque tubarum acuminata. In unaquaque cellula videtur semen pappo instructum. Petala plana, seu squamae coronam constituent, inferiori calycis parti adhaerent. Non tantum quarta haec, sed etiam prima species, aestivo tempore, e foliis aculeatis calycem cingentibus copiosum Gummi fundunt, quod Ixia in Officinis vocatur. Radicum cortex Aromaticus est, & Saccharo conditur in quibusdam stomachi vitiiis cum successu adhibetur. Calycis florum pars carnea a squamis, & lanugine purgata in cibum assumitur. Species 1. folia Onopordi vulgaris forma, ac binor, ternosque flores

flores ampliffimos, Cinaræ fativæ inflar, profert. Abunde autem provenit in Montibus Clusentinatibus la Confuma dictis; in Monte quoque Scalaro in loco dicto la Casa al Monte germinantem inveni.

CARYOPHYLLO 2. subiunge.

Villi in centro floris firi per microscopium observati, colorem florum Amaranthoidis exprimunt.

CARYOPHYLLO 5. subiunge.

Folia Graminea sunt, tenuissime serrata, & obtuse mucronata: Floris color ad rosæum vergit. Petala lineas 14. longa sunt, septem lata, ad extremitatem rotundata, & altius serrata, & calyx inaequaliter dentatus, ac duobus foliis per basin circumdatus. Caeterum Caryophylli florem non polypetalum, sed monopetalum, in quinque vel plures lacinias ad centrum usque divisum esse, Micheliuss assertit in sebedis.

Pag. 23.

CARYOPHYLLO 8. subiunge.

Petalorum pars inferior viridis est.

CARYOPHYLLO 9. subiunge.

Speciem hanc Micheliuss in Adversariis ita descripsit.

Caryophyllus minimus, erectus, subasper, caulibus palmaribus, ramis magis expansis, foliis tenuissimis, floribus purpurascens, solitariis, petalis cordatis integris tres lineas longis & unam latis, calyce costulato. Betonica Coronaria, sive Tunica minima l. B. 3. 337. descripti. Caryophyllus Gramineo folio minimus Raii Hist. T. 2. 1002. num. 4. Syll. 89. In montibus Florentinae Urbis sponte germinat.

CARYOPHYLLO 10. subiunge.

Repens est, & Polygoni folia perexigua habet. Petala quatuor sunt, circa umbilicum exalbida, linear quatuor longa, & unam lata: coraccula brevissima sunt: calyces vero costulati, & duobus tantum foliolis per basin circumdati.

11. Caryophyllus Sinenis lupinus, Leuconi folio, flore vario Tournef. in Aëlis Ac. Sc. A. 1705. Boerch Ind. Alt. H. Lugd. Bat. Part. 1. 219.

12. Idem flore pleno Eiusd.

13. Caryophyllus, qui Tunica ramosior, flore candido cum corolla purpurea H. Elixam. 401.

CASSIDAE 5. subiunge.

6. Cassida palustris, vulgaris (repens, angustis folia, glabra) flore caeruleo Infr. R. H. 182.

7. Cassida palustris minima (repens, foliis angustis acutis & bifurcatis) flore purpurascens Infr. R. H. 182. Mich. Rar. E. Palustris Blentinsibus, & Pisaniis attuli.

CATARIAE subiunge

2. Cataria Lusitanica erecta, Betonicae folio, tuberosa radice Infr. R. H. 102.
3. Cata-

3. *Cataria* maior foliis oblongis, pyramidatis, acutis, ad petiolum aequalibus, spicis brevibus, floribus albis. *Mentha Cataria* J. B. 3. 225. *sed descripta.* *Herba Gatta* Cast. 212. *Cattaria* sive *Mentha Catti* Lob. Ic. 511. *Herba Felis Matthioli* Lugd. 908. Mich. Rat.

CEDRO *subiunge.*

An Juniperus Bermudiana H. L. 345. Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. Part. 2. 208. cuius elegantissima Icon. vivis coloribus expressa exhibetur Tab. 1. *Catalogi Plantarum tum exoticarum tum Domesticarum, quae in Hortis haud procul a Londino suis in venditionem propagantur.*

Ad hoc Cedri genus revocandae sunt Sabinae species in hoc ipso Catalogo descriptae pag. 83.

CENTAURIUM MINUS annuum, glaucum, perfoliatum, foliis latioribus & brevioribus, acutis, floribus luteis polypetalis, calyce bilineari, denticulis angustissimis. *Centaurium luteum perfoliatum* C. B. Pin. 278. Inft. R. H. 123. *Centaurium minus perfoliatum luteum umbellatum* Bar. Icon. 515. n. 2. 1. *Centaurium luteum* Camer. Epit. 427. *Centaurium luteum alterum* Lugd. 12. 91. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

2. Idem foliis angustioribus. *Centaurium luteum perfoliatum angustifolium* C. B. Pin. 278. *Centaurium luteum prius* Lugd. 1290. Mich. Cat. Plant. A. Flor.

3. *Centaurium minus*, annuum, floribus purpureis in parvas rariore & minus compactas umbellas digestis. *Centaurium minus flore purpureo* L. B. 3. 353. *Centaurium minus* Matth. 692. Fuchf. Hist. 386. Mich. Ibid.

4. Idem floribus crebris, in parvas umbellas magis compactas digestis. *Centaurium minus* Dod. Pempt. 336. Ic. Cam. Epit. 426. *Centaurium primum* Lob. Icon. 401. Mich. Ibid.

De Centaurii maioris speciebus V. inferius adnotata ad Rhapontici species.

CERASO 2. *subiunge.*

Calycis florum concisus, seu cystiformis est, margine repando, & in quinque dentes diviso, laminaeque obvallato: petala inter dentium, seu laciniarum calycis divisiones nascuntur, oblonga, & in extremitate rotundata.

CERATOSPERMO *subiunge.*

CERINTHE maior annua, Glasti folio maculato & spinoso, flore maiore luteo vel flavo, cum ore denticulato, denticulis deorsum reflexis. *Cerinthe quorundam maior, spinoso folio, flavo flore* L. B. 3. 606. Inft. R. H. 80. *Cerinthe flavo flore, asperior* C. B. Pin. 258. Rati Hist. T. 1. 506. *Cerinthe quorundam maior flavo flore* Clusf. Hist. CLXVIII. Mich. Rat.

2. Eadem flore ima parte rubro, summa vero luteo Ejusd.

CHAEROPHYLLO *subiunge.*

2. *Chaerophyllum sylvestre* aeternum, geniculis tumentibus Inft. R. H. 314.

Pag. 24.

CHAMAE CERASO 2. *subiunge.*

3. *Chamaecerasus Alpina* fructu gemino rubro, foliis longioribus acutis Mich. Rat.

De Chamaedry 4. vide sit adnotata ad Teucrium pag. 93.

CHA.

CHAMAEDRY 6. subinuge.

Ad Teneii Genus revocavit Michélinus Rar.

Superior foliorum faeces villis rarisioribus, ac brevioribus obsita est, inter quos plurimas emigat glandulae sitae sunt, & quibus extillat Balsamum pellucidum; in infima etiam parte, in adulta Planta, intra villas longiores & magis implicatos, glandulae similes lateat, & quibus Balsamum odore acatioris praeditum extillat.

CHAMAEDRY 8. subinuge.

Annua est, & birsuta: folia oblonga serrata praefert, & flores albos. Notari meretur Plantam hanc singulis octo, vel decem annis sponte per Horti solum variis locis nasci. Idem contingit Ricinoidi ex qua paratur Tournefol Gallorum Inst. R. H. 655. & Tithymalo argenteo maritimo leptophyllo Lael. Triumpheti. Sexdecim saec. annorum spatio Chamaedryn hanc, & Tithymalum semel tantum, Ricinoidem vero ter renatam vidi. Talis miraque seminum incorruptilitas Phyticis, & Agriculis opportuna corollaria ministrabit.

9. Chamaedrys palustris, canescens, fruticosa, Cretica, flore purpureo, quam Michélinus ex ultimo suo itinere advexit, sibi a Cl. Leonardo Sesler, et patre, communicatam.

CHENOPODIO 1. subinuge.

Planta ad trium spirituum mensuram attollitur. Flores in spicis ramose digesti sunt, quos spicae summities occupant, primitus expanduntur. Calyx in quinque subrotundas partes sellus est, cochlearis instar excavatas, intus candicantes, extus in medio virides, margine foliaceo candicante auctas. Stamina quinque sunt, pellucida, calycis squamis duplo longiora, apices citrinis didymos, & Malvae Moschatae similes subfissentia. Centrum floris occupat Placenta orbicularis, depressa, viridis, in summite stilo rubro bipartito brevis instructa, & maeo quodam glutinoso per totam superficiem illita. Flore nondum expanso singulorum flaminum apices glutinae isto implicati placenta firmiter adhaerent, & calycis squamis invicem appresse integuntur; affluente vero apicibus, flaminibusque novo nutrimento, sensum ipsi targescent adeo intra calycis squamas latere amplius non possint; quinimo earum ab invicem distrabunt, & biare cogunt. Recluso igitur, expansoque flore, Solis caliditate gluten, quo, ut diximus, Placenta, seu Embryonis calyptra inficitur, enervat, aut exsiccat, fibrasque flaminum rigidiores ita efficit, ut flamina ipsa a glutinis vinculis soluta elateris vi quadam erigantur, expandantur, & calycis squamas superpositas deorsum distrabant. Idem ferme accidit sicut apices a glutinis nexa liberaveris. Placenta, seu Embryo ab ista fructum involuero rubro, punctulis sen alveolis pellucidis affabre distincto, tellum, & nato semine nigro splendente fetum. Barrelierii leoa rudis admodum est, nec plantae faciem exprimit.

CHENOPODIO 2. subinuge.

Flor, seu Calyx ad medium usque sellus est in quaque parte tenuissima in summite laciata. Stamina quinque habet brevissima, apicem breviter subfissentia, & embryonem stipantia, qui pyramidalis est, trigonus, basi, vel parte ampliore sursum elevata, tribusque capillamentis in summite donatus, at unico semine nigro splendente reniformi, seu in basi rostrato, fetus. Calyx fructum non vestit.

CHE-

CHENOPODIO 3. subiunge.

Flores a prima specie non abstant, si filamenta, seu stilos embryonis longiusculos rubros excipias. Pulvisculas albus, quo universa Plantae superficies vestitur tanquam si cinere adpersa esset, ut adnotavit Caesalpinus, per microscopium visus, nil aliud apparere esse, quam vesiculas minime, oviformes pellucidae, plantae cuti adfixae.

CHENOPODIO 6. subiunge.

Planta haec Mexicana climati nostro adeo adsuevit, ut sponte, & frigeribus iuvetta in Arvi ripis, & saliculis molesta copia nascatur. Ceterum haec, & superior semen proferunt nudum, seu majoris calyptrae non involvum; easque ad Botryos Genus revocavit Michelius Rar.

CHENOPODIO 8. subiunge.

Folia glauca, obtusa, & carinata profert, semenque rostratum. Hoc & sequens Michelius Rar. ad Kali genus revocavit.

CHENOPODIO 10. subiunge.

Flores herbaceos profert, semenque coeleatum; proindeque Michelius ad Kali Genus revocavit Rarior.

11. Chenopodium altissimum Botryoides Amman Rarior. 165.

Pag. 26.

CHRISTOPHORIANAE subiunge.

Calyx floris nondum expansi sphaericus est, constatque quinq; foliolis; duobus nempe exterioribus subviridibus, & admodum cucullatis, quae tria folia pariter cucullata, sed minuscule, & candida includunt. Petala quatuor tantummodo sunt, lineae duae longae, & tertiam lineae partem lata, candida, e quorum centro surgit pistilla facie vitta semen referens, obtrunc, 44. flaminibus ad basin stipatus, quae apices lanceatos & breviores substat.

CHRYSANTHEMO 3. subiunge.

4. Chrysanthemum folio Matricariae C. B. Pin. 134. Boeth. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. p. 1. 105.

5. Chrysanthemum folio Matricariae, flore luteo pleno Eiusd.

6. Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. Eiusd.

7. Chrysanthemum folio Matricariae, flore albo pleno H. C. Eiusd.

8. Chrysanthemum folio Matricariae, floris radiis sulphureis, disco aureo Eiusd.

9. Chrysanthemum folio Matricariae, flore magoo bullato fere nudo Eiusd.

CHRYSOCOME subiunge.

Est Conyza Linariae folio Vaill. in *Act. Acad. R. Sc. A.* 1719. pag. 397. num. 3. A Conyzae tamen Genere sejunxit Michelius Rar. & Chrysocome restituit, eo quod flores & folia strobilulis hermaphroditis consistant, non autem semistrobilulis quoque, ut Conyzae maiori vulgari C. B. contingit. Thalamas praeterea, cui strobiluli insident, cellulatus est, Onopordi instar, eiusque cellula-

rum

rum anguli in limbum angulosum eleuantur, nullis tamen foliis, seu squamis munitis, quibus flosculi ab invicem distinguantur, quemadmodum in eadem Conyza maiore. Semina longo pappo instructa sunt. Calyx coni inversi figura squamis longis constat, acuminatis, & in summite reflexis.

2. Eadem minor. In collibus argillosis secus viam Regiam Pisanam, praefertim di San Romano, & della Rotta distis, nec non in Ericetis Aquae Tettuccianae prope Montem Catinum Vallis Nubulae copiosam inveniri. Licet autem humilior, & gracilior superiori specie sit, flores praefert mascululos, & amplioribus flosculis ornatos. Quidam ex his per senescentem colorem mellinum, vel rubentem elegantissimum assumunt.

CICHORIO 3. subiunge.

4. Cichorium silvestre, folio angusto simpliciter laciniato, flore caeruleo maiore Mich. Rar.

5. Cichorium silvestre, Erysimi folio, flore caeruleo. An Cichorium silvestre, Picris Dod. Pempt. 635. Seris Picris silvestre Fuch. 679. Mich. Rar.

6. Idem flore minore. Cichorium silvestre angustifolium Lugd. 577. Cichorium folio valde angusto Caesalp. 507. Cicorea Salvatica Matth. 532. Mich. Cat. Plant. Agri Fior.

CICUTAE subiunge.

2. Cicuta minor Petroselinum similis C. B. Pin. 160. Infr. R. H. 306.

CINARAE 5. subiunge.

In collibus argillosis secus viam quae ab Urbe Volaterrana Salinas ducit, le Moie di San Giovanni, detorta a Muria nomine, vocatur, Oltobri Mensis germinantem inveni Cinarae silvestris speciem, quae folia angustissima, multifariam laciniata, Acutis aculeatis quodammodo similia, & aculeis flavescentibus in loborum summite instructa praefert. Caulis effeti, aridique pedales erant, calycemque sustinebant oblongum, cuius squamae in validum aculeum desinebant. In Hortum translata caulem floriferum nondum emisit: num igitur esset Cinara silvestris spinosa Rati Syllog. 289 vulgo Sgalera? quam Michelini Rar. per plantitum Crassetanum abunde nasci testatur?

CIRSIO 6. subiunge.

7. Cirsium Creticum altissimum, Cardui lanceolati folio Coroll. Infr. R. H. 32. Vaill. in Ab. Acad. R. Sc. A. 1718 pag. 201. num. 1.

8. Cirsium Acanthoides in foliorum ambitu spinis mollibus creberrimis hirtum, flore flavescente. Carduus alpinus Carlinae folio & facie, flore flavescente D. Michæli Vaill. in Ab. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 203 numer. 21. Mich. Rar.

9. Cirsium Asphodeli radice, foliis magnis incanis. An Cirsium maximum Asphodeli radice Infr. R. H. 447. Mich. in Advers.

10. Cirsium tuberosum capitulis squarrosis H. Eltham. Semina ab ipso D. Dillenro accepti.

Pag. 27.

CITREO 3. subiunge.

4. Citreum, quod Malum Citreum flore pleno, & fructu prolifero Flor. Norimb. 117. Cedro di Fiore, e Frutto doppio.

R

CLE-

CLEMATITI 1. *subiunge.*

Petala florum lineata quinque sunt, sesquialteum lata, utrinque acuminata; apices autem pallidissimi.

CLEMATITI 2. *subiunge.*

Floribus itum onusta apparet, quam sequentis speciei flores omnes deciderunt; petala autem profert angustissima.

CLEMATITI 4. *subiunge.*

Petala plerumque quatuor gerit, quatuorque autem quinque, seminealia, sesquialteum longa, utrinque acuminata; stamina vero alba, & apices pallidos.

CLEMATITI 8. *subiunge.*

Ad singulos nodos polyphylla est, & geminis capreolis donata. Flores albos solitarios profert, calyce monophyllo mixtato instructos.

CLEMATITI 11. *subiunge.*

Hanc & sequentem speciem ad Viciellae genus cum Dillenio revocavit Michelinus Rarior.

CLINOPODIO 2. *subiunge.*

3. Clinopodium perenne Pulgii odore, Maioranae folio, Patavinum Bocc. Mus. part. 1. pag. 60. Tab. 45.

4. Clinopodium Canadense fistulosum, foliis dilute virentibus & hirsutis Boeth. Ind. Alt. H. Lugd. Bart. part. 1. 158.

Pag. 28.

COMELINAE *subiunge.*

Est Comelina procumbens annua, Saponariae folio H. Eltham. 91. Tab. 78.

In CONVOLVULI 2. nomine pro nigra & angulatis scribere magis angulatis.

CONYZAE 1. *subiunge.*

Huius Plantae flores, quemadmodum adnotavit etiam Michelinus, non e suis flosculis componuntur; verum & veris quoque semiflosculis simplicibus tuba instructis, qui peripheriam corymborum occupant, & flosculorum numerum excedunt. Praeterea thalamus, qua parte semiflosculi ipsi siti sunt, foliolis quibusdam angustissimis oritur, quae semiflosculos ab invicem distinguunt. Talis autem character nulli e ceteris Conyzae speciebus hactenus notis communis est.

CONYZAE 2. *subiunge.*

Ad Eupatirii Genus revocavit Michelinus Rarior. Corymbos cylindraceos profert, quorum calyx non squamosus est, sed paucis simplicibusque foliolis aequalibus, unaque serie digestis constat. Intra calycem siti sunt flosculi minus omnes formae, hermaphroditi nempe. Semina pappo instructa oblonga sunt, compressa, angulosa, seu costulata, & in acumen terminata, quod nervi brevissimi ope adhaerent forameni papillarum quibus thalamus nudus scatur.

Pag.

Pag. 29.

CORIARIAE *subiunge.*

Flos femininus petala quinque gerit, quae conspicua potissimum sunt in flore effeto; tunc enim duplo ferme maiora calycis squamis adparent. Mich. Advers.

CORONAE SOLIS 4. *subiunge.*

Caulis lignosus proferi; folia autem aspera & coningata. Semistostoli ovati sunt, lineas novem longi, quatuor lati, tubo nigro, nulla tamen tuba instructi: flosculi autem tuba bifida, & vagina, tubaque purpurea muniuntur, ac squamulis quibusdam ab invicem separantur. Semina nuda sunt, seu duabus tantummodo squamulis in summitate orata.

CORONOPUS 3. *subiunge.*

4. *Coronopus silvestris, perennis, hirsutus, foliis humifratris, modo latis, modo angustis, cum appendicibus modo magis, modo minus laciniosis. Coronopus, seu Herba stella silvestris, foliis profunde laciniosis Ercae similitudine Caesalp. 329. An Coronopus silvestris hirsutus laciniosior H. Catbol. Rati T. 3. pag. 434. Mich. Rar. Per Viam Regiam Pisana, in sabuloso colle circa veterem Arcem Montis Lupi germinantem invenit.*

COTINO *subiunge.*

Siccissima Aestate, Augusto exarante, e micimis corticis fissuris extillabant guttulae Terebinthinae cuiusdam pellucidae, lentae, quae odore & sapore Larignum adamussim referebat.

2. *Cotinus floribus, fructibus, & capillamentis ex albo flavescens. Scoparium vulgo Caesalp. 75. Mich. Cat. Plant. Agri Flor. In caeduis sylvis per Montem Maurillum Florentiae proximam sponte provenit.*

CRAMBI *subiunge.*

Florem proferri luteum in spicas digestam; petala autem cordata, fructusque asperos, non ita facile per se debilescentes, & in tria inaequalia locnamenta divisi, in quorum singulis nascitur semen atrum nidulatur.

Pag. 30.

CRATAEGUS 2. *subiunge.*

3. *Crataegus folio oblongo, serrato, utrinque virente Inst. R. H. 633.*

CROCO 3. *subiunge.*

Flos sativus minor, inodorus est, dilute carneus, tantillo liore infellus, nisi quod tria petala exteriora, atque ampliora, lineis quibusdam purpureo-ceruleis orantur. Filamenta lutea sunt, brevia, & ianilia. A. 1743. dum iustrarem vestigia veteris Pisani Portus prope Liburnum, Croci huius plantae aliquot ipso Iamario Mense floridas repperi: Plurimas autem obvias habui Mense Martio A. 1745. dum Aluminis fodinas in Agro Montis Rotundi Orate Maritimae Scatenis inspicerem.

R 2

CRU-

CRUCIATAE 2. *subiunge.*

Viticuli ab imo ad medium birsuti sunt, superiori parte glabri.

CRUCIATAE 3. *subiunge.*

Est Cruciata palustris alba, foliis glaucis in eadem planta nunc binis, nunc quaternis, modo latis, modo angustis, interdum brevibus, interdum longioribus, floribus exiguis paniculatum nascentibus, fructu Coriandri forma Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

CUCUMERI 2. *subiunge.*

GUMINOIDES vulgare Inft. R. H. 300.

Pag. 31.

CYANO 3. *subiunge.*

Haec & sequentes species a Vaillantia in Aft. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 230. ad Amberboi Genus revocatas fuere, primaeque appellata Amberboi flore incarnato odorato. 2. Idem flore albo 3. Idem flore luteo odorato.

CYANO 5. *subiunge.*

6. Cyanus montanus angustifolius purpureus Barr. Obf. 964. Sc. 1323. Vaill. in Aft. Acad. R. Sc. 1:18. pag. 234. num. 9.

7. Cyanus alpinus capite pennato Inft. R. H. 445. Vaill. Ibid. num. 10.

CYTISO 1. *subiunge.*

Est Cytisus glaber, viridis, foliis in rotunditate acuminatis, cauli immediate adhaerentibus, floribus luteis spicatis, calyce brevissimo, siliquis latis nitidis Mich. Rar.

CYTISO 2. *subiunge.*

Folia inferna villosa sunt.

CYTISO 8. *subiunge.*

Est Cytisus spicatus flore purpureo Inft. R. H. 648 Cytisus praecox spicatus, rubello flore, caule rubro Boec. Mus. Paris. 2. 31. Tab. 19. ex Mich. Rar.

Pag. 33.

DENTI LEONIS 1. *subiunge.*

Folia cuneata, inaequaliter laciniata, & subbirsuta proferunt.

DIGITALI 6. *subiunge.*

7. Digitalis peregrina glabra, foliis coniugatis non serratis, floribus villosis dilute purpureis. *Dracoccephalus latifolius glaber Lysimachiae luteae foliis Mor. Hist. Oxon. part. 3. 417. Sect. 11. Tab. 11. fig. 2. Mich. Rar. Quod proinde Morisonii synonymon pag. 34. huius Catalogi adendum est.*

DIMOR.

DIMORPHOTHECA foliis incisis, ovarii minoribus. *Caltha Africana* flore intus albo, foris violaceo Infr. R. H. 499. Vaill. in *Act. Acad. R. Sc. A.* 1720. pag. 361. num. 3.

DISPACO *subiunge.*

Folia, caulis, & foliola circa capitula spinosa sunt.

2. *Dispacus silvestris* non perfoliatus, foliis serratis per basim in duas laciniis pterumque divisis, capitulis rotundis exiguis albis, squamis latis ad oras aculeatis.

3. *Dispacus silvestris* capitulo minori, vel *Virga Pastoris* minor Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 2. 133. Mich. Rar.

DORIAE 3. *subiunge.*

Hanc ad Solidaginis Genus revocavit Michelin Rarior.

Pag. 34.

De DRACOCEPHALO vide sit *superius adnotata ad Digitalem.*

ECHIO 5. *subiunge.*

6. *Echium* lato *Plantaginis* folio, *Italicum* (annuum, flore magno purpureo) Barr. Obs. 16. num. 143. *Lycopsis Plantaginis folio Italica* Eurd. Icon. 1026. *Echium* annuum latis *Buglossi* foliis H. Pis. *Echium Alcibiadis* maximum, foliis *Buglossae* minoribus & asperis, floribus caeruleis magnis Mentz. Pag. *Echium latissimo folio, Lycopsis distum, flore dilute purpurascens* H. Lugd. Bat. *Echium purpureo campanulato flore, folio subrotundo* H. Catbol. App. 3. *Anchusa maior* Chesalp. 435. *Lycopsis* C. B. Pin. 255. *Lycopsis Diofcoridis* quibundum L. B. 3. 584. *Cynoglossa vera* Matt. 1248. Mich. Rar. In ipsa *Pyramidum Urbe*, in Prato inter *Primatiales* *Basilicam*, & splendidissimum *Cotometerium* suo nuncitur.

ELICHRYSO 7. *subiunge.*

*Capitula, seu corymbos proferit cylindricos, lineas quinque longos, in diametro duas cum dimidia latus, qui squamis pluribus circumvallantur angustis, foliaceis, acuminatis, subinde decretescentibus, non splendentibus, & e viridi albicantibus. Flostuli duplicis formae sunt, qui enim circa floris peripheriam sit sunt, unico cylindrico coromato, & tuba minuto constant; qui vero interiorem floris partem occupant, lineas tres cum dimidia longi sunt, tubulati, angustissimi, circa medium nonnihil ampliati, vagina flaminea, & tuba bifida praediti, ore in quinque exilissimos dentes dilute aureos, & complanatos scisso. Insident hi summis seminum vix semilincarum, angustarum, cinereoarum, quae pappi longitudine flostulos aequantibus instruantur. Thalamus nudus est, & favi, vel Onopordi florum Thalami instar cellulatus. Non autem haec tantum *Elichrysi* species flostulis duplicis naturae praedita est, sed & aliae omnes hic descriptae.*

8. *Elichrysium obtusifolium* capitulis argenteis conglobatis, H. Elham.

9. *Elichrysium silvestre angustifolium* capitulis conglobatis C. B. Pin. 264. Infr. R. H. 453. *Chryscome* in *Moenis* *Pisanis*, foliis *Elichrysi* rarioribus, capi-

capitulo singulari in ramulorum cacumine Caesalp. 485. Mich. Rar. Non solum in Moenibus Pisanæ Urbis inter Aquaeductus Castellum, & Portam Calconensem vulgo delle Pungie dictam, ubi Vigna in Theophr. nasci asserit, sed & in Montibus Pisanis, præsertim prope Balnea D. Iuliani, & prope Latomias Olivæti in rupium fissuris inveni.

10. *Elichrysium spicatum* Insl. R. H. 453. *Chrysocome alia* in montibus, pluribus capitulis in unum aggregatis Caesalp. 485. Mich. Rar.

ELMINTHOTHECA hispida perennis & vulgaris Vaill. in Aë. Acad. R. Sc. A. 1721. pag. 269. num. 6. *Hieracium asperum* majori flore in lœtibus agrorum Insl. R. H. 469.

2. *Elmintothea hispida*, vulgaris, annua Vaill. ibid. *Hieracium Echinos capitulis* *Cardus Benedicli* Insl. R. H. 471.

3. *Elmintothea Alpina*, perennis, aspera, Buglossi folio Mich. Rar. Tres hæc Plantæ in hoc ipso Catalogo inter Hieracii species descriptæ fuerant sub num. 9. 10. 11.

EPHEDRAE 1. subinæ.

Masculina Planta est; flores siquidem tantummodo steriles præfert Mense Maio e nodis ramusculorum, quales Cl. Linnæus describit Gen. 766. sequens autem species flores femininos tantummodo gerit.

ERICAÆ 2. subinæ.

Est Scopæ floribus albis Caesalp. 104. Flores odorati sunt.

ERICAÆ 3. subinæ.

Incunte Autumno floram rudimenta præfert herbacea, quæ non nisi Februario Mense expandi incipiunt, ac per totum Maium durant. Bilineares hi sunt, comici, seu ampullæformes, coriacei, dilute purpurei, ore in quatuor dentes fissi. Stamina gerunt quinque candida, apices atropurpureos subsistentia. Stylus oblongus est, flori item concolor. Calyx quadrifariam divisis flori item concolor, & albicantibus maculis infellus, periolo bilineari appenditur, cui circa medium parvulae duæ laminulae adhaesunt albicantes, quæ florem tenellum amplectuntur.

4. *Erica alpina*, procumbens, prorsus glabra, foliis Juniperinis ex adverso quaternis, longioribus, angustioribus, & veluti marginatis, ac costa donatis, floribus dilute purpureis, bilinearibus, uno versu dispositis, calyce longiori Mich. Rar. In Alpibus Petrae Apuanæ secus viam quæ Barga Stazicem ducit, inter Furum Volastrum & Stazicem, in rupium marmoris Lauenst fissuris abunde provenit.

5. *Erica foliis Coriis multiflora* I. B. 1. 356. Insl. R. H. 602. *Erica* 2. Matth. 170. An Scopæ floribus purpurascens Caesalp. 104. Mich. Rar. In Montibus Liburnensibus sponte provenit.

Pag. 36.

ERIOCEPHALO 6. subinæ.

7. *Eriocephalus* capite oblongo maximo, flore albo Vaill. in Aë. Acad. R. Sc. A. 1718 pag. 204. num. 3. *Carduus tomentosus* capite maiore C. B. Pin. 382. *Cirsium lanceolatum* validissimis aculeis munitus Insl. R. H. 450.

8. *Erio-*

8. *Eriocephalus parvus* lanceatus, capitulis exiguis pyriformibus purpureis Mich. Rar.

ERUCAE 3. *subiunge.*

Glabra est, foliis latis in amplas lacinias usque ad costam divisis, lobis cornu Cerui divisuræ acuminatis, & plerumque alternis, siliquis planis, semine subrotundo cinereoculso.

ERUCAE 4. *subiunge.*

Est Eruca silvestris, fruticosa, perennis, glabra, foliis latis in amplas lacinias divisis, lobis longis, angustis, non serratis, & quasi invicem oppositis, flore luteo, siliquis strictioribus, semine ovato Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

ERUCAE 5. *subiunge.*

Ramulos subsæperos gerit.

ERYNGIO 4. *subiunge.*

5. *Eryngium maritimum* rotundifolium caeruleum Mich. Rar. *In Arenoso litore ad ostium Caecinae flevit, prope Castrum ab Ampl. Viro D. Carolo Ginario recens extractum, simul cum superiori nascitur.*

6. *Eryngium montanum* Amethyslinum C. B. Pin. 386. Inß. R. H. 327.

EVONYMO *subiunge.*

2. *Evonymus latifolius* C. B. Pin. 428. Inß. R. H. 617.

Pag. 37.

FAGOPYRO 2. *subiunge.*

3. *Fagopyrum erectum*, fructu aspero Amman. Rarior. 168. *cuius femina ipse D. Amman. mecum perhumaniter communicavit A. 1737. nomine Fagopyri Sibirici, erecti, semine aspero, floribus parvis: climati autem nostro adeo illud adsuevit, ut non solum laete germinaverit, sed fructus fecundos protulerit.*

FAGO *subiunge.*

Duas huius varietates in Horto colimus, quas Micheliur Rar. ita distinxit.

1. *Fagus* fructu rotundo. *Fagus* Latinorum, *Oxya* Græcorum L. B. 1. 117.

2. *Fagus* fructu oblongo. *Fagus* Lob. Icon. 160.

FICOIDI 1. *subiunge.*

Est Melembryanthemum crystallinum, Plantaginis folio undulato H. Eltham. 231. Tab. 180. Aeris nostro adeo se accomodavit, ut vivacissima sit, & importuna ferme evaserit.

FICOIDI 2. *subiunge.*

Foliis perbelle refert Melembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo purpureo H. Eltham. 282. Tab. 211. fig. 270. & Tab. 212. fig. 271. Flores autem nondum protulit.

FILICULAE 1. *subiunge.*

Huius Plantae flores die 6. Maii observavit Micheliur: hi autem, quem-
admo-

admodum in *Adversariis* adnotavit, nil aliud sunt, quam filamenta exigua alba, seu pellucida, globulis quatuor, vel quinque invicem superpositis constant, sitaque in superficie caulium, seu pedunculorum foliorum e terra erumpentium, ac nondum expansorum, inter squamulas plures reticulatas. Polytrichi flores similes hisce sunt, & inter pinnularum divisuras nascuntur. Similes quoque sunt flores Linguae Cervinae, & Polypodii; verum ramosi sunt.

FILIPENDULAE subiunge.

Petala florum ovata sunt & integra, quandoque tamen in summitate cordata; staminibus lutea.

2. Filipendula maior foliorum tarsis angustis, & usque ad costam divisis Mich. Rar.

Pag. 38.

FOENUI GRAECO subiunge.

2. Foenum Graecum silvestre, Meliloti facie Carol. Inst. R. H. 28.

3. Foenum Graecum silvestre alterum polyceration C. B. Pin. 348. Inst. R. H. 409.

FRAGARIAE 7. subiunge.

Planta humilis est, cespitosa, perennis, cuius folia trilobata, & argute dentata, glauca lunagine pubesunt. Flores Mense Februario erumpunt circa radicem ex ulis foliorum, & e sum laminarum trium villosarum, & lutescentium, tenuium, bilinearium, & lutea basi in acumen prodeuntium, quibus ulae foliorum undique vestiuntur. Terni autem plerumque flores communi, birsuto, brevique pediculo subsistentur, carneique primum sunt, praesertim circa petalorum ungues, & costulas; tractu autem temporis candidi evadunt, brevique marcescunt. Calyx externe birsutus est, scutellatur, ferme pentagonus, fundo utrinque rubente, oreque in lucinias decem nequiles, acutas, petalis longiores seisso, & ferme repando. Margini calycis adnascuntur, brevi tamen intervallo seiuucla, petala quinque bilinearia, ex angusto principio dilatata, & in summitate leviter cordata. Singula Cyati pentagoni latera tribus linearibus staminibus caudicis, unguli vero uno tantummodo ac minori staminulo obvallantur. Stamina nitem haec omnia apices parvos luteos subsistentia embryoni ita apprimuntur, ut ipsum foventia pyramidem quodammodo basi pentagona constituent. Embryo ubi in fructum Ranunculi pratensis, aut Quinquifolii fructus imitantem, pluribus seminulis setum compressis, rugosis, tuba brevissimum caudicis instructis, ad basin villosis, confertis, & placentae cuidam virenti ac pulposae adfixis. Ad Comaroidis proinde genus a Cl. Pontaderio Anthol. 290. institutum revocanda videtur haec Fragariae species, quam sponte germinantem inveni in miceris prope Batium Oppidum Montium Pisanorum, & prope Stazzenam Pagum Alpium Apuanarum.

Pag. 40.

Est Gallium Alpinum saxatile, pumilum, caule semipalmari, erectum, foliis laticusculis a medio ad summum tenuissime denticulatis, floribus albis. scitio.

sectionibus in praetenuem pilum abeuntibus. *Rubula Alpina saxatilis* Boer.
Musf. Part. 2. 145. Tab. 101. Mich. Rar.

GALLIO 4. *subiunge.*

Est Gallium Alpinum, saxatile, pumilum, erectum, ima parte villosum;
foliis angustis, floribus albis, sectionibus in longiusculum pilum abeuntibus
Mich. Rar.

GALLIO 6. *subiunge.*

Caulis, angul., & foliorum margines denticulis tenuissimis, & vix apparen-
tibus exasperantur. Flores solitarii sunt, & in ramusculorum summitate uno ver-
su dispositi: variant autem colore saturatiore, vel dilutiore. In alpinis Pen-
trae Apuanae, praesertim a Forno Volastro cundo Stanzemam, copiosum inveni.

GENISTAE 2. *subiunge.*

Folia margine, seu fimbria quadam diaphana ornantur.

GENISTAE 6. *subiunge.*

Est Genista tinctoria Florentina maior, siliquis villosis Mich. Cat. Plant.
Agri Flor.

GENISTAE SPARTIO 2. *subiunge.*

3. Genista Spartium Italicum, minus, Linifolium, floribus luteis, siliquis
brevissimis, villosis, & obtusis, seu frontatis Mich. Rar.

4. Genista Spartium Italicum, non spinosum, iuncum & triphyllum, fo-
liis & ramis coniugatis, floribus luteis in capitulum congestis, siliquis brevioribus
hirsutis. *Genista radiata*, fove *stellatis* L. B. 1. 399. *luff.* R. H. 643.
Genista illoensis Luyd. 174. *Spartium triphyllum* C. B. Pin. 396. *Spartium mon-
tauum triphyllum* Col. part. 1. 295 Mich. Rar. quod proinde a Genistae specie-
bus, inter quas nrm. 7. descriptum fuerat seiungendum est.

GERANIO 4. *subiunge.*

Est Geranium Alpinum radice longa, foliis coniugatis ad Saniculam ac-
cedentibus, flore odorato purpureo-lanceo, petalis integris, calyce globoso
rubente, fructu brevi &c. Mich. Rar. Flor. patulus est, petalis circumatis.

GERANIO 5. *subiunge.*

Flores uno versu dispositi sunt, petalisque donantur angustis, utrinque acu-
minatis, externe albidis, interne purpureis.

GERANIO 7. *subiunge.*

Radice inerosam profert; folia coniugata, tenuiter & eleganter divisa,
florem purpureum ampliorem, petalis femineum longis, lineas quatuor latis,
cordatis & alius intus, fructumque brevem. Ex Mich. Rar.

GERANIO 8. *subiunge.*

Perenne est; folia parva profert usque ad centrum in tenuissimas lacini-
as divisa; floremque purpureum, petalis cordatis, lineas quinque longis, & qua-
tuor latis. Ex Mich. Rar.

GERANIO 9. *subiunge.*

De hac, & duabus insequentibus speciebus V. H. Eitbam.

Pag. 44.

GERANIO 12. *subiunge.*

Folia crebro & eleganter divisa profert.

GERANIO 14. *subiunge.*

Annum est: folia gerii coniugata, circinata, tenuiter divisa; flores pediculis longis insidenter, purpurorubentes, petalis tres lineas longis, unam latis; calycem amplum; semenque reticulatum. Ex Mich. Rar.

GERANIO 15. *subiunge.*

Differt a superiori, eo quod maior sit, petala florum cordata gerat, lineas duas longa, fructumque brevem.

GERANIO 16. *subiunge.*

Petala florum profert trilinear, lineamque lata, linguaeformia, ex angusto principio sensim dilatata, & in apice rotundata. Calycis folia in brevem aristam abeunt.

GERANIO 18. *subiunge.*

Flores umbellati sunt, ex incarnato rubentes, petalisque inaequalibus Violae instar praediti. Haec autem florum structura obtinet etiam in Geraniis 17. 19. 20. 21. & 22.

GERANIO 24. *subiunge.*

Petala florum rhomboidea sunt, obtuse mucronata, quinque lineas longa, tres lata.

GERANIO 25. *subiunge.*

Flores petala purpurea gerunt, ferme ovalia, & in extremitate complanata.

GERANIO 26. *subiunge.*

Est Geranium annuum, foliis coniugatis quinquepartitis, sectionibus altius divisis, floribus rubris, petalis integris, fructu brevi, semine rugoso, &c. Mich. Rar.

GERANIO 27. *subiunge.*

Annum est; Corsandra folia profert; flores autem umbellatos, purpurviolaceos, petalis angustis integris, lineas quatuor longis; fructumque triunciatum: ex Mich. Rar.

GERANIO 28. *subiunge.*

Planta annua est, folia inferiora Sii similia gerens, flores autem umbellatos, purpuroceruleos, petalis integris: eius quoque varietatem colimus, quae e glandulis in superficie foliorum sitis Balsamum fundit Moschi odorem spirans

Horti Florentini.

139

spirant; effluque Geranium Cicutae folio Moscatum C. B. Pin. 319. Inst. R. H. 268.

GERANIO 29. subiunge.

Annum est: folia inferiora Pimpinellae similia gerit, lobis acutis, altius dissectis; flores purpureo-aeruleos in umbellas longissimo petiolo fulcitas digestos, petalis integris; fructumque sesquiuunciale: ex Mich. Rar.

GERANIO 30. subiunge.

31. Geranium Batrachoides Bohemicum, capsulis nigris hirsutis H. Eltham. 159. Tab. 133. *Florem violaceum parvum profert.*

32. Geranium Chium vernum, Caryophyllatae folio Coroll. Inst. R. H. 20.

33. Geranium Columbinum Carolinum, capsulis nigris hirsutis H. Eltham.

GEO subiunge.

Est potius Geum rotundifolium maius, foliis ad petiolum magis sinuatis, floribus albis, petalis angustis, punctulis rubris notatis Mich. Rar. e nostris enim Alpihus in Hortum transfudit Michelin, in quibus numquam observavit Geum rotundifolium maius Inst. R. H. quod folia ad petiolum minus excavata profert, & in Germania oritur.

GLAUCIO 1. subiunge.

Petala per basin externae dumtaxat nigro ungue, seu macula notantur, ac circa centrum floris striis pellucidis ornatur.

GLAUCIO 3. subiunge.

Duae huius varietates in Horto colimus, quarum una petala profert exiguo ungue nigro in externa dumtaxat parve notata; altera vero unguibus nigris saturatioribus intus & extra conspicuis.

GLOBULARIAE 2. subiunge.

In fissuris rupium Marmoris Lunensis per Alpes Apuanas laetissime germinat.
3. Globularia fruticosa semper virens, folio Myrthi tridentato, capitulis globosis, flocculis caeruleis oblongis ad extremitatem tripartitis. Bellis montana fruticosa in lloa Caesalp. 494. Mich. Rar.

GLYCYRRHIZAE 2. subiunge.

Flores in specie, erectis digesti sunt, quatuor lineas longi, vexillo albo tantillo violaceo perfuso, alis & carina prorsus violaceis. Siliquae rubrae sunt, glutino, seu theberebinthina quadam scitentes, qua tota plantae superficies illata est. In collibus argillaceis Certaldensibus sponte natam observavi; in magna autem copia germinat circa Campiliam oppidum Orae maritimae Volaterrano, quo loci & radicem contraharum decoctione succus inspissatur in usum medicum. Vires potissimas succo isti conciliat Balsamum, seu Theberebinthina, qua planta universa scates.

Pag. 42.

GRAMINUM speciebus praefige.

Graminis haec species Michelin distribuit, plerumque iuxta methodum a Vajl.

S 2

Vaillania serotam in Bot. Paris. pag. 80. non vero iuxta eam, quam ipse excogitavit, & in altera parte Novorum Generum Plantarum anecdota fusius exposuit. Quum igitur plura hic immutanda essent, satius fore putavi nihil ex eis attingere, nec crebris adnotationibus Lectori tedium creare.

Pag. 46.

GRAMINI *daslylo Indico* esculento, &c. subiunge.

Est Dasylloides Indica perennis, spica articulata Poiret. Anthol. 196.

Pag. 47.

GRANADILLÆ 1. descriptioni subiunge.

Foliola duo, e quorum sum capresolor, & folia prodire dixeram, lunata quidem sunt, sed uno latere productiora, & in mollem aculeum abeuntia, ac praeterea in ambitu variisculis dentata. Adde folia non omnia prorsus e sum foliolorum istorum crumpere, sed in quibusdam ramulis nuda, & solitaria prodire. Folia similia sunt foliorum Clematicis Passionalis pentaphyllae Phytanorae. Tab. 395. Flores autem magnitudine aequant flores Clematicis Passionalis pentaphyllae foliis angustioribus Einsd. Tab. 396. nisi quod filamenta albobaccarulea non totam floris arcam occupant, sed dimidiam tantummodo. Petala coerulea viridibus externa parte distinguuntur. Acetaboli tubis os triplici, non autem duplici, ut adnotaveram, corolla, seu sepe obvallatur. Illarum extrema constat duplici serie mollium filamentorum lineas novem longorum, in basi atrorubentium, in medio alborum, a medio ad extremitatem usque caeruleorum: interior vero unico, quandoque duobus vel tribus ordinibus filamentorum semilincarum alborum, capitulo crassiusculo ferrugineo, vel nigricante, exiguis clavos aliquatenus representantium: intima tandem unica serie filamentorum ciliis instar, ac dense digestorum, non tectum, sed in basi latiorum, & compressorum, adeo ut ex duobus in unum coaluisse videantur. Ad exortum candida haec sunt, in summitate vero nigropurpureo colore persusa: semper autem columnae clavos & apices subsistentis appressa sunt, eoque passio abscondunt patinam, quam eadem columna efficit, & e cuius limbo eleganter intorto, ac quandoque rubente prodeunt. Mel quod intra acetabulum patina clausum larga copia stagnat ab insectis mellivoris intum, assidue extellat e vasis exterioris quibusdam per limbi memorati superficiem, & per acetabuli fundum sparsit. Eleganter huiusce floris figuram non ita pridem observavi in Richard Bradley de & Improvements of Planting and Gardening, &c. fec. Edition. London. 1718. Part. II. pag. 53. Tab. 2. Passion Flower & fruit.

GRANDILLÆ 2. subiunge.

Ramuli, & pediculi foliorum hirsuti sunt. Fructus uvaformes, semina sex plerumque rugosa, & calyptra non obvolata continent.

GROSSULARIAE 2. subiunge.

Folia brevissima vix pellucida pubescent.

GUAIA-

GUAIACANAE *subiunge.*

Folia semipedem longa, lineas 33. lata sunt, in acumen desinentia, superne saturoviridia, inferne dilutiora.

Pag. 48.

HELIANTHEMO 2. *subiunge.*

Ex Insulis Venetis An. 1722. Micheliur attulit, ab eoque tempore cultum in siliis, iuxta Helianthemum vulgare, constanter diversum ab hoc apparuit, ob caules nonnihil crassiores, validiores, & erectos; ob folia nonnihil bifurcata, quae Ledi, vel Rosimarini folia perbelle referunt, & ob florem, qui non aureus, sed luteus est, & petala proferri angustiora ac breviora; stamina item pauciora ac breviora. Tale prorsus est & illud quod Micheliur An. 1736. ex insulis Insulis rursus advexit. Vulgare Helianthemum N. l. descriptum, cui Venetum hoc comparui, in Italia, ac praesertim in Agro Florentino frequentius occurrit: ceterum qualis nam sit vera Chamaecissus vulgaris C. B. Pin. 465. non ita facile decerni potest, quum Baubinus plures Helianthemum diversas species sub eodem capite comprehendat, quemadmodum Micheliur observat Rarior. P. H. Elidam. Tab. 145.

HELIANTHEMO 3. *subiunge.*

Petala florum candida sunt, bilinearia, in summitate nonnihil cordata, circa unguem tantillo aures inflecta. Calyx triphyllus est, stamina autem, & apices lutei sunt.

4. Helianthemum Salicis folio Infr. R. H. 249.

5. Helianthemum Ledi folio Infr. R. H. 249. Flos exiguus est & pallidus, petalis sesquilinearibus, ex angusto principio sensim dilatatis. Ex seminebus a D. Dillenio mecum perhumaniter communicatis simul cum superiori crevit An. 1738.

6. Helianthemum Plantaginis folio perenne Infr. R. H. 350. Tuberaria nostras l. B. 2. 12. Tuberaria maior Myconi Eiusd. ibid. Cissus folio Plantaginis C. B. Pin. 465. Chironiae alterum genus Caesalp. 397. Mich. Rar. E Montibus Pisani attuli An. 1742. in quibus frequent occurrit, ac praesertim in Orientali facie prope dirutam S. Agathae Arcem, & Ecclesiam Sancti Christophori de Lupeta, inter plantas Stoechadis purpureae; in ipsis nempe locis in quibus D. Reutzius collectam Io. Bauhino communicavit.

7. Helianthemum saxatile perenne, foliis & caule incanis, oblongis, floribus albis Apennini Montis Mentis. Pag. Tab. 8. Infr. R. H. 249. In cacumine Montium Pisani, qua parte Bovesem Vallem respiciunt inveni An. 1742.

8. Helianthemum perenne, erectum, luteum, prostrus glabrum, foliis Coridos alternis, longioribus, furtectis, & quasi ad caulem contractis. An Helianthemum tenuifolium, glabrum, erectum, luteo flore l. B. 2. 18. Infr. R. H. 249. Chamaecissus Ericae folio, luteus, elatior C. B. Pin. 466 Mich. Rar. In Montibus Pisani prope Aftianum, ad Fontium Pisani originem laeto provenit.

HELLEBORO 1. *subiunge.*

Folia palmata sunt, ad petiolum sinuata Dracunculi maioris polyphylli inflat. Rami floriferi mollissima lanugine pubescunt. Flores quos plurimos gerunt, cernui sunt & globosi, prodeuntque ex alis foliorum singularium, albicantium, mol.

molliorum, in extremitate nonnihil incisurum, ac a primariis plantae aberrantium. Petala quinque sunt ferme trigona, in summitate rotundata, crassiuscula, lineas 7. vel 8. ampla, cochlearis instar excavata, interne viridia, externe dilutiora. Petula inter staminaque observantur rotatim disposita ostio circiter nectaria, seu cornicula virentia, per seculentem nigropurpurea, petiolo brevissimo adnexa, duas cum dimidia lineas longa, unum latu, curva, facie qua stamina respiciunt compressa, adversa vero gibba, ore non fisso, sed tenuissime denticulato, nuncque luteo excavato. Microscopii auxilio nectaria eadem per longitudinem striata apparent, diaphragmatibus, lacunisque pellucidis reticulata, & interius succum mellum continens. Adde floris effecti limbum colore atrorubente infici, nullumque odorem in eo depræhendi, nisi illum toti Plantae communem, qui ad Augyridem foetidam quodammodo accedit.

HELLEBORO 3. subiunge.

Ad pedalem ultitudinem plerumque affurgit, & statim ex ipsa radice emittit ramulos, seu caules plures perennantes, qui ad semipedis altitudinem divaricantur, uno latere emittentes folia, pauloque superius rursus & tertium divaricantur. Flores paucos gerit pentapetalos, qui solitarii ex adverso foliorum quinque lobatorum secundas & tertias divaricationis, eorumque ex alis prodeunt, ac ex bilineari pediculo pendent. Petula crassiuscula sunt, lineas 14. longa, 11. lata, ex rotunditate nonnihil acuminata, seu rhomboidalia, ipsi pediculo non adfixa, sed continuata, proindeque non decidua, ochroleuca, extus dilutiora, intus saturatiora, vixit pellucidis per longitudinem distincta, & in margine pallidiora. Stamina viridia sunt, & apicibus pallidis suavisiter odoratis Muscari instar prædita. Ad Pistilli basim rotatim sita sunt Nectaria 9. vel 10. florum lubiatorum similia, trilincaria, petiolo lineari appensa, viridia, in duo labia cōiuvientia ad medium usque fissa, extimo longiore, curva, qua parte semina respiciunt cava, qua vero petala gibbosa: substantia coacta crassiuscula, guttulamque mellis infidit Olei Olivæ colore in sinu claudunt: brevis item marcescunt, & ante stamina decidunt.

HELLEBORO 5. subiunge.

Folia, ramulosque plures tenuiores ex ipsa radice emittit. E summitate horum ramulorum, & e sinu duarum tenuium laminarum prodent flores speciosi supra foliorum comam sese attolentes. Petalis bi coactis quinque, initio mollissimis, intus albis vel candidis, extus roseis, ferme ovalibus, lineas 10. longis, sex autem latis. Senescente flore petala eadem umpliantur nonnihil, & crassescunt, alium rosumque colorem amittunt, ac viridem induunt, nec unquam decidunt. Pistilli basi adnascuntur nectaria 9. vel 10. trilincaria, viridia, brevissimo petiolo adnexa, conica, & incurvata, rarius sulcata, ore, cuius diameter linearis est, inæqualiter lacero, & qua parte petala respiciunt, productiora.

6. Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo Inst. R. H. 272. Piè di Gallo vulgo. Flor sex petalis ornatur luteis, lineas 8. longis, duas cum dimidia latis, & ex rotunditate acuminatis. Pistilli basi rotatim adnascuntur nectaria sex lutea, cyathiformia, ad medium usque in duo labia divisa, quorum exterius linguatum & bifurcatum, interius eleganter cordatum est.

Pag. 49.

HERNIARIAE 2. subiunge.

Folia minutissima sunt.

HESPE.

HESPERIDI 9. subiunge.

Hieracioides (pratensis, annua) vesicaria, Cichorei folio Vaill. in *Ad. Acad. R. Sc. An.* 1721. pag. 246. num. 3. *Hieracium Cichoroides vesicarium* *Inst. R. H.* 471.

2. Hieracioides vulgaris (annua, hirsuta, foliis laciniatis) foetida Vaill. *ibid.* pag. 247. num. 5. *Hieracium Amygdalis amarus oleus, seu odore Apuli suaverubentis* *Inst. R. H.* 469.

3. Hieracioides minor, annua, Endiviae folio leviter incisio, flore minimo Vaill. *ibid.* pag. 250. num. 26. *Hieracium annuum folis leviter incisio, floribus luteis exiguus, initio pendulis, deinde erectis* Micheli H. Pif.

HIERACIO 9. subiunge.

Hanc, cum duobus insequentibus speciebus superius ad Helminthothecae genus revocavi.

HIERACIO 12. subiunge.

13. Hieracium Alpinum pratense, Cichorei folio, hirsutum, & peramarum, caule filuloso, flore aureo, calyce nigricante venereofo Micheli H. Pif.

HIPPOCASTANO subiunge.

Petala circa basin luteis maculis insciantur: expropter esse posset Hippocastanum vulgare, flore maculis flavis picto Boerh. *Ind. Alt. H. Lugd. B.* part. 2. 230.

HORMINO 2. subiunge.

3. Horminum Orientale, amplo Bugulae folio, flore dilute caeruleo. *A Cl. Leonardo Setler Medico & Botanico Veneto, in cuius Horto colebatur, accepit Micheli.* Planta universa raris villis inscitur. Folia inferiora laciniata sunt, eaque simul cum superioribus colore rubente Bugulae instar inscuntur. Verticilli florum rarius ab invicem distant.

HYACINTHO 1. subiunge.

Hyacinthum hunc Cl. Heisterus Boerhaavium secutus in *Indice Plantarum Horti Helmsladensis ad Tuberosae genus revocavit.*

Pag. 50.

HYDROCOTYLI subiunge.

Hydrocotyle Italica Raounculi folio, floribus in capitulum sphaericum congestis Micheli H. Pif. *Ranunculus aquaticus umbilicato folio* Col. *Part. 1.* 315. *Ranunculus repens, Cotyledonis folio* Vaill. in *Ad. Acad. R. Sc. An.* 1719. pag. 48. num. 2. Mich. *Rar. Larga copia germinantem inveni in fovea quae fecit radices Montis D. Iuliani a Latomis Marmoris albi Pisani, Caldascolin usque protenditur. In foveam hanc influunt aquae Thermarum D. Iuliani, pluresque e fundo ipsius foveae erumpunt aquarum calidarum venae, praesertim versus Caldascolin, cuius loci nomen corruptum ab antiquo Calidae Aquae suspicari licet. Certum quippe est Latinos Thermas naturales Aquas per antonomasiam, vel Calidas Aquas appellare consuevisse, adiecto vel regionis, vel inven-*

inventoris, aut instauratoris nomine, ut ab invicem distinguerentur. Pisannarum Aquarum mentio fit apud Plinium Hist. Nat. L. 2. cap. 103. his verbis Patavinorum Aquis calidis herbae virentes innascuntur, Pisannorum Ravae. Phenomenon tamen hoc, quod memoratu dignum Plinio visum est, in omnibus Aquis Thermalibus, quas Annis 1742. & 1743. observavi, & quae 60. circiter sunt, obinet, praeter quam in Lacuus per Agrum Volaterranum sparsis & horribili fragore ebullientibus. Quinimmo incolis compertum est Ranarum in calidis Aquis viventes, ceteris pinguiore, & suavioris esse. Nomen autem Aquarum calidarum Pisannarum aptari non potest Therms, quae in Collibus Caesarianae sunt, vulgoque appellantur il Bagno a Acqua, eo quod nimum a Pisarum Urbe distent, & ad Volaterranae Coloniae Agrum fortasse antiquitus pertinerent; nec praeterea antiquorum aedificiorum reliquiae circa eas supersint, quae magnificae circa Caldaccolin observantur, veluti rudera Aquaeductus, ut de ceteris taceam.

HYOSCYAMO 3. subinuge.

4. Hyoscyamus albus, vulgaris, annuus, latifolius, flore ochroleuco lineis purpurascens reticulatis infecto, semine cinereo. Hyoscyamus vulgaris, vel niger & annuus, semine cinereo H. Pis. Micheli Rar.

HYPERICO 4. subinuge.

Ramosissimum est, strobilumque parvum pallidum profert. Universa harum specierum superficies nitens pellucida Balsamo plenius referta est. Petala floris, & squamae calycis praeter hosce nticulos, alios habent Balsamo purpureo plenus: sequentis autem speciei flores bis carent.

HYPERICO 5. subinuge.

Est Hypericum foetidum frutescens minus H. Eltham. 182. Tab. 151.

HYPERICO 7. subinuge.

Est Hypericum Alpinum, humile, latifolium, non perforatum, caule rotundo duabus appendicibus vix apparentibus armato, flore magno punctato. Androsaceum Caesalp. H. Sicc. pag. 228. num. 636. Mich Rar.

HYSSOPO 1. subinuge.

Flores uno versu dispositos; folia autem lata profert. Eius varietatem etiam colimus, quae folia gerit angusta.

Pag. 51.

IACEAE 1. subinuge.

Flosculos duplicis naturae profert, marginales scilicet in tres angustissimas lacinias divisos, tuba & vagina divisos, insidentes semini tribus quatuorve brevissimis villis in summitate munis. Qui vero centrum floris occupant, in quinque lacinias divisi sunt, tuba & vagina instructi, insidentes semini praelongis villis seu pappis instructo. Thalamus villis confertis obvallatur. Calycis squamae integrae sunt, & quandoque in aculeum tenuissimum desinunt.

IACEAE 4. subinuge.

Est Iacea montana, lupina, purpurea, incana, & tomentosa, foliis tenniter

ter dissectis, squamarum capitulorum aciebus pennatis, & nigricantibus (seminae brevissime coronato) Micheli H. Pil.

IACEAE 7. subiunge.

Hanc & sequentem Vaillantini in *Alt. Acad. R. Sc. An. 1718. ad Scitaculac genus revocavit.*

IACEAE 11. subiunge.

Flosculi marginales albidus profert, eos vero qui centrum floris occupant, purpureos: semen brevi pappo instructum est. Calycis squamae non striatae, neque pyramidatae sunt, sed in extremitate tantillum dilatatae, & nigricantes.

IACEAE 14. subiunge.

Folia tenuiter laciniata sunt; capitula purpurea parva; calycis squamae ad extremitatem acutae, nigricantes, & leviter dentatae; semen tandem brevissimum barbatum. Fortasse est Papaver spumeum Caesalp. 539.

IACEAE 23. subiunge.

24. Iacea candidissima, laciniata (lobis integris) flore luteo magno Vaill. in *Alt. Acad. R. Sc. An. 1718. pag. 233. num. 25. Iacea Epidaurica candidissima & tomentosa* Inst. R. H. 445.

Ceterum de his Iaceae speciebus consule inferius adnotata ad Rhaponicioidis, & Rhaponici species.

Pag. 52.

IACOBÆAE 7. subiunge.

Ad Solidaginis Genus revocavit Micheli Rar.

8. Iacobaea Africana, laciniata, angustifolia, flore purpureo Olden. Inst. R. H. 487. Iacobaea annua Senecionis folio, floribus suaverubentibus Flor. Norimb. 215. *Aster Africanus annuus, Senecionis folio* H. Amst. 259. Vaill. in *Alt. Acad. R. Sc. An. 1720. pag. 385. num. 28.*

9. Iacobaea maritima, sive Cineraria latifolia C. B. Pin. 131. Inst. R. H. 486. Item Iacobaea Graeca maritima, foliis superne virentibus, ineanis Coroll. Inst. R. H. 36. Vaill. ibid. 386. num. 40.

10. Iacobaea foliis amplioribus ineanis Mor. H. R. Bief. Inst. R. Herb. 486. Vaill. ibid.

IALAPAE 2. subiunge.

3. Ialapa flore ex albo & purpureo dimidiatim commixtis notato Inst. R. H. 129.

IASMINO 3. subiunge.

Flores, quos Autumno profert, odorem Lili convallium spirant. Nonnulli ex his fructum persimium, baccam nempe viridem cerasiformem, quae per totam hiemem persistit, ac per maturitatem mollior & nigropurpurea fit, claudique semen unicum, vel duo Coffeae similis. Non autem haec tantummodo Iasmini species apud nos fructus procreat; sed & septima quoque, & octava. Prioris sunt baccae nigropurpureae olivaeformis; posterioris autem baccae nigrae Piperis granorum magnitudine.

T

IASMI-

IASMINO 6. subiungetur.

Est Gelsimum Indicum arborefcens femper virens, flore luteo ac suaviffimo odorato, defcriptum a Ferrario, Gaſpardi in Vita Peireſcedis pag. 234. Iafminum femper virens Americanum Munting. Phytogr. 55. Flores odorem florum Geniftae luncceae emulantur; eorumque tubus decem lineas longus eſt, ſectiones vero lineas quatuor longae ſunt. Notari meretur huius Iafmini varietatem in Horto coli, quae flores prorfus inodoros gerit.

IRIDI 3. subiungetur.

Haec vera eſt Iris Florentina Officinarum, quae in moenibus Urbis noſtrae larga ſatis copia olim germinabat, & fortaffe Lilio (Fleur de Lis) albo veſtigio Florentiae inſignit originem dedit. Mado autem rarior ibidem obſervatur, & in eius locum ſuccedere ſpecies 1 & 2. quarum radices mundatae, & ſiccatae promiſcuae uſurpantur, & extra Etruriam deferuntur pro Iride Officinarum.

Pag. 53.

IUNCOIDI 3. subiungetur.

4. Iuncoides Montanum, nemoroſum, villoſum, latifolium elatius, capitulis florum capidis & ſplendentibus Micheli N. P. G. P. 1. 42.

IUNIPERO 1. subiungetur.

Frugifera eſt, a Michelio & Collibus Imprumetanis allata. Plurimas ego ex his Iuniperis obſervavi in Montibus Camporenae, ſeu S. Vivaldi, & ſecus viam quae a Salinis Volaterranis Quercetum ducit, ubi ad mediocrit arboris altitudinem aſurgunt. Individua masculina, ſeu quae Amentis ſtoriferos tantummodo gerunt, facile a femininis diſtinguntur: in ampliorem ſiquidem, globosamque comam ſe ſpargunt, ramis longioribus, glaciſioribus, ac propenditibus; folia item proferunt longiuſcula, minus conſerta, & molliora. Individua autem feminina caudice craſſiore ſulcuntur, comaeque in eorum collectam proferunt, conſtantem ramis validioribus, ternis & quolibet nodo prodeuntibus, & crectis, qui, ſimul cum ramuſculis ſecundariis breviffimis, veſiuntur foliis rigidioribus, conſertis, baccisque plurimis & ſinu foliorum prodeuntibus onerantur; tandem Reſinam, ſeu Soudrach & corticis ſiſſuris in magna copia ſuadunt. Baccae figura admodum variant, vel enim rotundae ſunt, vel compreſſae, vel ovales: plurimum item variant figura & numero ſquamarum, ſeu appendicum, quibus externe ornantur. Veris initio prodeunt, nec uſi anno ſequenti ad maturitatem perveniunt, quod & in Sabinae, altiarumque nonnullarum reſinoſarum arborum fructibus obſervatur. Dum matureſcere incipiunt & viridi in flavum colorem degenerant (ex quo deceptus eſt Caſalpini fructum flavum huc Plantae iribuent) ac ultimo prorfus rubrae evadunt, & molleſcunt. Pulpa ipſarum guſſui ſuaviſſima eſt, & dulci, acidulo, ac balſamico odore permixta. In ſeminum ſuperficie deprehendi veſiculas oblongas Therebinthina quadam peculiari plenas. Memini tandem Patrem meum optimum An. 1737. peculiare Rob. ſeu Sapam ſuaviſſimam Baccarum huius Iuniperi conſeciffe. Selexit quippe maturiores ac ſantiores, decoxit in Aqua fontana, pulpam per ſtaceum tranſmiſit, ac dein lento igne inſpiſſatam in peculiaribus vaſis repoſuit.

fuit. Paucarum hebdomadarum spatio massa haec concrevit, Conserve alicuius Officinarum formam assumens, eiusque superficiei accrevit crusta saccharum purum intum referens. Talis Rob eximii usui esse posset in Medicina; suavior squidem Rob luniperi vulgaris est, odore minus acuto, proindeque minus excitant nervos.

KALI 1. subunge.

Floris in foliorum alis sita sunt. Calyx constat foliis quinque cucullatis, & calcari in summitate donatis; centrum occupat embryo cepaeformis, stilo bifido munitus, & flaminibus quinque stipatus. Semen coctileatum duplici involacro vestitur.

KALI 3. subunge.

Quamvis species haec maritima semen coctileatum, seu serpentis instar convolutum non proferat; facies tamen Plantae, & forma calycis, inter Kali species annumerari eam sinit. Floris in alis foliorum nascuntur plures simul innati, constantque foliis vel quinque vel sex, tribus scilicet maioribus & acuminatis, tribus vero minoribus & rotundatis, omnibus tamen cucullatis, & trianguli in formam dispositis. In eorum sinu inter 3. flamina iacet embryo ovalis signatus, sacco membranaceo inclusus, qui fructu maturo decedente perforatur apparet quae parte calycis adhaerebat, & ea sola porta exitum permittit semini ferri equum figuram mentienti.

Pag. 54.

KETMIAE 6. subunge.

Per caulem & petiolo foliorum observantur verrucae minimae, e quarum summitate erumpunt tres quatuorve spinulae, seu villi rigidiusculi, pellucidi, stellae iustae, seu radiatum dispositi, qui plantam tactu asperam reddunt. E costis item calycis, seu vesicae, erumpunt verrucae rubentes, quae tribus quatuorve similibus villis, at longioribus, & gracilioribus in summitate ornantur, e quorum centro guttulae liquoris cuiusdam pellucidi erumpunt.

7. Ketmia Syrorum flore albo Boer. Ind. Alt. H. Lugd Bat. P. 2. 271.

8. Ketmia Aegyptiaca semine moschato Inst. R. H. 100.

9. Ketmia Indica folio hastato, fructu duro Inst. R. H. 100.

LACTUCAE 3. subunge.

Est Lactuca silvestris Sonchi folio multum laciniato, flore luteo pallescente Mich. R.

LACTUCAE 2. subunge.

5. Lactuca silvestris Italica, costa spinosa, sanguineis maculis adspersa Par. Bat. Inst. R. H. 413.

Pag. 55.

LAMIO 9. subunge.

LAMPSANA foliis crispis Petiv. A.D. Amman semina accipi. Floris diameter linearis est: strobili in summitate complanati, & levissime incisae sunt, tabasque vircutes habent

LAPATHO 9. *subiunge.*

10. Laphathum Chalepense folio acuto, seminum involucriis profunde dentatis H. Pif. 93.

11. Laphathum Aegyptium annum Parietariae folio, capsula seminis longius barbata H. Pif. 93.

Pag. 56.

LAVANDULAE 4. *subiunge.*

5. Lavandula foliis crenatis Inst. R. H. 198.

LEONTOPETALO *subiunge.*

LEONURUS perennis Africanus Sideritidis folio, flore phoeniceo maiore Brein. Prodr. 2. Inst. R. H. 187.

LENTICULAE 2. *subiunge.*

Flor, seu fructus, quem anum, & una tantum vice observare mihi contigit, die scilicet 20. Februarii An. 1732. intero prima Rei Herbariae tyrocinia, Michelio plandente, a Lenticulae Genere plantam hanc excludit. Summitatē plantae is adhaerebat, & ni male memini, unum ex foliis ipsis erat, sed obsolete virent, fructuum Orni, vel Fraxini simile, nempe ad medium usque ventricosum, ac in summitate linguatum & retusum, intus cavum, includensque racemum vesicularum minimarum pellucidarum 5. vel 6. communibus petiolis aperturarum, eo fere pacto, quo Dactyli in Palmae spatba nidulantur. Nusquam alias autem similes seu flores, seu fructus, reperire contigit, licet Michelius egoque avidissime ipsos conquisivimus.

LENTICULAE 3. *subiunge.*

Haec quoque a Lenticulae genere excludenda est, & ad novum peculiare revocanda, ob floris fructisque formam a Mappo accuratissime descriptam in Historia Plantarum Alsaticarum pag. 166. Copiose germinantem inveni in ampla fossa Agri Pisani, a Capucinarum Coenobio cundo Castagnolum.

Pag. 57.

LIGUSTICO *subiunge.*

2. Ligusticum alpinum multifido longoque folio Inst. R. H. 324. Dantes alpinus multifido longoque folio, umbella candida, qui in Baldo nascitur, sive foliis brevioribus compactioribus C. B. Pin. 150. Daucus Creticus Camer. Epit. Mat. 536. Daucus Creticus verus Eiusd. Hort. Daucus alpinus Cretico similis Park. Theat. 896. Daucus Creticum Caesalp. 286. (non vero Daucus montanum Eiusd. ut credidit C. B. Pin. semen etenim lanuginosum est) an legitimus Daucus Clus. R. Hist. CXXXVII. & Daucus Creticus eiusd. Punn. 700. Mich. Rar. E Monte Baldo attulit Micholius. Caulis, rudis umbellae, & semina lanugine incana pubescent: semina autem lineas tres cum dimidia longa sunt, & in ventre diametrum habent ferme linearem.

Pag.

Pag. 58.

LIMONIO 1. subiunge.

Floris Autumnio proferri digestos in spicas, seu radios Heliotropii forma umbellam laxam & amplam constituentes, & in summitate ramulorum supra foliorum comam sese altius attolentes. Numerantur autem 22. circiter flores in unaquolibet spica, & bini ac bini prodeunt e sinu squamarum quarundam minutarum herbacearum, quarum extrema brevis, intima longior, florentique uocat ante alium. Calycem habent bilinearem membranaceum purpureum petalis dilutiorem, conicum, ore in quinque dentes laceros scissum, & in fundo subbitumum. Petala quinque sunt, lineas quatuor longa, extra calycem subrotunda, coclearis instar excavata, & in summitate leviter cordata; nec vero ita facile decidunt, sed potius maturestante fructu corrugantur, & intra calycem conglobantur. Præterea ad exortum, seu qua parte embryoni adhaerent, nectario exiguo & viridi rubente instruantur. Stamina 5. pariter sunt altitudine petala æquantia, apicibusque bicephalaribus pallidis muulta. Embryo in 5. capsulas filamentis singulis albo prædites dividitur.

In Limonio 2. Synonymo I. B. pro maius, corrige minus, & subiunge.

Folia in extremitate rotundata proferri, non vero acuminata, in quo differt a Limonio maritimo minore Oleae folio C. B. Pin. 192. Parvo Limonio Narbonense Oleae folio Lob. Icon. 295. Limonio minore Oleae folio Barr. Icon. 790. ex Mich. Rar. In Littore Liburnensi inter Urbem Montemque Nigrum abunde provenit, præsertim vero in cavernulis scopulorum prope valedinarium D. Jacobi.

LIMONIO 3. subiunge.

Caulis quandoque foliosus gerit.

LIMONIO 5. subiunge.

Convenit cum descriptione Bocconii Rar. 34. & Ic. 32. 33. Folia crasse sunt, sapore amaro prædita. Univerſa Plantae superficies saccharo propemodum incrustata adparet, seu punctulis quibusdam candidis extuberantibus excasperatur, quæ per microscopium massulae corysallinae sunt sub dentibus stridentes, sapore falso. Iulio exenute flores e sinu foliorum erumpunt pluribus calycibus muniti: exterius nempe foliolum est brevissimum complicatum; huic insidet foliolum aliud trilinare tubi ad instar complicatum, & ventricosum, crassitie, & duritie folia plantae æquans, ac punctulis iisdem albis variegatum. Huic rursus insidet calyx propriè nuncupandus, conicus, lineas 5. longus, substantia tenuissima pellucida, qua parte e secundo foliolo emergit tantillum rubens, oreque in quinque dentes scisso. E calyce hoc erumpit flos speciosus, monopetalus fig. Q. R. S. Tab. 117. Inf. R. H. similis, lineas 11. longus, infundibuliformis, seu hypocrateriformis, & scissus in quinque lacinias ad extremitatem complanatas ac lineas quatuor longas, duas circiter latas. Initio hic lacte rubet, nervo saturatiore atringue in segmentorum medio apparente, effectus vero ad violaceum colorem vergit. Stamina quinque sunt floris tubo adnata, quorum apices, pulvisculum luteum fundentes vix e tubo egrediuntur. Embryo capillamentis 5. brevibus candidis instructus, ad basin munitur corolla, vel tubo membranaceo striato, consensiente uellutis 5. seu corpusculis similinartibus oblongis mellum

succum

succum fundentibus, & in summis abeuntibus in laciniam, seu linguam linearem albellucisdam tubo floris adnatam. Gallar apud nos nunquam protulit; nec mirum, siquidem, uti animadvertit Raius Hist. T. I. 396. proprius huius plantae fetus non sunt, sed insectorum quorundam nidi, uti Salviae quoque Creticae bacciferae contingit.

6 Limonium peregrinum foliis Asplenii C. B. Pin. 192. Insl. R. H. 342. Flores primo quidem aspectu monopetali apparent; verum pentapetali sunt, petalis angustis in extremitate nonnihil rotundatis, insidentique calycibus elongatis caeruleis chartilagineis.

7 Limonium minus annuum, bullatis foliis, vel Echioides Bot. Monsp. Insl. R. H. 342. Flores minimi sunt, dilute caerulei, petalis in extremitate complanatis.

8 Limonium maritimum maius, folio longo, angusto, acutoque, costa in apicem seu aculeum inermem prolongata. Ex Insulis Venetis transmissu Michxliur.

9 Limonium maius, angustifolium, geniculatum, rigidum, flore maiore caeruleo Zannich. Insl. 164.

LINARIAE 3 subiunge.

Elaeior insequenti specie est: folia profert angusta, glauca, in ima caulis parte quaterna. Flores in praelonga spica digesti violacei sunt, labelli inferioris interna parte pilosa, & inodori. Fructus rotundus, exiguus, semen angulosum asperum claudit.

LINARIAE 4. subiunge.

Folia profert Antirrhini, flores inodoros, fructus rotundos, stemonque triquetrum & rugosum.

LINGUAE CERVINAE 2. subiunge.

3. Lingua Cervina foliis costae innascentibus Insl. R. H. 545. In faecibus ingentium cunctorum, antiquitus ad Ferri venum excavandam altorum, prope Stanzem Pagum Alpium Apuanarum lacte germinantem inveni An. 1743. & in Hortum transiit.

Pag. 59.

LINO subiunge.

2. Linum silvestre annuum, gracillimum, non asperum, valde ramosum, fasciculis luteis ramulorum geniculis quasi immediate adhaerentibus. Linum silvestre silesiacis luteis Caesalp. 536. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

3. Linum silvestre annuum, foliis longis, angustis, acutissimis & asperis, floribus exiguis luteis umbellatim compactis Mich. ibid.

4. Linum silvestre angustifolium, floribus dilute purpurascens, vel carnes C. B. Pin. 214. Insl. R. H. 340.

5. Linum sativum latifolium Africanum, fructu maiori Insl. R. H. 339.

LINARIAE 1. subiunge.

Folia profert Urticae forma, sed ampliora; flores autem violaceos, vel subcaeruleos.

LUNA.

LUNARIAE 2. subiunge.

3. Lunaria Leucoii folio (incano, floribus luteis exiguis in spicam dispositis) siliqua oblonga maiori Insl. R. H. 218.

LUTEOLAE 2. nomen ita corrige.

2. Luteola sativa (atque spontanea) Salicis folio crispo, minor Mich. H. Pil. An Luteola minima Polygalae folio Raii Syn. Ed. 3. 367. An Luteola Lusitanica pumila crispata Insl. R. H. 424. ? Ex Mich. Raii.

Pag. 60.

LYCHNIDI 1. subiunge.

Variis flore simplici, & plenissimo, quod & speciebus 2. 6. ac 7 contingit

LYCHNIDI 6. subiunge.

Aliam habemus flore minore ex albo pallescente.

LYCHNIDI 13. subiunge.

Petala bifida sunt, in extremitate denticulata, duabusque appendicibus circa umbilicum donata.

LYCHNIDI 24. subiunge.

Flos purpureus est, petalis integris constant.

LYCHNIDI 26. subiunge.

Dantur huius speciei individua, quae flores tantummodo masculinos, seu steriles; alia vero, quae hermaphroditos, seu frugiferos ferunt. Hermaphroditorum calyx viridis est, conicus, in basi luevit, & crassior, superne turgidus, & costulatur, ore denticulato. Petala quinque sunt bilinearia, intra calycem alba, & tridentem lineae lata, extra calycem vero e luteo virescentia, & dimidio angustiora, reflexa, nullisque appendicibus instructa. Embryo flamentis tribus vel quatuor longiusculis albis munitur. Stamina nulla, nisi male memini, extra calycem apparent. Masculini flores e contra calyce angustissimo, seu tubulato constant, petalisque angustioribus; praeterea staminulis albis decem donantur, dupli serie digestis; quinque signidem interiora sunt petalis duplo longiora, & citius erumpunt; cetera autem quinque exteriora breviora e floris calatbo non egrediuntur, apicesque crassiores substinent. Apicum omnium color primum luteus, deinde viridis est.

LYCHNIDI 28. subiunge.

29. Lychnis (annua) legetum rubra, foliis perfoliatae (petalis florum angustis, pene cordatis, calyce vesicario alato) C. B. Pin. 204. Insl. R. H. 335.

30. Lychnis silvestris noctiflora alba simplex, calyce amplissimo ventricoso & striato D. Micheli H. Pil.

31. Lychnis Coronaria Dioscoridis sativa, floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis C. B. Pin. 203. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 2. 210.

Pag. 61.

LYSIMACHIAE 3. subiunge.

Huius species flor linear decem latus est; insequentis vero sex, vel 7. tantummodo.

LYSIMACHIAE 4. subiunge.

Flor totus latus est, linear 13. in diametro habens, sectionibus linear tres latis, ac minus quam in insequenti specie uuminatis.

LYSIMACHIAE 5. subiunge.

Flor linear 11. in diametro habet, eiusque sectiones linear 2. cum dimidia latae sunt.

LYSIMACHIAE 6. subiunge.

Floris in cuculicorum summitate spicatum digesti sunt, carnei, bilineares, Cynoglossae potius quam Lysimachiae florum figuram accumulantes, nempe infundibuliformes, vel hypocrateriformes quinquesariam fissi, sectionibus sesquialteam longis, ex angusto principio sensim dilatatis, ac in extremitate complatis. Stamina quinque sunt concoloria, rubo breviora, singulis sectionibus adnata, puberem album ex apicibus fundentia.

LYSIMACHIAE 7. subiunge.

MAIORANA hortensis incana, & veluti sericea, valde odorata, foliis subrotundis non dentatis, floribus albis, capitulis oblongis compactis, squamis rotundis. *Maiorana Gentile* Matth. 766. Mich. Advers.

2. Maiorana hortensis minus incana, & minus odora, foliis oblongis pediculis insidentibus, capitulis ferme uncialibus Eiusd.

MALVAE 2. subiunge.

Frustis nonnihil rugosus est, & subhirsutus.

MALVAE 6. subiunge.

Est Althaea frutescens Lusitanica, folio rotundiori undulato Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 269. Plantae superficies uniuersa, nudo oculo, tomentosa apparet, tactui vero aspera; praeterea manus lentore quodam moschum oleute inficit. Si autem microscopio exuimines, comperiet superficiem uniuersam exceptu floris corolla, conpersam esse stellulis minimis crystallinis, vellisque solitariis stellarum intervalla occupantibus. Stellulae confusae cylindro, seu columella brevissima, quae in summitate sex vel septem vixidis vellis pellucidis rotatis dispositis coronatur. In eadem summitate columellae, seu maior in eorum ipsorum radiorum stellulae sita est Glandula minima, e qua die 16. Iulii horis matutinis exillare guttatim vidi humorem pellucidum quemdum, ac leuissimum, ea copia ut manus & vestes madefaceret, plantaeque superficies veluti rore conpersa appareret. Lignor iste Moschum cum Zibetho permixtum olet, adeoque gravis est, ut si prope plantam a Sole meridiano excalescens tantillum consistat, caput laedi sentias. Obseruavi praeterea hac illuc sparsas per plantae superficiem massulas quasdam cereas, sulphureas vel laescentes, & moschum

seum pariter olentes. Eas autem nil aliud esse suspicor, quam liquidi superius descripti partes terreas ac crassiores, quae Solis vi aquarum & tenuiorum partium consortio orbatae in talem resinam concreverint. Floret terni, vel quaterni petiolis linear 14 longis sulcati, prodeunt ex alis foliolorum duorum acutiorum, duplicique calyce muniantur, quorum uterque sensus ampliatur. Exterior calyx interiore minor trifariam sectus est, sectionibus ex rotunditate acuminatis, linear novem longis, octo autem latis; alii interior, & amplior quinquefariam ad medium usque fissus est in acutas lacinias unciales. Florum sectiones unciales pariter sunt, in summitate complatae, & trifariam cordatae, purpureascentes vel roseae, nervis rubris per longitudinem excurrentibus, & circa umbilicum numerosis villis pellucidis obvallantur. Stamina purpurascientia ad originem coalita corymbum elegantissimum formant, ramusculis seu pedunculis bilincaribus subsistentia apices albos reniformes inodoros. Apicem autem istorum structura per microscopium talis apparet. Superficie laevi nitente constant, lineaeque albae per dorsum longitudinem notantur: iuxta lineam hanc debescunt; tumque volva, seu tunica ipsorum apicum elateris vi repanditur, ac multifariam corrugata in conspectum praebet plurimos exilissimos globulos crystallinos, qui pedunculi tenuissimi ope eidem membranae seu tunicae adhaerent; brevi dein tempore, arefcente pedunculo, decidunt inter villor pililli basin obvallantes. His delapsis volvae apicum exarscunt, vestigiaque ostendunt cellularum quibus globuli ipsi clandeabantur. Globuli autem durissimi sunt, & diffracti guttulam fundunt liquoris pellucidi, utriculi tunica seu acino vacuo remanente. Embryo abit in semina 15 vel 17. reniformia, nigra, munita membrana cinerea elastica, qua divulsa proficiunt. Superficie seminum & Thalami, marginis item calycum villi simplices teretesque innascuntur, e quorum summitate guttulae liquoris pariter odorati extillant. Apices Keimiae Sinenfis fructu subrotundo, flore pleno Inst. R. H. 100. bisse similes sunt, sed maiores.

MALVAE 8. subinuge.

Apicum seu testiculorum pulvisculus per microscopium nil aliud apparet esse, quam globulos crystallinos, albicantes, muricati quorundam Lycopodi specierum ad instar.

Pag. 62.

MALVAE 23. subinuge.

Planta perennis est, caule procera fungoso in arbusculam sese attollens. Folia habent ampla mollissimis villis holoferis instar vestita. Inter hos autem observantur verrucae minimae tribus hirsutis villis in summitate instructae, nec ullum liquorem fundentes. Floris calyx interior quinquesidus est; exterior vero trifidus. Floris purpurascens sectionibus linear 9. longae sunt, sex autem latae, & in extremitate cordatae. Plures ex his Malvae speciebus Boerhaavio alique ad Alibae genus revocantur.

De MALVIDA vide adnotata superius ad Abutilo.

MANDRAGORAE 1. subinuge.

Folia atrovirentia sunt, costis albicantibus. Fructus sphaeroides in diametro perpendiculari linear 14. in horizontali vero sesquunciam habent, iuris & extra aureus est, pulpa mollissima, odore tamen adeo gravi & viroso, ut caput laedat.

laedat. Folia floresque e terra erumpunt Mense Martio vel Aprili; fructus tamen ad maturitatem perveniunt excunte Iunio.

MANDRAGORAE 3. *subiunge.*

Fructus aureus est. An Mandragora flore subcaeruleo, foliis undulatis non asperis, fructu ovato Boeth. Ind. Alt. Hort. Lugd. Bat. Part. 1. 270. Mandragora femina flore caeruleo Barr. Obs. 1. Icon. 24. Mandragora foliis asperis, fructu parvo ovato & acuminato, floribus violaceis Coroll. Insl. R. H. 1. ex Mich. Rar.

MANDRAGORAE 4. *subiunge.*

Fructus ovalis est, in maiori diametro decem, in minori sex lineas habens, coloris buxus, odore gravis & viscoso. Calyx in quinque acutis laciniis ad medium usque divisis fructum fere dimidium vestit. Novembri Mense incutit folia, & flores e terra erumpunt; flores autem novi subinde semper ad Martii usque initium pullulant; fructus Iunio Mense maturitatem adsequuntur, quo tempore folia pererunt. Antiqua hinc, & Pisani Horti planta est, ut adnotavit Michelinus Rar. qui eandem esse suspicabatur cum Mandragora foliis asperis, fructu parvo ovato & acuminato, floribus subalbidis Coroll. Insl. R. H. 1.

Pag. 63.

MARRUBIO 2. *subiunge.*

Flor candidus est, tubo tres lineas longo, lincam lato; labio superiori erecto, bifido, lineas tres longo, sesquilineam lato; inferiori vero trifido, lineas duas longo. Stamina virescent, & e tubo floris non egrediuntur; apicum pistilulæ aureus est. Calycis os in quinque tantum segmenta acuminata divisum est, non vero in 10. vel 12. quod Marrubio albo vulgari contingit.

MARRUBIO 5. *subiunge.*

Planta tota hispida est. Radice nititur capillari, ramosque tripedales emittit graciles & humi procumbentes, folia Melissæ similia, serrata, rugosa, lineas 15. longa, 12. lata. E verticillis foliosis produnt flores, quorum tubus lineas 3. longus est; labium superius quatuor lineas longum, album, & bifidum sectionibus inortis; inferius vero tres cum dimidia lineas longum, tripartitum, sectione intermedia ampliore, cordata, in fine lutescente, supra medium alba, & punctulis purpureis variegata. Stamina quatuor sunt, rubra, apicem rubenter subnitentia. Calyx continet patulus, ore in quinque aculeos albos desinente, femina quatuor nigra & lacvia fovet; Masturbiastræ Gencri potius adscribendum est.

MATRICARIAE 3. *subiunge.*

4. Matricaria horientis flore simplici prorsus albo. Mich. Adv. Semistefulus coronales (qui 10. vel 12. sunt) flosculi item distoides prorsus albi sunt.

MEDICAE *subiunge.*

2. Medica marina Lob. Icon. 38. Insl. R. H. 410. In Littore Liburnensi, & in ipsiæ moenibus Urbis Pisarum inter Aqueductus Castellum, & Portam albe Pugge dictam invenit.

MEDI-

MEDICAGINI 2. subiunge.

Est Medicago silvestris floribus croceis Inft. R. H. 410.

MELILOTO 7. subiunge.

Est Medicago perennis humifusa trifoliata, floribus luteis perexigua in capiculum congestis, siliquis minimis nigricantibus rugosa & monosperma Mich. Rar.

Pag. 64.

MELISSAE 5. subiunge.

Flos semuncialis est, purpureus, extus saturatior, interne dilutior, & lineis saturatoribus distinctus. Or in quatuor partes fissus est, quarum superior & inferior cordatae sunt, laterales vero alatae.

Pag. 65.

MILLEFOLIO 3. subiunge.

Ad Achilleae genus revocavit Michelin Rar. appellavitque Achilleae Alpina maxima Millefolii folio, pinnolia latiusculis elegantiter incisus, floribus albis.

MILLEFOLIO 4. subiunge.

In Bosconis nomine pro maritimum scribi montanum. Hoc pariter ad Achilleam revocavit Mich. nempe Achilleae Absinthii Pontici folio, subhirsuta, floribus albis.

MIMOSAE subiunge.

Huius descriptionem accuratissimam vide sis in Zanoni Historia Rariorum Stirpium a Cl. Caietano Montio digesta, & locupletata pag. 162. cui pauca haec subiungere liceat, quae in commentaria retuli An. 1739.

Folia non expanduntur nisi quando a Sole irradiantur; eo enim occidente, vel nubibus obvelato, statim clauduntur. Petiolis ipsorum foliorum adhaeret glandula acetabuliformis, oblonga, rubra, liquidum quoddam pellucidum assilivo tempore fundens, quod Formicae avidè exsugunt, & quo propemodum inebriantur, adeo ut immotae diu maneant, ac veluti consopitae. Flos non monopetalus est, sed rotatus, vel potius caryophyllaeus: calycem habes campaniformem, margine in quinque dentes diviso, Punicae calycis instar. Huic insident petala quinque, figura ad folia Plantaginellae Mentzelii accedentia, & ad basin invicem coacta, quemadmodum in Caryophylli bortenstis floribus accidit. In sinu eorum petalorum sita sunt decem praelonga stamina, e quorum medio surgit pistillus in siliquam abiens.

MOLDAVICA Betonicae folio, flore caeruleo Inft. R. H. 184.

2. Moldavica Orientalis Betonicae folio, flore magno albedo Coroll. Inft. R. H. 11.

3. Moldavica Betonicae folio, floribus minimis pallide caeruleis Amman. Rar. 46.

4. Moldavica Orientalis Salicis folio, flore parvo purpureo Inft. R. H. 11.
5. Moldavica minor caelestis, Chamaedryos folio Amman. Rar. 48.

MOLUCCA spinosa Dod. Pempt. 92. Inft. R. H. 187.

MOMORDICAE 2. subiunge.

MORSUS RANAE foliis circinatis, floribus albis Tournef. in A8. Acad. R. Sc. Ao. 1705. pag. 512. Tab. 4 fig. 1. *Nymphaea alba minima* C. B. Pin. 193. *Nymphaea minor*, five *Morsus Ranae* L. B. 3. 773. *Morsus Ranae* Dod. Pempt. 583. *Microleuconymphaea* Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 282. In palustribus Agri Pisani, & Lucensis frequens.

MUSCARI 2. subiunge.

Est *Hyacinthus comosus albus cum staminibus caeruleis* L. B. 2. 584. Bulbi florestis alterum genus *Caesalp.* 402. ex Mich. Rar.

Pag. 66.

MYRRHIDI 2. subiunge.

Caule villosus est, maculatus, & ad genicula ventricosus.

NARCISSO 9. subiunge.

Est *Narcissus alter copioso flore* *Caesalp.* 417. Mich. Rar. Flor. ex albo palefcit. Molestia plerumque copia Agros circa Pisarum Urbem infestat, praefertim Portam Lucensem inter, & Calensem alle Piaggie nuncupatam. Odor florum adeo gravis est, ut caput laedat: propterea vulgus Giracapo nomen Plantae huic tribuit, quasi vertigines excitare potis sit.

Pag. 67.

NICOTIANAE 3. subiunge.

4. *Nicotiana minor* foliis amplioribus, rugosioribus Boerb. Ind. Ale. H. Lugd. Bat. part. 1. 230. Floris tubus linear 8. longus est, tres cum dimidia latus, sectionibus sesquilineum longis & viridis latefcientibus. Embryo ad basin minimi colore inficitur. Hujus & superiorum specierum universa superficies villis mollissimis pellucidis obvallatur, quae vasa excretoria sunt, & e summitate fundunt Resinam, seu Balsamum quod folia virentia nodosa efficit, fœcis autem odorem conciliat, & pituitariam membranam irritat: hoc item Chimico artificio secretum veneficas vires assumit.

NIGELLAE 3. subiunge.

An *Melanibium Damascenum* flore pleno Eyss. aest. O. 2. f. 10. Folia proferit Foeniculacea: floremque multiplici petalorum serie ornatum, quae rhomboidalia ferme sunt, candida, plerumque in summitate laciniata, & caeruleo colore distincta.

NYMPHAEAE subiunge.

In Paludibus Blentinensibus sponte provenit: in Lacum autem Horti nostri translata laetissime germinat, & flores multos venustissimos Tulipaeformes profert.
2. Nym-

2. *Nymphaea lutea* maior C. B. Pin. 193. Inſt. R. H. 261. Boerh. Ind. Alr. H. Lugd. Bat. part. 1. 281. In pulcherrimis Ficeclenſibus ac Blentinenſibus abunde provenit, iaque Lacu Horti noſtri ſimul cum ſuperiori germinat, ſed ſtipes nondum protulit; cor tamen ex ipſis Paludibus Blentinenſibus obtinuit, & in Muſaſco Cl. Antonii Cocceii Praeceptoris Amicique ſummopere colendis examinavit. Folia quinque exteriora ovata, & in ſummitate nonnihil cordata, calycis vicem praeflantia, colore auro primo ſulgent, matureſcente autem ſenſu ampliuntur, criſſeſcunt, & e luteo viſcunt. Fructus ſiſiformis minas turbiatus eſt quam Tab. 138. Inſt. R. H. repraeſentet. Eſt cortex multiſariam & irregulariter ſcindiſur, ac in fruſta per aquam diſpergitur, adeo ut vinculis ſoluta pulpa, in 10. vel 12. ſegmenta peculiari membrana alba ſaluſa, loculamentorum Mali Aurantii ſimilia, dividatur, & aquae innatet. Plena haec ſunt mucis quodam inſipido nullis verſiculis, ſeu in Mulo Limonia, incluſa, quod ſaponis vicem praeflare poſſet in abluendis pannis, & Oleo Olivarum facile admixtur. Semina tali mucis immerſa, Tritici granorum aemula, pulpam claudunt Anguriae ſeminum ſaporem referentem.

NYMPHOIDI ſubiungetur.

Foliorum ſuperſicies inferior veſiculis acre plenis contexta eſt, quarum auxilio aquae innatare poſſunt.

Pag. 68.

OLEAE ſubiungetur.

Folia utrinque acuminata ſunt, lineas 30. longa, quinque cum dimidia lata. Fructus octo ſerme lineis longus eſt, quatuor vero in diametro habet, intus niger, pulpa tenuis aridiſcula, & ſucco oleoſo ſerme deſtituta.

Duas alias Oleae ſilveſtris, ſive ſpontaneae ſpecies in Hortum tranſſuli, repperat Ana. 1742. in Montibus Piſanis, praefertim prope Agnatum: ſunt autem.

2. Olea ſilveſtris, an minimo racemato fruſtu coracino H. Cathol. 155.?

3. Olea ſilveſtris fruſtu racemolo grani Piperis magnitudine & forma Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

OMPHALODES Luſitanica Lini folio Inſt. R. H. 140.

ONAGRAE 3. ſubiungetur.

4. *Ooagra Bonariensis villoſa*, flore mutabili H. Eltham. 297. fig. 286.

ONOBRYCHIDI ſubiungetur.

2. *Onobrychis Florentina* perennis elatior & erectior, foliis Viciae, flore rubello ſtris ſaturationibus diſtinſto, fruſtu compreſſo aculeato & vix criſtato Micheli H. Piſ.

ONOPORDO 1. ſubiungetur.

Floſentis cuius omnes formae proferit, nempe hermaphroditos, tuba non bifida, & vagina inſtructor. Semina puppoſa ſunt, inſidentia Thalamo cellulato ſervi inſtar. Calyx conſtat ſquamis ſimplicibus validiſque.

ONOPORDO 2. subiunge.

3. Onopordon spinosissimum incanum longius radiculatum, foliis angustis usque ad costam in acutas lacinias assidue divisis, caule praesto decem crispis & angustis alis aucto, flore purpureo viscolo odore, calyce Cinaræ. An Rizzo, o Kutro Aug. 142. Polyacantha Theophrasti Tabern. Icon. 701. ? Mich. Rar. Squamæ calycis amethystinae sunt.

OPULO 2. subiunge.

In petiolis foliorum observavi appendices duas longas claviformes, & octo vel novem glandulas acetabuliformes, e quibus inuente Aestate liquor pellucidus exillat.

OPUNTIAE 3. subiunge.

Humifusa, seu pendula est, foliis seu ramis oblongis, compressis, spinisque variis & longis exasperatis. Flores lucens est, monopetalus, Malvæ instar ad centrum usque fissus, & totus simul decedens. Fructus ruber vinoso viscosoque saccò turget. Quamvis autem exotica planta sit, acri nostro adeo assuevit, ut sponte oriatur variis in locis, praesertim in Collibus Imprunetæ. Figura Ficus Iadicæ Matib. 311. Plantæ huic aptari posset, nisi quod erecta exprimitur. De duabus superioribus Opuntiae speciebus. V. H. Eltiam. pag. 397. Tab. 295.

OREOSELINO 2. subiunge.

Est Seseli Creticum in maritimis, & Collibus arenosis Caesalp. 295. Scmian gerit quasi circinata ex Mich. Rar.

OREOSELINO 3. subiunge.

Est Seseli Peloponense alterum Caesalp. H. sic. pag. 39. num. 98. Seseli Creticum alterum in montibus, pluribus ab una radice caulis Eiusd. in Op. 295. Mich. Rar.

ORNITHOGALO 4. subiunge.

Petalæ lineæ 4. longæ sunt, unam latam.

ORNITHOGALO 5. subiunge.

Folia bina e radice exennt formæ palmariæ, sesquilineam lata, & canalica. lata, Amygdalarum sapore. Canlis inter hæc truncus Mæst Februario, palmari, rubens, in summitate folia duo gerit, quorum unum minus, lineas duarlatum, ex adverso maioris quinque lineas lati prodiit. E fin istorum foliorum surgunt petiola duo nonnihil compressa, quorum unum altero longius, biunciale nempe, subinertia flores quatuor vel sex umbellatim dispositos, conflantes petalis sex acuminatis, externe virentibus, interne & viridi lutescentibus, lineas septem longis, ac sesquilineam latis. Pistillus trigonus, glaber, taba

tuba hirsuta munitur, summisque sex luteis stipatur. Folia superiora, petioli florum, ut pars petalorum inferior, praeterquam in margine, alba molique laevigine pubescent.

OSMUNDAE subinuge.

Flores, quemadmodum Michelinus in *Adversariis* adnotavit, ad calcem ramusculorum fructus subsistentium rotatim nascuntur. Sunt autem filamenta ramosa, filulosa, & nodosa Confervae instar, nodis rubris, internodiis vero albis. Copiose germinantem, & ad humanum ferme saturnum elatum inveni circa vetustas Vitrioli fodinas prope Stazzemam, secus torrentem il Canale del-le Mulina diilum.

OXYDIS 2. nomen ita corrigendum.

Oxys lutea erecta, seu caulifera, nostras, &c. V. H. Elsbam. Tab. 221.

Planta annua est, & radice nititur capillari. Caudis unicus hirsutus, ad exortum rubens, superne viridis, ad sesquipedis altitudinem assurgit. Ex eius nodis inferioribus filia foliaria, e superioribus vero terna prodeunt simul cum petiolo flores subsistente. Folia Oxidis vulgaris similia sunt, nempe trilobata, cordata, & reflexa, margine & costis pilosis, petiolo item piloso, sensimque angustato. Petioli flores subsistentiu trinucialia sunt, in summitate trifariam diviso, adeo ut ramulus intermedius florem unum subsineat, laterales autem bina. Calyx florum sesquilinearis in quinque foliolo acuminata ad centrum usque scinditur. Petalum campaniforme, patens, luteum est, interne saturatius, & splendet, linear duos cum dimidio ultum, ore in fessioes quinque oblique cordatas, & convolutas diviso: uduellitur autem fundo calycis ope unguem quinque. Stamina duplici serie distribuntur; quinque enim exteriora lucuria, quinque vero interiora & ex adverso sita sesquilucuria sunt. Embryo tubis quinque instruitur, & punctulis rubris circa basim ornat: ubi autem per maturitatem in sitiquis quinquangulares nonnihil incurvus, villis horizontaliter suis indutas, lucam ferme in diametro habentes, sexque lineas ultas. Semina rubentia & rugosa, calyptra crassiuscula alba elastica munitur. Supor totius Plantae valde acutus est.

Pag. 71.

PAEONIAE 1. subinuge.

Est Paeonia mas flore purpureo Eysf. Vern. O. 6. f. 10. Folia superne atroviridia, & splendentia sunt, lobis amplioribus inferne pubescentibus. Flores purpurei sunt, ampli, beneapetuli. Ex Mich. Rar.

PAEONIAE 2. subinuge.

Foliorum lobi angustiores sunt, & nonnihil incis: Flores autem minores quam superioris, rubri, & octupetali.

PAEONIAE 3. subinuge.

Est Paeonia polyanthos flore rubro Eysf. Vern. O. 6. f. 2.

PALMAE 2. subinuge.

Est Chamaeriphes uricarpus, spioosa, folio flabelliformi, Ponted. Ansthol. 147. Per Montem Argentarium, & in Insulis Maris Tyrrheni, seu Urgone, Planasus,

naſa, *Igitio*, & *Monte Chriſti* ſponte naſcitur. In Horto noſtro ſpatbas ſlo-
riſeras tres vel quatuor ſingulis annis proſeri verno tempore, quales a *Cl.*
Pontaderio deſcribuntur. Spadicem untem, ſeu racemum fructuum obſervare
ſemel contingit inter Maris repurgamenta collectum, qui figura ad *Vitis* Bo-
trum quodummodo accedebat, proindeque *Uva Marina* a poſſeſſore nuncupaba-
tur. Spadix erat colore buxco, compreſſus, validus, fibris, longitudinibus con-
ſtans, in ramos plures diviſus, quorum ſummitates udbaerebunt fructus e. ro-
tunditate acuminati, fructuum *Lauroceras* Tbal. Tab. XIII. aemuli, duri, lac-
ves, nigri. In baſi muniebuntur tribus cartilaginibus brevibus obtuſis, quae,
ni fallor, calyx ſloris fuerant.

PANICO 2. ſubiungetur.

PAPAVER hortenſe ſemine albo, ſativum Dioſcoridis, album Plinio C.
B. Pin. 170. Inſt. R. H. 237. Papaver album Offic.
2. Papaver hortenſe nigro ſemine, ſilveſtre Dioſcoridi, nigrum Plinio C.
B. Pin. 170. Inſt. R. H. 237. Papaver nigrum Offic.

PARNASSIAE ſubiungetur.

PARONYCHIA Hiſpaoica Cluſ. Hiſp. 478. Inſt. R. H. 507. Calyx li-
nearis eſt, monophyllus, quinqueſariam ad centrum uſque diviſus, ſectronibus
oblongis in extremitate cucullatis, gibbo in aculeum abeunte, extus diſſiſſis &
viridibus, in margine & intus albis. Stamina quinque breviffima, alba, ap-
ices aurcos ſubſtinent.

PASTINACAE ſubiungetur.

PEDICULARIS Alpina altera, Aſphodeli radice Inſt. R. H. 173.

Pag. 72.

PERIPLOCAE 3. ſubiungetur.

Calyx ſloris quinqueſidus, & viridis eſt. Floſ rotatus in quinque partes ad
centrum uſque dividitur, utrinque e luteo virescentes, ſuperne autem lineis
tribus purpureis ad umbilicum diſtinctas. Nectarium dentibus quinque ac-
uminatis coronatum, album eſt, ac deſillat ſuccum quemdam lentum, cui pe-
dibus implicatas, & veluti conſpitas haerere obſervavi innumeras exiguas Mu-
ſcas ex *anapaſſa* bipeunium non ſavificuntium claſſe, unam plerumque in quolibet
floſe. Haud aliter *Coronatus* aſſerit floſem *Apocoyi* ſui maioris Syriaci recti
lentore quodam extrinſecus obduci, quo ſas in pedibus implicatas Muſcae haerent,
quae & odoris, & ſaporis gratia alleſtae frequenter advolant. Tale quidem
Apocynum fournit un ſuc doot on fait du ſucce eo Canada: oo ramaiſſe la
roſée qui ſe trouve dans le fond des fleurs, quemadmodum legitur in *Memo-*
rabilibus Academiae Regiae Sc. An. 1730. pag. 90. Ita quoque Mel *Aſclepia-*
dis Creticae ſuae Muſcis pernicioſum eſſe deprehendiſſi Cluſius Kar. CCLV. quan-
doquidem illas floribus ruſidenter enecatas repperiſſi. Tandem ſlorum quorum-
dam Mel Apibus noxium eſſe ſatis conſtat.

PERVINCAE. 2. ſubiungetur.

Eſt Herba *Vinea* in *Etruria* Marcelli Virgilii in Dioſcoridem L. 4. cap. 140.
an *Pervinca Orientalis*, villoſa, floſe magno violaceo Coroll. Inſt. R. H. Muſc. Kar.
Pag.

Pag. 73.

PHALANGIO subiunge.

Petala florum lactea sunt, striis pellucidis distincta: tria tamen exteriora ceteris angustiora sunt.

2. *Phalangium alpinum palustre*, Iridis folio Inst. R. H. 368.

PHASEOLO subiunge.

2. *Phaseolus puniceo flore* Corn. 184. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 2. 28.

3. *Phaseolus Aegyptiacus nigro semine* C. B. Pin. 341. Inst. R. H. 414. *Siliquae chartilagineae, ventricosae, buxae, & semina nigra bilo amplo nigro praedita, signae Phaseoli peregrini* XIV. Leblab Clusii Rar. CCXXII. respondent: *Planta tamen aborea non est, sed herbacea, & sarmentosa, Phaseoli hortensis in morem. Ad topiaria opera floribus elegantissimis sese commendat; qui lili, vel Lathyrj flores magnitudine aequant, inque speciebus crebris dispositi sunt. Duas huius Plantae varietates in Horto colimus, quarum una flores niveos, altera purpureos, aliae tamen saturatioribus gerit.*

PHELLANDRIO subiunge.

Est Phellandrium palustre, tenuifolium, caule crasso, assidue ramofo, & ad nodos veluti umbellifero, umbellis parvis albis nudis, &c. Mich. Rar. Epaludibus Blentiacensibus rursus attuli.

PHLOMIDI 3. subiunge.

Folia ceteris minora sunt, rugosiora, ad basin complanata, vel tantillum acuminata. Flor superioribus minor est, calyculorum angulis quodammodo barbatis.

PHYTOLACCAE subiunge.

Floris corolla, seu calyx persistens, & fructum maturiscentem amplectens, uno tantummodo, non autem quinque foliolis constat: scinditur enim in quinque partes, quae petala aliis, aliis Calycis sectiones visas sunt. Quamvis exotica Planta sit, aeri tamen nostro ita assuevit, ut in plerisque locis sponte proveniat, praesertim in sulcibus Arni fluvii.

2. *Pyrolacca Mexicana* baccis sessilibus H. Eltham.

PILOSELLAE 1. subiunge.

Repens est.

Pag. 74.

PIMPINELLAE 8. subiunge.

9. *Pimpinella Canadensis* spica longa rubente H. R. Par. Inst. R. H. 157.

PINO 2. subiunge.

Est potius Pinus silvestris, montana, & maritima, procerior, foliis palmatis, crassis, peramaris, fructu angusto, pyramidato, spithamam longo, deorsum

sum reflexo, cum squamis elevatis & cuspidatis. *Pinus maritima altera* Mattb. lc. 112 l. B. 1. 258. *Pinus maritima* H. Tabern. Icon. 937. Lugd. 45. *Pinus silvestris* in maritimis Senensis, fructu palmari pyramidato firmiter adhaerente Mattb. Desf. 115. num. 20. & 30. *Pinus silvestris maritima* const. firmiter ramis adhaerentibus l. B. 1. 257. sed Desf. *Pinaster* l. Caesalp. 130. *Figura quam Matthioli exhibet omnium optima est.* Mich. Rar. In Montibus Pisani abunde provenit.

PINO 3. subiunge.

Ex Alpibus Latobricis attulit Michelin.

4. *Pinus lativa* fructu pyramidato acuto, squamis proceris acutioribus, o-ficulis fragilibus, & veluti deussis, calyptera seminum albicante. *Pinus Tarentina* Plin. Libr. 15. cap. 10. Mich. Rar. Pino siaciamae vulgo.

PLUMBAGINI subiunge.

Caulium & calyculorum superficies vasculis excretoriis villiformibus vestitur, e quorum summitate exillat liquor quidam lentus. Dum ramulos huius Plantae sceletorum conficendorum gratia exsiccarem, observavi eos ebantam rubro colore infectisse. Varietatem tandem colimus flore dilutiore, eamque in paludibus Liburnensibus secus Stagnum Pontis & Cauponam magna in copia reperi.

Pag. 75.

POLIO 2. subiunge.

Folia latiuscula proferit a medio ad summum serrata. Est *Hyssopus Apulus* Dioscoridis, & Serapionis Col. part. 1. 67. *Polium montanum* ramulis dodrantalibus humi sparsis, foliis oblongis, angustis, leviter circum denticulatis, molli lanugine hirsutis, flosculis candidis Caesalp. 457. *Polium montanum* Eiusd. in H. Sic. pag. 129. num. 345. an *Polium montanum album* serratum latifolium erectum maius Barr. Obs. 34. num. 325. Icon. 1079. an & *Polium montanum album* serratum latifolium supinum maius Eiusd. 326. Icon. 1074. Mich. Rar.

POLIO 3. subiunge.

Folia angustiora quam superioris sunt.

POLYACANTHAE 1. subiunge.

Speciem hanc Michelin Rar. ita descripsit. *Polyacantha maior* annua, foliis Acanthi venis lacteis notatis, capitulis purpureis pluribus simul iunctis. An *Carduus leucographis* purpureus, capitulis acutissimis, ac ferocissimis spinis eminentibus subcircumdati. H. Catbol. An *Polyacantha maior* lanceolato folio, flore purpureo Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1718. pag. 199. num. 5. Eandem quoque habemus flore albo Mich. Rar.

POLYGONATO 1. subiunge.

Est *Polygonatum maius*, caule anguloso crassiore & minus procero, foliis amplioribus subrotundis, floribus albis maioribus, odoris, in perbrevis pediculo huius plerumque eascentibus. Mich. Rar. Fructus rotundus est, lineas quinque in diametro habens.

POLY.

POLYGONATO 3. subiunge.

Fructus pyriformis est, lineas 4. longus.

POLYPODIO 3. subiunge.

Est Polypodium maius, pinnulis longis ad oras undulatis & serratis. Polypodium minus serrato folio Barr. Obs. 116. num. 1264. Leon. 38. Mich. Rar.

POLYPODIO 5. subiunge.

POLYPODIOIDES vulgaris, foliis angustis partim ad terram reclinatis & sterilibus, partim erectis & seminiferis. *Polypodium angustifolium folio vario Inst. R. H. 540. Lonchitis minor G. B. Pin. 359. Lonchitis altera folio Polypodii L. B. 3. 744. Lonchitis aspera Dod. Pempt. 469. Mich. Rar. A Polypodii speciebus, inter quas n. 3. In hoc Catalogo relatum fuerat, subiunxit Michelson, & ad novum genus revocavit, eo quod in ramulis, seu foliis frangiferis pinnularum pars inferior unica seminali capsula oneretur. In Montibus Pisani, ac praesertim in Valle Busensi inter aquarum stillicidia in ripa quadam secus viam quae Entium ducit abunde provenit.*

Pag. 76.

POPULAGINI 1. subiunge.

An Farfargio Matth. 895. Populago maior Tabern. Icon. 750. ex Mich. Rar. Flores a dimidio Martio Mense, ad dimidium usque Aprilem profert.

POPULO 3. subiunge.

4. Populus tremula foliis minoribus, & magis angulosis, marginulis ciliis inftar pilosis, pediculis brevibus appensis. Populus folio leviter serrato, inferne subbifido Caesalp. 121. Mich. Rar.

PRUNO subiunge.

PSEUDOACACIA vulgaris Inst. R. H. 649.

PSEUDODICTAMNO 4. subiunge.

Tomentum quo Plantae superstitiae universa vestitur, consistit villis ramosis, nempe villulis alternis & rotatis in spiram dispositis, ac in summitate in stellulam terminatis, e cuius centro guttula Balsami pellucidi extillat: aliud item Balsamum extillat e glandulis ad basin villorum istorum sitis. Stellulae memoratae si plantam naribus appresseris, facile divelluntur, membranamque olfactoriam vellentes sternutamenta cient.

5. Pseudodictamnus amplissimo Melissae folio crenato villosio & subincano, flore purpureo, calyce angusto infundibuliformi, Mich. Rar.

PSEUDOSPONGIAE subiunge.

Plantae hae referenda est ad Badiagae Genus ab I. C. Buxbaum institutum in T. 2. Comment. Academiae Scient. Imper. Petropolis. An. 1727. Diversa tamen est a tribus speciebus quas Buxbaumius ibidem recenset.

Pag. 77.

PSEUDOSTACHYDI *subiunge.*

2. Pseudostachys Alpina nigra maxima, foliis amplissimis ad Viburnum accedentibus, flore ex albo purpurascente nonnihil variegato. *An Salvia Alpina Tabern. Icon. 372.?* Mich. Rar. quae in hoc 1250 Catalogo pag. 92. inter Stachydis species relata fuerat.

3. Pseudostachys montana nigra maior, Betonicae folio, flore variegato: Galeopsis montana Betonicae folio angustiore, flore variegato Michx. H. Pf. Salvia silvestris altera nigricans Caesalp. 441. Mich. Kar. Haec item inter Stachydis species num. 11. descripta fuerat.

Ad Pseudostachydis genus revocavi Michxelin eas plantas, quae Stachydis quidem faciem praefecerunt, at calyces florum campanulatos, non vero tubulatos gerunt.

PTARMICAE 1. *subiunge.*

Flores insident seminibus nudis, & ab invicem distinguuntur foliis quibusdam oblongis, ciliis inilar pilosis, Thalamo adfixis.

PTARMICAE 7. *subiunge.*

8. Ptarmica, quae Achilles tomentosa & incana, pinnulis cristatis, flore ochroleuco Vail. in Ad. Acad. R. Sc. An. 1710. pag. 418. species 6. varietas.

PULMONARIAE 8. *subiunge.*

PULSATILLA flore clauso obsoleto Helwingii Florae Campana pag. 65. Tab. 11.

Pag. 78.

QUINQUEFOLIO 1. *subiunge.*

An Quinquefolium minus flore pallide luteo Just. R. H. 197.?

QUINQUEFOLIO 6. *subiunge.*

Est Quinquefolium minus erectum incanum & tomentosum, foliis tenuiter divisus superne viridibus, flore luteo parvo, petalis obtusis Mich. Rar.

QUINQUEFOLIO 11. *subiunge.*

Folia subius incana sunt, & semina lanuginosa.

RANUNCULO 6. *subiunge.*

Folia subrotunda sunt, in basi dentata, vel sinuata. Petala lineari decem longa, iterum dimidia lata, superne aurea & splendentia, ac in ungue recurvo oblongo instructa sunt. Calyx tribus foliolis oblongis consistit coarctatis inftar excavatis, & ad exortum caudatis, foliorum Sedi vermiculati inftar.

RANUNCULO 7. *subiunge.*

Folia superne secundum nervos profunde sulcata sunt. Petala florum unciam longa, lineari autem quatuor lata sunt.

RANUN.

RANUNCULO 8. subiuuge.

Petala linear novem longa sunt, tres autem lata.

RANUNCULO 14. subiuuge.

Est Ranunculus Lusitanicus Autumnalis, Asphodeli radice, foliis subrotundis serratis, caule simplici nudo hirsuto, flore parvo luteo odorato, &c. Mich. Rar.

RANUNCULO 46. subiuuge.

Hanc & sequentem ad Alismae Genas revocavit Michellius Rar. primamque appellavit: Alisma aquatica maior, Plantaginia folio ampliore, floribus paniculatis ex albo purpurascens, fructu umbilicato, &c. Alteram vero: Alisma aquatica media, longo angust. Plantaginia folio, floribus paniculatis ex albo purpurascens, fructu umbilicato, &c.

Pag. 80.
RANUNCULO 48. subiuuge.

49 Ranunculus Phragmites albus vernus I. B. 3. 412. Infl. R. H. 885. Anemonides vulgaris monanthos, flore albo Vahl. in Atl. Acad. R. Sc. An. 1719. pag. 39. num. 1.

50 Ranunculus arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo luteo Mor. Hist. Oxon. part. 2. 440. Infl. R. H. 290.

RAPISTRO subiuuge.

Semen globosum infidet basi coarctae fungosae.

2. Rapistrum Pannonicum maius, Panacis Heraclei foliis, radice maxima esculenta D. Bolland. Tataria Hungarica Clus. Hist. CXCI. Cl Vir Jo. Bapt. L. B. De Passand S. C. M. Angustissimi Romanorum Imperatoris Magnique Ducis Nostri Archiatrorum Comes An. 1738. Plantarum ferme omnium Pannonicarum & Austriacarum a Clusio descriptarum semina, sed vetusta arida, & plerumque evanida, mecum perhumaniter communicavit, a se ante multos annos summo labore coarctata in gratiam Magni Boerhaavii. In his erant semina Tatariae Hungaricae collecta An. 1734 quae magnitudine, colore, & figura semina Coriandri Officiarum quodammodo referebant; sed utrinque acuminata erant, costulis quatuor per longitudinem distincta, lacunis intermediis rugosis, Piperis granorum instar; nucleumque fovebat unicium, rotundum, acre, oleosum, cute nigricante tectum. Haec autem in Horto nostro terrae commissa germinarunt Maio Mense, quatuorque tantummodo folia e radice protulerunt ampla, qualia Clusius describit: adolescente vero aetate prorsus perierunt, antequam caulem floresque exererent.

RAPUNCULO 2. subiuuge.

Est Scabiosa Caesalp. H. Sic. pag. 31. num. 355. Folia graminacea sunt & serrata; spica autem florum longa caerulea: ex Mich. Rar.

RESEDAE subiuuge.

Est Reseda petennis glabra, foliis pinnatis, pinnulis densioribus crispis, floribus albis pentapetalis, staminibus luteis, capsulis quadrangulis. Reseda Pli-

Phinii Hist. Nat. Lib. 17. cap. 12. *Refeda candida* Lugd. 1119. sed *Desf.* *Refeda crispata* Gallia Boc. Rar. 77. *Refeda Massiliensis*, foliis latioribus crispis Plut. Phytogr. Tab. 55. fig. 4. *Raii* Hist. tom. 3. 511. Mich. Rar. In montibus & Agro Urbis Ariminensis sponte provenit, quemadmodum *Plinius* adnotavit.

2. *Refeda minor* annua, *Bellidis* folio, floribus tripetalis albis, petalis bifidis, sectionibus digitatis, fructu crassiore trigono cernuo, semine granulato. An *Refeda minor vulgaris*, foliis integris *Infl.* R. H. 423? Mich. Rar.

RHAMNOIDI subinuge.

Species quas in Horto colebatur, at superiori hyeme periit, quemadmodum ex floribus, quos semel tantum protulit, cognovi, erat potius *Rhamnoides* florifera *Salicis* folio Coroll. *Infl.* R. H. 53. Flores ad basim ramusculorum foliorum erumpebant mitrati, seu foliolo unico cinereo duplicato & connivente, mitrae, vel *Atriplicis* fructuum instar: singulis sectionibus duo brevissima flamina adhaerebant apicibus oblongis instructa.

RHAMNO subinuge.

Micbelius Rar. Florem non in hac tantum, sed & in aliis *Rhamni* speciebus non monopetalum, sed rosaceum observavit.

RHAPONTICOIDASTRUM altissimum, caule non alato, *Salicis* folio amplo serrato, subtus incano & tomentoso, capitulo rotundis purpureis parvis umbellatis, calyculorum squamis in latiore & tenuissimum apicem desinentibus Mich. Rar. Est *Serratula Virginica Persicae* folio subtus incano *H. Elsbam.* pag. 356. Tab. 264. *Rhaponticoidastrum* genus a cognatis differt, eo quod ibi alamus florum nudus sit, villis nempe prorsus destitutus.

RHAPONTICOIDES maxima alato caule, foliis amplissimis *Cichorii* instar divisis, glaucis, & glabris, floribus luteis. *Laccae* *Babylonicae* similis maximae, floribus paniculatis *D. Sberard Raii* Hist. T. 3. 207. Mich. Rar. quae proinde ab *Laccae* speciebus inter quas superius pag. 51. primo loco descripta fuerat sciungenda est.

2. *Rhaponticoides* maior, folio in amplas lacinias diviso *Vaill.* in *Ad. Acad.* R. Sc. An. 1718. pag. 227. num. 11. *Centaureum* matur, folio in lacinias plures diviso *C. B. Pin.* 117.

3. *Rhaponticoides* annua, foliis *Cichoriaceis* villosis, altissima, flore purpureo *Vaill.* ibid. pag. 228. num. 20. *Lacca* talis in hoc Catalogo pag. 51. num. 15. descripta.

4. *Rhaponticoides* frutescens, *Helichrysi* folio, calyce cylindraceo *Vaill.* ibid. pag. 227. num. 10. *Lacca capitata Rorismarini* folio *Infl.* R. H. 455. *Cbrysocome* alia in montibus, pluribus capitulis in unum aggregatis *Caesalp.* 539.

RHAPONTICUM humile, capite magno *Strobili* *Vaill.* in *Ad. Acad.* R. Sc. An. 1718. pag. 224. num. 3. *Centaureum* maius incanum humile, capite *Pini* *Infl.* R. H. 449.

2. *Rhaponticum* folio *Helenii* incano *C. B. Pin.* 117. *Vaill.* ibid. num. 1. *Centaureum* maius, folio *Helenii* subtus incano *Infl.* R. H. superius in hoc Catalogo pag. 23. num. 2. descriptum.

3. *Rhaponticum luteum*, luscidius folio, alato caule Vaill. ibid. num. 4. *Centaurium minus Orientale erectum*, Gladii folio, flore lateo Coroll. Insl. K. H. 32. primo loco in hoc ipso Catalogo recensitum.

4. *Rhaponticum tenuifolium laciniatum*, calyculis argenteis, minus Vaill. ibid. n. 5. *Lacea calyculis argenteis minor* Insl. K. H. 444. *Planta annua est, subaspera, caule anguloso, foliorum lobis plerumque integris, floribus purpureis.*

Præterea ad hoc genus revocandæ sunt Plantæ in hoc Catalogo pag. 51. inter *Iaceæ* species descriptæ, sub numeris 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. & 23.

RICINOIDI *subiuge*.

Semina per plures annos in terra delitescunt, & his tantummodo, quod meminimus, pluribus interiectis annis sponte germinarunt, ea copia ut arcum Horti infestarent. In superficie foliorum observavi plures villas stellatiformes, similes illis quos in *Matua* 6. supra descripsi.

ROSÆ 5. *subiuge*.

Spinis crebrius munitur. Folia subrotunda sunt, simpliciter dentata, superne glabra, inferne subhirsuta. Flor odoratus petalis conjatis plurimis, linear. 10. plerumque longis, & cordatis: staminum locum occupant petala quaedam minora, reflexa, & convoluta. Calyx, & fructus bispidi sunt.

Eius varietatem colimus foliis acutis præditam.

ROSÆ 6. *subiuge*.

Pumila est, spinis tenuissimis armata. Folia habet oblonga, acuta, utrinque glabra, serrata, & ad petiolam cordata. Flor saturatioribus, inter holosericeas, petalis octo usque ad septimum dilatatis, & antiam longis constant, stamina & apices aureos habet. Fructus rotundus simul cum calyce & pediculo bispidus est.

Eius varietatem colimus flore purpureo.

Pag. 81.

ROSÆ 7. *subiuge*.

Pumila est, spinis raris tamquam villis exasperata. Folia acuta sunt, non, vel vix crenata, superne glabra, inferne subhirsuta. Flor semiplenes, odoratus, petala habet lata, cordata, ex purpureo albo & rubro variegata, calycem vero & fructum subbispidum.

ROSÆ 11. *subiuge*.

Erecta est, in arbuticalem plerumque assurgit, & validis rarisque spinis armatur. Folia Myrti proferit inferne nonnihil hirsuta, leviter & simpliciter dentata. Flores suavis odorati pluribus petalis albis semiancialibus & cordatis constant. Fructus exiguus est, oblongus, & lævis.

ROSÆ 12. *subiuge*.

Hæret, & quarundam aliarum Rosæ silvestris specierum folia Balsamo quodam illita sunt, *Glycyrrhizæ* foliorum instar.

RORI-

RORIMARINO 2. subiunge.

Est Rosmarinus coronarius spontaneus in Ilva Caesalp. 458. An Rosmarino Coronario Mattb. ed. Valgrif. in fol. An. 1585. pag. 833. Mich. Rar.

RUBEOLAE 4. subiunge.

Planta sarmentosa est, viticulis quadrangularibus procumbentibus. Folia quae ad singulos nodos rotatim nascuntur, rigidiuscula sunt, lineae 7. longa, semilineam lata. Flores sesquilineam longi, Lilae instar quadrifariam scissi, extus carnes, intus albi sunt, sectionibus in extremitate eleganter cuneatis. Apices quatuor rubri sunt; semina vero bina, Bupleuri perfoliati similia.

RUBEOLAE 6. subiunge.

Est Gallium arvense flore caeruleo Infr. R. H. 115. Rubia caerulea erectior, & clatior J. B. 3. 719. Ex Mich. Rar. Planta annua est.

Pag. 82.

RUBIAE 1. subiunge.

Ramuli, seu viticuli quotannis pereunt (secus ac infrequenti specie) radice virida rubraque remanente. Flores herbacei sunt, quinquefariam scissi, sectionibus acuminatis, lineam longis, staminibus praeditis quinque brevissimis, apicibus lutescentibus subtruncatis. Embryo tuba alba instructus abest in baccam pisiformem compressam.

RUBO 7. subiunge.

Sarmenta crassiora pentagona sunt, aculeis longis aduncis munita. Folia Corylacea, superne glabra & virentia, inferne incana & pubescentia, ad cras nonnihil undulata, & varie crenata sunt. Petala subrotunda, lineae septem longa, quinque lata, interne rosea sunt, externe albescent.

RUBO 8. subiunge.

9. Rubus Idaeus spinosus C. B. Pin. 479. Infr. R. H. 614. Calycis squamae repandae sunt; Petala vero alba, lineae tres longa, sesquilineam lata simul cum staminibus erecta sunt, & Embryoni appressa. Fructus dulcissimi Lamponi vulgo vocantur, & ad lulapia conficienda expetuntur ex Alpiibus Pistoriensibus adlata.

In 5. & 6. Rubi speciebus Aulorum nomina Typographorum vitio permixta sunt. Prius itaque est. Micheli H. Pif. Posterius vero Infr. R. H. 79.

RUTAE 2. subiunge.

3. Ruta silvestris foliis tenuiter lacinatis, lobis rarioribus & brevioribus, flore luteo, petalis angustis, ad marginem villis longioribus praeditis Mich. Rar. In rupibus prope Stazzenam collegi, inque Harium transulis An. 1743.

4. Ruta silvestris maior, foliorum lobis ad extremitatem dilatatis, & iuncterum cordatis, flore luteo, petalis cordatis D. Cocchi Mich. Rar. Hanc Michellus olim accepit a Cl. Viro Anton. Cocchio Amico praecipuo, in praeditis suis baud procul a Burgo S. Laurentii repertam: in Hortum autem nuper transfudit D. Mammius M. D. & Rei Herbariae Professor, qui Societatis Bot.

Botanicae iussu iter per Alpes Mugellanas instituit plantarum colligendarum gratia.

Pag. 83.

SABINAE 3. subiunge.

Ad Cedri Genus revocandae sunt hae Plantae, quemadmodum superius animadverti. Secundae speciei fructus baccas Iuniperi primo loco descripti accumulatur, sed duriusculus est, odoremque spirat magis resinosum; interne autem in tria localamenta dividitur, in quorum singulis semina bina bospitantur.

SALICORNIAE 2. subiunge.

Quamvis hae duae Salicorniae species in Maris tantummodo littore nasci solitae sint, eas tamen simul cum aliquot aliis littoreis plantis An. 1743. reperi laete germinantes in alveo Riquili il Salleto nuncupati, qui saltae aquas Balnearum Montis Catini in Nebulam fluvium derivat, quamvis ea loca triginta passuum millibus ad minus a Mari distent. Eae quidem Aquae marinas sapore aemulantur, si usuleam demas, rivulique memoratis alveus Sale marisio sumis saturus est. Sed quo nam pacto e Mari tanto intervallo seuiuello Salicorniae, Alterum in hoc Catalogo pag. 12. num. 9. & 11. descriptorum, & Alines 10. pag. 5. semina antiquitus huc delata esse credendum est? Et cur nam in pluribus rivulis haud absimilibus, qui Aquas saltae Saliuarum per Agrum Volaterranum obviarum excipiunt, nullae plantae maritimae vegetant? quemadmodum in Itinere An. 1742. comperi.

SALVIAE 3. subiunge.

Inferna foliorum pars glandulis numerosis instructa est, e quibus Balsamum, seu Resina lutescens guttatim extillat, quae plantam tactu viscosam reddit. In speciebus 4. & 8. resina alba est.

Pag. 84.

SALVIAE 14. subiunge.

Flor quandoque violaceus, quandoque dilute caeruleus est, labio inferiori ex albo variegato. In utraque foliorum parte, inter nervos, lacinae seu alveoli plurimi observantur, superne convexi, inferne cavi, villis procumbentibus undique obfiti. Spatia intermedia glandulis minimis semiglobosis instructa sunt, e quibus guttatim extillat Balsamum fragrantissimum & viscosum, quod in globulos colligitur, & plerumque villis adhaeret, plantam tactu glutinosam reddens, & per sevelutem ad lateum colorem vergit. Balsamum hoc nixae plantae usui medico aptissimam facit, prescribitur in capitis, ventriculi, & nervorum affectionibus nonnullis, in quibus decoctiones Theaeformes foliorum mirifice profunt. Aqua cum fervens foliis affusa Balsamum memoratum eliquat, sibi que admiscet, adeo ut in minima corporis nostri vascula penetrare queat. Ser. Cosmus III. M. D. Etr. An. 1718. e Malacae Hispaniae Urbis Agro in Hortos Pisani Florentinumque transferri curavit, quum prius folia tantummodo exsiccata ex Aragoniae maritimis in usus medicos expeterentur.

Y

SAM-

SAMBUCO 4. *subiunge.*

5. *Sambucus humilis*, sive *Ebulus*, foliis in longos & acutos lobos divisis, fructu maiore ovato. Magna copia germinantem inveni in Olivetis Petrajan-
tanis eundo vallem Castellii distam.

SANTOLINAE 3. *subiunge.*

*Floretulorum tuba bifida est, ipsi autem floretuli insident seminibus nudis, in-
vicemque separantur foliis seu squamis quibusdam. In Alpibus Petrae Apua-
nae sponte nascitur in fissuris rupium marmorearum, quemadmodum observavi
in editissimo iugo le Bocchette del Forno Volastro dicto.*

Pag. 85.

SATUREIAE *subiunge.*

2. *Satureia spicata* foliis tenuissimis (spica densissima) C. B. Pin. 218.
variet. *Satureia foliis tenuibus*, sive *tenuifolia Sancti Iuliani* quorundam I.
B. 3. 275. *Thymbræ Sancti Iuliani*, sive *Satureia vera* Lok. Icon. 425. Infl.
R. H. 198. *Clinopodium Caesalp.* 454. Mich. Rar. In Monte D. Iuliani, inque
Montibus Oliveti, Avanae, & Filetuli prope Pisar in saxorum crepidinibus
nascitur.

SAXIFRAGAE *subiunge.*

Saxifraga Sedi folio angustiore serrato Infl. R. H. 252.

SCABIOSAE 11. *subiunge.*

Apices rubri sunt.

Huius varietatem colimus floretulis ex albo & nigropurpureo variegatis.

SCABIOSAE 13. *subiunge.*

14. *Scabiosa stellata*, folio laciniato, maior C. B. Pin. 272. Infl. R. H. 465.

Pag. 86.

SCLAREAE 1. *subiunge.*

*Figura huius Plantae quam Rivinus exhibet T. I. Hormini nomine, optima
est. Universa Plantae superficies innumeris glandulis Balsamum extillantibus
repleta est.*

SCLAREAE 4. *subiunge.*

*Est Horminum silvestre, minus, haematode, glabrum, flore caeruleo, Itali-
cum Barr. Obs. 25. Icon. 185. ex Mich. Rar.*

SCLAREAE 14. *subiunge.*

*Flor parvus est, labio superiori violaceo vix bifido, inferiori cochlearis in-
star excavato, & simul cum tubo dilute caeruleo, ac circa faucem lineis qua-
tuor nigropurpureis distincto. Pistillus, stamina, & apices violacei sunt, pul-
visculumque luteum fundunt.*

15. Scla-

15. *Scalaria Pratenfis minor*, foliis longis, angustioribus, usque ad costam divisis, flore subcaeruleo. *Varietas* Hormini *Verbenae* lacinis angustifoliis Triumf. 166. Mich. Rat. In Agro Pisano, praesertim secus Viam Regiam Florentinam, & Liburnasem invenit.

SCOLYMO 1. *subiunge.*

Semisfistuli tuba, & *vagina instructi sunt*, insidentque *seminibus*, quae *aristis* 5. vel 6. coronantur, siquae sunt in folliculis, seu squamis thalamum totum occupantibus, marginatisque: squamae calycis interiores seminibus contiguas vaginam vicem praestant.

Pag. 87.

SCOLYMO 5. *subiunge.*

SCORPIUS maior arborefcens, longioribus & validioribus aculeis munitus, foliis Iuniperi subtus nervosis, seu striatis, floribus luteis, florum calycibus, & femuncialibus siliquis villosis. *Genistaspertium maior*, longioribus aculeis Just. R. H. 646. Bot. Par. 78. *Genistella spinoza maior*, longioribus aculeis G. B. Pin. 294. *Genistellae spinosae affinis*, Nepa quibusdam L. B. 1. 400. *Scorpius* L. Clus. Hist. 116. *Spina Christi* Caesalp. 117. Mich. Rat. quae in hoc Catalogo pag. 40. inter *Genistae Spartii* species primo loco descripta fuerat.

SCROPHULARIAE 2. *subiunge.*

Est *Scrophularia* Matth. 1188. Cass. 406. Dod. Pempt. 50. *Scrophularia maior* Ger. Emac. 716. Lob. Icoe. 533. *Scrophularia maior* Mattbioli Lugd. 1085. ex Mich. Rat.

SCROPHULARIAE 3. *subiunge.*

Respondet figurae & descriptioni *Scrophulariae maioris* Brunsf. T. 1. 213. *Osimastis alterius* Frag. 184. ex Mich. Rat. *Varietas superioris* est: Ambae autem folia gerunt tenuissime serrata, floremque rubrum labio inferiori viridi.

SCROPHULARIAE 4. *subiunge.*

An *Scrophularia Marilandica*, longo, profunde serrato *Urticae* folio Raii Hist. Tom. 3. 396. num. 14. ? ex Mich. Rat. *Montana* est: Flores proferit limbas 4. longos, atro & sordide purpureos, labello inferiori viridi, fructumque crassiorum acuminatum.

SCROPHULARIAE 7. *subiunge.*

Folia nitida sunt, leviter iacis incisuris denticulatis. Flores limbas tres longi sunt: calycis sectiones margine chartilagineo decorantur.

SCROPHULARIAE 12. *subiunge.*

Est *Scrophularia maior*, hirsuta, foliis lobatis, crassis, ad *Raphanum* & *Sinapi* accedentibus, flore rubro octo lineas longo, cum labello inferiori viridi, fructu crasso, pyramidato, peracuto. An *Scrophularia latifolia*, laciniosa C. B. Prodr. 113. *Scrophularia foliis laciniosis* Eiusd. Pin. 236. Raii Hist. 7663. Mich. Rat.

SCROPHULARIAE 13. *subiunge.*

Est Scrophularia maior, glabra, foliis crassis, lobatis, ad Raphanum accedentibus, flore maximo rubro, cum labello inferiori sulphureo pendulo, capsula obesa, pyramidata, & mucronata. *An* Scrophularia peregrina altera Rark. Theat. 611. f. Mich. Rar. *Flos octo lineas longus est.*

SCROPHULARIAE 14. *subiunge.*

Est Scrophularia minor, pereennis, glabra, foliis limis ad Attriplicem accedentibus, ceteris lobatis, flore trilineari ex rubro nigricante, cum labello inferiori viridi, fructu brevi acuminato Mich. Rar.

Pag. 83.

SEDO 2. *subiunge.*

Petala florum 11 circiter sunt, acuminata, inferne & in margine bisfuta, superne glabra, & purpureo & albo variegata: *filamina* 22. sunt, purpurea, apices subsistentia purpureos, palloviscilo luteo fetos.

SEDO 3. *subiunge.*

Calyx florum fissus est in 10. squamas bilineares, angustas, bisfutasque. *Petala* decem sunt semuncialia, intra calycem angusta, dein ad sesquilineam dilatata, rursusque in acumen abeuntia, gibba, seu squamarum cavitati sese accomodantia, bisfuta, extus carnea, ac inferiore parte virefcentia, intus rubra. *Stamina* lineas tres longa, rubra, apices rubros subsistent. *Embryo* capsulis 10. constat.

SEDO 4. *subiunge.*

Caulis pedales, glabri, glauci, seu pallentes, foliolis brevioribus subinde vestiti, in summitate in quatuor radios scinduntur, qui bisariam subdivisi umbellas constituunt. *Sedi* vulgaris maioris in morem. *Folia* lineas 8. longa sunt, duas lata, cylindracea compressa, acuminata, glauca, succosa, sapore adstringenti. *Flores* petalis sex constant albescentibus, duas circiter lineas longis, semilineam latis, in acumen desinentibus, coehlearis instar excavatis. *Calyx* viridis, crassiusculus, in sex partes subrotundas ad medium usque eleganter scinditur, quas intervallis petalorum respondent. *Stamina* alba sunt apices luteos subsistentia, eorumque sex exteriora singulis petalis respondent, & in ipsorum curvitate hospitantur; sex autem alia interiora prodeunt ex intervallis petalorum, & calycis sectionibus respondent. *Embryo* capsulis sex corniculatis viridibus constat, quas petalis respondent, & primum unitae sunt, deinde vero expanduntur.

SEDO 12. *subiunge.*

Flores petala sesquilinearia gerunt, alba, costa subrubente donata; *filamina* autem decem alba. *Fructus* subbisfutus est, quinquecapsularis, capsulis in mucronem linearem desinentibus,

Pag. 89.

SERPILLO 3. subiunge.

Florum spicae subbirsutae sunt, flores autem bilineares.

9. Serpillum foliis Catri odore C. B. Pin. 220. Inst. R. H. 197. In pratris Alpinum Apuanarum late se spargit, suavisissimumque Citrei Florentini odorem concutatur spirat, quemadmodum die 20. Octobris An. 1743. licet pluviosa, & frigidissima observavi. Odor autem hic promanat a Balsamo peculiari, qui e minimis glandulis in foliorum superficie siccis exillat. Notari meretur Plantam hanc ex Alpibus in Hortos translatam, talem odorem amittere.

SHERARDIA E subiunge.

Est Sherardia repens nodiflora Vaill. in A&C. Acad. R. Sc.

SIDERITIDI 1. subiunge.

Planta pereunns est, procera, Phlomidis facie, villosa, glutinosa, graveolens. Flores gerit parvos, initio albos, lineis purpureis notatos, mox ex albo pallentes, tandem obsoletos.

SIDERITIDI 5. subiunge.

Spica florum interrupta est: floris tubus linear 4. longus, unam circiter in diametro habet. Labium superius trilinare est, cochlearis instar excavatum, in summitate tantillum scissum, pallidum, lineisque duabus purpureis circa faucem distinctum, exterius simul cum tubo birsutum: Inferius vero quinque linear longum, reflexum, trifidum, cordatum, linea purpurea per medium, punctis purpureis notatum. Stamina quatuor sunt, punctis rubris adpersa, apicesque citrinos subseriunt. Calyculorum radii angusti sunt, & in spinulam terminati.

SISYMBRIO 1. subiunge.

Foliorum lobar amplior, & rotundus gerit; flores albos, siliqua crassas, incurvas, pediculo longo insidentes.

SISYMBRIO 2. subiunge.

Folia superiora non laciniata sunt, verum serrata: siliquae autem crassiores, & nonnihil incurvae sunt.

Pag. 90.

SISYMBRIO 7. subiunge.

Minus superiori est.

De Sisymbrio 8. V. adnotata ad Barbararese species:

SMILACI 2. subiunge.

Est Smilax aspera, spinosissima, aculeis latia deorsum tendentibus, foliis praelongis & acutis, maculatis, & ad petiolum magis excavatis, margine & tribus inferioribus costis spinosis, floribus albis, fructu rubro turbinato. An

Smilax

174 *Append. ad Catal. Plant.*

Smilax aspera foliis maculatis, fructu rubente C. B. Pin. 296. *Smilax aspera* Cam. Epit. 931. Mich. Rat.

SMILACI 5. subiunge.

4. *Flos*, iuxta Michelsii observationes, resacens est; calyce namque constat herbaceo, in sex oblonga & angusta foliola ad centrum usque scissa, intra quem sita sunt petala sex albicansa, utrinque acuminata; stamina sicem sex crassiuscula embryonem stipantia, qui conoides est, sulcis tribus per longitudinem distinctus, abique in baccam trilocularem *Asparagi* inflat.

SMILACI 5. subiunge.

Flos monopetalus est, candidus, in quatuor partes reflexas scissus, quarum singulis unum stamen respondet. Embryo initio candidus abet in baccam globosam rubentem.

Pag. 91.

SOLANO 5. subiunge.

Est *Solanum Africanum* spinosum, folio canescente undulato H. Eltham. 270. ni male memini; nec enim amplius ad manus est Hortus Elthamensis Aureum Cl. Dillenii Opus, ex quo plura ad Catalogum huic illustrandum desumere potuissim.

SOLANO 9. subiunge.

Est *Solanum arborescens* Catfalp. 215. quod nomen per errorem superius pag. 61. *Lycopersico* fructu Cerasi rubro adscripseram.

SONCHO 5. subiunge.

6. *Sonchus laevis*, muralis, perecois, foliis inferioribus in lobos angulosos divisus, superioribus Polypodium acmulantibus, flore luteo. An *Sonchus laevis* C. B. Pin. 124. Prodr. 61. Insl. R. H. 475. Vaill. in *Act. Acad. R. Sc. An. 1721.* pag. 257. num. 6. Mich. Cat. Plant. Agri Flor. In ipse Urbis Florentinae moenibus laete germinat, praesertim prope Horreum publicum l'Uccello dictum, unde in Hortum transferri curavi.

7. *Sonchus laevis*, minor, paucioribus laciis, C. B. Pio. 124. Ios. R. H. 475.

8. Idem flore intus pallido, extus albo. An *Sonchus laevis latiniatus*, flore albo Park. Theat. 806. ? Mich. Catal. Plant. Agri Flor.

SPIRAEAE 5. subiunge.

Flos petalis quinque albis rotandis constat.

Pag. 92.

STACHYDI 7. subiunge.

Est *Cocchia Italica* Stachys facie, caudicissima, & tomentosa, flore luteo, spica magis interrupta. *Stachys minor Italica* C. B. Pin. 236. *Stachys flore sublateo* Cam. Epit. 575. *Stachys* Dod. Pempt. 90. *Stachys Lychmistris*, inca-

iacuna, angustifolia, flore aureo, Italica Barr. Obs. 27. Icon. 1187. Stachi Matth. 877. Sideritis Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo Coroll. Inß. R. H. 12. Salvia filvestris tertia, candidior, lanuginosior, odorata, acrior Caesalp. 441. Mich. Rar. qui plantam hanc a Stachyris & Sideritis Generibus seunxit, & ad novum revocavit, quod iure quidem optimo denominavit ab Amicissimo suo Antonio Cocchio Urbis nostrae ornamento precipuo.

SYLIBO 2. *subiunge.*

3. Sylibum albis maculis notatum, flore albo Eiusd. Ibid.

Pag. 93.

SYRINGAE *subiunge.*

TAGETES maior, flore luteo pallescente Vaill. in Aët. Acad. R. Sc. An. 1720. pag. 407. num. 1.

2. Eadem flore monstroso Eiusd.

3. Eadem radiis florum fistulosis Eiusd.

4. Eadem radiis florum fistulosis, disco monstroso Eiusd.

5. Eadem flore aureo, varians non secus ac superior Eiusd.

6. Eadem flore melino, varians & ipsa quoque Eiusd.

7. Tagetes media, flore luteo pallescente Eiusd. Ibid. num. 2.

8. Eadem flore monstroso Eiusd.

9. Tagetes minor, flore luteo rubescere Eiusd. Ibid. num. 3.

10. Eadem flore monstroso Eiusd.

11. Eadem radiis florum fistulosis Eiusd. Pazzole vulgo vocantur, ab eodem ferme Castorei, quem folia spirant.

TEUCRIO *subiunge.*

Ad Chamaedryos genus revocavit Michelius Rar. Planta repeas est, & radices a singulis fere nodis emittit. Quamvis autem glabra appareat, per siccitatem villis plurimos exerit. Folia conjugata sunt alterno sita. Florem unum ex ala cuiuslibet folii emittit, qui albus est, circa faucem & in superiori segmento maculis rubentibus notatus, staminalis albis, apicibusque rambris pulvere pallido fectis instructus. Calyx linear duas cum dimidia longus, ore quinguefariis scisso, & patentissimo, semina quatuor continet, quae dum viridia sunt, vasis plurimis excretoriis vesiculatis crystallinis repleta sunt.

2. Teucrium (folio subrotundo crenato) calyce tubulato, flore pallide luteolo Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bar. part. 1. 181. Teucrium multis l. B. 2. 290. Teucrium verum H. Eyst. Chamaedrys assurgens Dod. Pempt. 44. Chamaedrys frutescens, Teucricum vulgo Inß. R. H. 205. forte idem cum Chamaedrys Alpina frutescens, folio splendente Inß. R. H. 205. Chamaedrys Alpina lucida H. R. Par. Chamaedrys durior Alpina Broß. folia enim non raro splendens proferi. Mich. Rar. A. Chamaedrys specibus proinde coniungendum est, inter quas num. 4. superius pag. 24. descriptum fuerat. In Montibus Pisanis frequenter obviam habui, praesertim inter Ascanum, & Balnea D. Iuliani, & observavi varietatem foliorum vel pallide virentium & hirsutorum, vel laevium obscure virentium, & splendens, a foli & aetatis diversitate oriri.

Pag. 94.

Pag. 94.

TAPSIÆ 2. subiunge.

Est Valdebonæ nomine missa, Libanotidis secundæ quorundam, seu Cerui-
cariæ nigrae species l. B. 3. part. 2. 167. *Panax Rivin.* Umbell. An. Ligu-
ricum alterum in montibus, foliis latioribus, rotundioribus, caule crasso,
proximo Ferulas, umbellis luteis, semine compresso, rotundo, candicante,
Sphondyli minore Cæsalp. 307. Mich. Rar.

THLASPIDIO 2. subiunge.

3. *Thlaspidium montanum* (annuum) hirsutum, angustiore folio, maius,
calyce floris auriculato (rustu ampliore) capsulis oblongis Micheli H. Pil.
Thlaspi quoddam genus in Monte S. Iuliani Cæsalp. 366. *Iondraba Alphonset*,
spicata, lutea, maior Barr. Icon. 1219. Mich. Rar. In Monte D. Iuliani,
in rudibus *Arcis Verruculac Montium Pisanorum semina collecti An.* 1742.

THYMELAEÆ subiunge.

2. *Thymelaea Lauri* folio deciduo, live *Laureola semica* Inft. R. H.
Ex *Alpibus Magellanicis D. Manettiur atulic Autumno An.* 1745.

3. *Thymelaea Alpica*, saxatilis, serotina, Oleæ (Taxi potius) utriusque
glabro, & virenti folio, flore albo Micheli H. Pil. In *Alpibus Apuanis a*
Furro Volastro cundo Stazzemam reperi.

4. *Thymelaea foliis Lioi* C. B. Pin. 463. Inft. R. H. 594. Cam. Hort. 169.
Thymelaea Mouspeliaca l. B. 591. *Thymelaea Clus. Hist.* 87. *Herba Mora*
Matib. 1318. *Thymelaea Angustil.* 297. Mich. Rar. In montibus Pisani frequens
occurrit, præsertim supra S. Iohannem ad Venam, & Cusilianam. Eiba
Corsa vulgo appellatur, eiusque foliis contusi & aquae immixtis muntur ad
medicand. Pisces.

5. *Thymelaea Linariæ* folio, vulgaris Inft. R. H. 594. *Litbofermum Li-*
narieæ foliis, Germanicum C. B. Pin. 250. *Pasterina Tragi* l. B. 3. 456. *Linaria*
altaria, botryoides, montana Col. par. 1. 82. *Polygonum erectum* Barr. obs. 104.
Icon. 560. num. 2. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

THYMO 2. subiunge.

Sapore acri est.

THYMO 4. subiunge.

Planta quam Micheli olim e monte quodam prope Terracinum in Hortum
nostrum transtulit, nullum modo Hirci odorem spirat, sed facie & odore spe-
ciem primam prorsus refert: Ex Mich. Rar.

TITHYMALO 2. subiunge.

Est *Tithymalus fruticosus*, semper virens, Salicis folio glauco, non ferra-
to, & mollissima laougine vestito, florum sectionibus quaternis, reniformi-
bus, atrorubentibus, fructu piloso. *Tithymalus Ebaraciæ Cæsalp.* 373. Aug.
297. *Efula maxima Rivin;* au *Tithymalus ebaraciæ lanuginosus*, C. B. Pin.
290. Mich. Rar. In montibus Pisani frequens occurrit, cum inter *Agnanum*,
& *Astacanum*; in aliis item montibus maritimis videlicet *Petrasantiæ*, Ma-
ciæ-

coli, &c. *A Sole meridiano percussus odorem gravissimum, caputque laedentem spirat. Matutino tempore villi densissimi quibus folia vestiantur, minimis voris gustulis onerantur. Tandem plantas nonnullas per sententiam lanugine destitutas esse animadverti.*

TITHYMALO 4. *subiunge.*

Est Tithymalus palustris, maximus, latifolius, glaber, florum sectionibus quaternis reniformibus, fructu verrucoso. Tithymalus palustris Caesalp. 374. An Tithymalus palustris fruticosus C. B. Pin. 297. Forte Tithymalus maximus Tabern. Icon. 588. Mich. Rat. In palustribus Pisanis, praesertim extra Portam Lucensem, saepius observavi.

TITHYMALO 5. *subiunge.*

Est Tithymalus montanus, italicus, semper virens, totus cinereus, Myrthi folio ampliori, peracuto, florum sectionibus rubris, lunatis, & in culpidi rotundatis, fructu trigono, crassiori, laevi, semine non aspero. Tithymalus Myrsites luteifolius C. B. Pin. 290. Insl. R. H. 86. Tithymalus Myrsites I. B. 3. 674. Camer. Epit. 961. Mutib. 1312. Mich. Rat. qui e Montibus Asprutinis olim detulit.

TITHYMALO 6. *subiunge.*

Est Tithymalus arvensis, annuus, minimus, foliis Linl angustissimis, acutis, flore perexiguo, sectionibus quaternis ovatis, aut rhombiformibus, late-scentibus, barbula longa concolore auctis, fructu trigono ad angulos verrucoso, semine laevi, &c. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 7. *subiunge.*

Est Tithymalus nemorosus, dulcis, tuberosa radice, foliis longioribus; obtruse mucronatis, ac tenuissime serratis, floribus exiguis, sectionibus orbiculatis, atrorubentibus, fructu compresso trigono, ad angulos verrucoso, seminibus laevibus. Tithymalus montanus non acris C. B. Pin. 292. Insl. R. H. 86. Rasi Hist. 870. Tithymalus dulcis, tuberosa radice Barr. Obs. 6. n. 45. Icon. 999. Bocc. Mus. part. 2. 50. Tithymalus dulcis, tuberosa radice, italicus Eurd. Tab. 44. Tithymalus tuberosus Germantens C. B. Pin. 292. Mich. Rat.

TITHYMALO 8. *subiunge.*

Est Tithymalus repens, humilis, Cyparissias dictus, foliis Linariae, umbella florum rubente, florum sectionibus lunatis, fructu ad angulos verrucoso, semine laevi. Tithymalus Cyparissias capitula rubente C. B. Pin. 291. Insl. R. H. 86. Tithymalus strophyllos I. B. 3. 664. Tithymalus flore atropurpureo Menz. Pug. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 9. *subiunge.*

Umbellam luteam proferit, florum sectiones lunatas, fructumque ad angulos verrucosum, semine laevi setum ex Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 10. *subiunge.*

Est Tithymalus repens, humilis, Cyparissias dictus, foliis Linariae tenuissimis, umbella lutea, floribus concoloribus, sectionibus lunatis, fructu ad angulos verrucoso. Tithymalus Cyparissias Matib. 1315. Lngd. 1644. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 11. subiunge.

Elatior est: umbellam profert amplam viridem, flores sublateos exiguos, sectionibus quaternis lunatis, fructumque oblongum ad angulos verrucosum seminebus laevibus nigricantibus setum, ex Mich. Rar.

TITHYMALO 12. subiunge.

Est Tithymalus repens (quandoque ooo repens, radice crassa) elatior, Oleae folio glauco noo serrato, radiis umbellae florum praelongis, foliorum sectionibus lunatis, & breviter caudatis, fructu & semine laevi. Tithymalus repens, folio Esulae minoris Dodonaei, glauco tamen, & elatior Lael. Triunf. apud Fratrem 65. Tithymalo Cyparissio affinis, lato Leucosii folio, erecta, non ramosa, multicaulis Bocc. Musf. part. 2. 30. Tab. 15. An Esula minor Dod. Pempt. 374. Mich. Rar.

TITHYMALO 13. subiunge.

Flor exiguus sunt, luteoli, sectionibus lunatis: fructus trigonus est, seminebus laevibus. In Salicis prope Florentiam, & Pisat crevit.

TITHYMALO 14. subiunge.

Est Tithymalus fruticosus, semper virens, glaber, & glaucus, angusto Salicis non serrato folio, flore luteo, sectionibus quinis rotundis, fructu verrucoso Mich. Rar.

TITHYMALO 15. subiunge.

Est Tithymalus fruticosus, semper virens, glaber, & glaucus, Salicis angusto non serrato folio, flore luteo, sectionibus quinis rotundis, fructu verrucoso, &c. Mich. Rar.

TITHYMALO 16. subiunge.

Est Tithymalus semper virens, totus glaucus, foliis per basim caulem vaginae instar amplexantibus, florum sectionibus lunatis & testicularis, fructu oblongo & semine laevibus. Tithymalus nemorosus, acutius folio, dulcis Barr. Icon. 834. An Tithymalus maritimus, latifolius, italicus Einid. Obs. 6. n. 42. Icon. 823. Mich. Rar. qui e Maritimus Castilienis Piscariae, & Crassetae olim detulit.

TITHYMALO 17. subiunge.

Est Tithymalus moctanus, saxatilis, longius radicans, Polygoni folio glauco, floribus luteis, sectionibus semicircularibus in aeriori parte barbatis, & plerumque non serratis, fructu oblongo laevi, semine noo rugoso. Erba di Gabbreto vulgo Mich. Cat. Plant. Agri Flor. In Collibus Imprunensis praesertim loco dicto il Gabbreto nascitur, eiusque radice incolae pro Esula Officinarum utuntur ad Aluum movendam; sed memini vidisse me Agricola, qui e tali Hydragogo intempestive, vel largius sumpto, Tenebris contumacissimo laboravit.

TITHYMALO 18. subiunge.

Est Tithymalus maritimus, semper virens, glaucus, foliis binncialibus ad Polygonum accedentibus, neque serratis, neque auticulatis, flore luteo, fructu

fructu nonnihil rugoso, semine laevi Mich. Rar. In arenoso Littore Volaterrano ad Ostium Cecinae, prope novum Castrum a Viro Amplifi. Carolo Ginozio Riparbellae, & adiacentium Castrorum Dynasta &c. An. 1739. exaedificatum, parte Orientali, laete germinat, & ad bipedalem altitudinem assurgit.

TITHYMALO 19. subiunge.

An *Pithynsa* Ang. 294? ex Mich. Rar. Florum sectiones reniformes sunt; sive in anteriori parte leviter sinuatae. In Littore Liburnensi inter Urbem & Vada Volaterrana abunde oritur.

TITHYMALO 20. subiunge.

Est *Tithymalus peregrinus*, non repens, Linariae foliis creberrimis & angustioribus, umbella virecente, sectionibus florum lunatis atque bicornibus, fructu oblongo ad angulos subaspero, semine punctato, &c. Mich. Rar.

TITHYMALO 21. subiunge.

Est *Tithymalus maritimus*, annuus, admodum glaucus, & quasi argenteus, foliis crebris, tenuissimis, florum sectionibus lunatis & barbatis, fructu laevi, semine rugoso aut punctato. *Tithymalus argenteus* *Leptophyllus* *Lael. Triumph. apud Fratrem 65.* an *Tithymalus* *Cyparissius* *Prosp. Alp. Exot. 64?* Mich. Rar. Semina e Pineto Ravennate olim attulit Miscbelius, quae in Horto facta nonnisi plurimum annorum intervallo vegetant, quemadmodum superius animadverti de *Chamedry spinosa*, & de *Ricinoides* agent.

TITHYMALO 22. subiunge.

Est *Tithymalus arvensis*, annuus, glaber, Bellidis folio serrato, umbella ampla, floribus virecentibus, sectionibus quaternis ovatis, fructu laevi, semine rugoso, &c. Mich. Catal. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 23. subiunge.

Est *Tithymalus arvensis*, annuus, foliis subrotundis non serratis, floribus herbaceis perexignis, sectionibus lunatis & longius barbatis, fructu trigono glabro, ad angulos membranis duabus angulissimis aucto, semine rugoso, &c. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

Pag. 96.

TITHYMALO 25. subiunge.

26. *Tithymalus fruticosus* semper virens, Salsicis folio perangusto, acuto, & serrato, flore luteo, sectionibus quaternis longius barbatis, fructu laevi exquisitè triangulari, semine non rugoso Mich. Rar.

27. *Tithymalus montanus*, saxatilis, fruticosus, & caespitosus, humilis, caulis lignosis, tenuiter & dense ramificatis, Hyperici folio glauco, florum sectionibus quinis, subrotundis, fructu verrucoso, semine laevi. *Tithymalus Epithymi* fructu Col. par. 2. 51. & Rati Hist. 872. *Efula frutescens*, seu *Pithynsa Romanorum* Barr. Icon. 197. *Efula minor frutescens*, spinis longis horridis Meusb. Pag. Peplus altera species C. B. Pin. 292. *Atypum Caesalp.* 375. *Alipo* Matth. 343. Mich. Rar. In Monte D. Iuliani prope Balnea Pisana, & in Monte Neo Agri Volaterrani stans viam quae Quercetum ducit, inveni. Meuselius ramulos vetustos & aridos spinas esse credidit.

Z 2

Pag. 96.

TORDYLII nomen ita emendandum est.

Tordylum maius vulgare, seminibus limbo quasi laevi Moris. Umbell. 66. Tordylum italicum minus (maius potius) Micheli Hort. Pis. Sessili Creticum maius C. B. Pin. 161. Caulis maior, semine minus pulchro, bifido L. B. 2. part. 2. 85. Pimpinellae Romanae alterum genus flovestre Caesalp. 315. Michel. Rar.

2. Tordylum Narbonense minus Inst. R. H. 310.

TRACHELIO subiunge.

E Monte Baldo Michelius attulit. Figura quam proponit Barrelierius Icon. 683. nomine Valerianae caeruleae Urticae folio, omnium optima est. Flor lineae tres longus est, variatque colore intus vel dilute caeruleo.

TRAGOPOGONO subiunge.

2. Tragopogon purpureum, angustifolium, flore amplo, calyce brevi Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TRAGOSELINO 2. subiunge.

Semen Ausi odorem & saporem refert:

TRAGOSELINO 3. subiunge.

Caulis glabrum geris, folia inferiora Pimpinellae minoris, sed cristata; superiora vero multifida, seu in angustas lacinias divisa; umbellae autem albae, omnes nudae, & semen oblongum glabrum. An Tragoselinum minus Inst. R. H. 309. ? Ex Mich. Rar.

Pag. 27.

TRIFOLIO 10. subiunge.

11. Trifolium semen sub terra condens H. R. Par. Inst. R. H. 406. In Argillofis Collibus Vallis Herae, veluti inter Palariam & Toianum, semina collegi. Hirsutum est; folia geris cordata, flores autem albos digestos in capitula circinata, longis pediculis nixa, quae dum semina maturescunt, intra terram se condunt, adeo ut semina germinant, & radices agant.

TURRITIDI 3. subiunge.

In foliorum superficie verruculae minimae, tribus spinis stellatim positis in apice ornatae, observantur, quod Malvae Moschatae, & Ricinoidi quoque contingere adnotavi.

TUSSILAGINI subiunge.

Corona floris constat semislocculis tenuissimis, qui in linguam ferme capillarem abeunt, insidentque seminibus pappo brevissimo, nec nisi per microscopium apparente instructis: Flocculi autem discoidi insident seminibus ampliore pappo instructis. Thalamus favi instar cellulatus est.

VERA.

VERATRO 1. subiunge.

Folia lata, glabra, & viridia profert. Caulis florifer in 30. circiter ramulos dividitur, in quorum singulis viginti plerumque flores sitis sunt, qui dimidio circiter Augusto Mense explicantur, & pariter frugiferi, pariter steriles sunt. Prodeunt autem e sum squamæ, seu folioli viridis, cavi, & petiolo nituntur bilineari bifido. Petala sex sunt splendentia, bilinearia, sesquilineam lata, in acumen desinentia; stamina lineam longa nigropurpurea sunt, simul cum petalis, & apicibus pulverem aureum fundentibus.

VERATRO 2. subiunge.

Est Veratrum serotinum, foliis utrinque glabris, flore subviridi maiore, seu petalis lineas quatuor longis, unam circiter latus Mich. Rar.

VERATRO 3. subiunge.

Est Veratrum foliis subhirsutis, & inferne candicantibus, flosculis herbaeis circa fastigium caulis. Helletorum album, foliis subhirsutis inferne candicantibus, flosculis herbaceis circa summum caulem nascentibus, cohererentibus Caesalp. 380. Mich. Rar.

VERBASCO 1. subiunge.

Est Verbasum vulgare, flore luteo magno, folio maximo L. B. 3. App. 871. Verbasum album femina luteo flore Dod. Gall. 91. Verbasum Chabr. Sciagr. 493. Verbasum nigrum Fuchs. Hist. 848. Folia profert Helenii similia, rariora, rosnade crenata, imis per basim laciniatis, ceteris integris, & in duas alas secundum caulem breviter productas absuntibus. Spica florum non stipata est, sed gracilis & foliosa. Flores binucleares sunt, in ambitu nonnihil crispis, lutei, flaminibus & apicibus concoloribus, & lanugine albicante ad flaminum basim praediti, ex Mich. Rar.

VERBASCO 2. subiunge.

Est Verbasum foliis incanis, mar, latifolium, floribus luteis arcte canibus adhaerentibus, sine foliis angustis inter flores emanantibus Mor. Hist. Oxon. part. 2. 485. fess. 3. Tab. 9. fig. 1. Verbasum latius Dod. Pempt. 143. Verbasum, aut Phlomis vulgaris mar Dioscoridis, Thapsus barbatus Officina-rum Lob. Icon. 561. Verbasum album vulgare, sive Thapsus barbatus communis Part. Theat. 60. Verbasum 1. Martiboli Lugd. 1298. Thapsus barbatus Ger. Emac. 778. Verbasco 1. Martb. 1202. Verbasco Cast. 468. Tomentosum & incanum est, foliis Helenii serratis, per basim in binas alas secundum caulem longius productas vix divisis. Spica florum densa est, non foliosa, floribus omnia parvis luteis, flaminibus & lanugine concolore, apicibus croceis.

VERBASCO 3. subiunge.

Est Verbasum Lychnite Martb. 1206. Ger. Emac. 775. Tabern. Icon. 566. Phlomis Lychnitis Martiboli Lugd. 1303. Phlomis mar alter, Verbasum Lychnitis Martiboli Lob. Icon. 562. Verbasum femina Lob. Obf. 303. Lugd. 1300. ex Mich. Rar.

VERBASCO 5. subiunge.

An Verbasum nigrum Dioscoridis Lob. Icon. 502. Verbasum nigrum Ger. Emac. 707. Verbasum VII. Caesalp. 347. Ex Mich. Rar.

VERBASCO 6. *subiunge.*

Folia obtuse mucronata sunt.

VERBASCO 7. *subiunge.*

An Verbuscum maius angustioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin. 239. Ex Mich. Rar.

VERBASCO 9. *subiunge.*

10. Verbasculum perenne, Conyzæ folio leviter ferrato, floribus violaceis parvis, plerumque solitariis, ac longo pediculo fulcatis. *An Blattaria flore nigrae Violæ, colore eleganti nitente C. B. Pin. 241. Inß. R. H. 148. Mich. Rar. Circa Blentinam Ditionis Pisannæ Oppidum inveni.*

VERBENAE 2. *subiunge.*

Est Verbenaca Matth. 1107. Cam. Epit. 797. C. B. in Matt. 742. Mich. Rar.

Pag. 29.

VERONICAE 9. *subiunge.*

Canlis alba laungue pubescit; flores autem caerulei sunt.

VERONICAE 13. *subiunge.*

Est Veronica spicata, erecta, & elatior, caulibus ramosa, glabris, rubentibus, foliis longis, angustis, peracutis, a medio ad summum altius & acute dentatis, floribus caeruleis Mich. Rar.

VERONICAE 14. *subiunge.*

15. Veronica spicata, subhirsuta, ramosa, erecta, foliis angustis, acutis, a medio ad summum argute dentatis, spica caerulea, longissima, tenuiore. *Veronica spicata, caerulea, hirsuta, erecta, caulibus rubentibus, flore maiore Micheli H. Pis an Veronica maius Aug. 244: Mich. Rar. In argilloso Colle secus Viam Regiam Pisannam, prope Cauponam la Rotta dictam, sponte crevit, indeque in Hortum transfusa.*

VIOLAE 1. *subiunge.*

In Hortis Pisannæ Urbis vulgarissima est, floresque plurimos plenissimos dilute caeruleos, ac suaviter odoratos constanter profert; in Hortis vero Flarentinæ translata, brevi vel perit, vel flores simpliciter tantum gerit.

VIOLAE 4. *subiunge.*

Folia acuminata sunt, quæque primùm erumpunt, undique, cætera superne tantum pubescunt: Calyx foliolis quinque acuminatis constat. Petala nivea sunt, quandoque circa ungum lutea, & externa parte purpurascens, in summitate retusa, & tantillum cordata. Fructus crassior est, rotundus, & hirsutus.

VIOLAE 6. *subiunge.*

Viticulus palmarum emittit, vestitus foliis latis, subrotundis, utrinque subhirsutis. Floret e fœm foliorum prodeant petiolo sesquialtius fulsi, dilute purpure.

purpurei, ferme inodori. Petalum inferius & repandum lineas quatuor cum dimidia longum est in basi albidum, lineis violaceis distinctum: reliqua lineas quatuor longa, duas lata; omnia vero retusa sunt, & in extremitate cordata. Ex his vero duo intermedia in basi lutescunt, & hinc lineis violaceis notantur; duo alia & superiora in basi albescunt. Calyx quinque foliis, purpureis coëstat. Fructus globosus, trigonus, glaber, foliis tribus circumatis & excavatis tegitur.

VIOLAE 7. subiuuge.

E radice repente sarmenta plura procumbentia emittit, cubitalia, angulosa, laevia, alternatim vestita foliis sesquunciam longis, semunciam latis, ad petiolum cordatis, in margine serratis, in acumen abeuntibus, superne subherisutis, inferne glabris & utridis. Petiolo haec fulciuntur unciali, prodeuntque e sinu duorum foliorum angustissimorum crenatorum. Ex eodem sinu prodeunt flores petiolo unciali, duobus angustis foliis in summitate aucto. Petalis bi quinque constans violaceis, reinfert, quorum inferius lineas tres cum dimidia longum, sex latum, a medio ad imum albescit, purpureis venis, maculaque violacea notatum; cetera quatuor paullo angustiora in basi albescunt, & lineis purpureis villisque albis decorantur. Stamina petiolo proxima crassa sunt, calcaris viridis intra calyptram latente instructa. Calyx foliis quatuor lunatis constas: tandem fructus trigonus est, angustus, & semuncialis.

Pag. 100.

VIRGAE AUREAE 2. subiuuge.

Planta tota pallide vires: folia minus serrata sunt, & complanata: semistefculorum lingua lineas tres cum dimidia longa est, unam circiter lata, non sulcata, neque in extremitate scissa.

VIRGAE AUREAE 3. subiuuge.

Planta tota atroviret: folia leviter serrata sunt: semistefculorum lingua lineas duas circiter longa est, unam lata, & sulcata.

VIRGAE AUREAE 4. subiuuge.

An Virga Aurea Alpina Laurius rigidioribus foliis Bocc. Mus. part. 2. 37. Tab. 16. Infr. R. H. 484. Ex Mich. Rar Flores in panicula sparsa digesti sunt: semistefculos coronales septem gerunt, lingua duas lineas cum dimidia longa, unam lata, utriusque acuminata.

VIRGAE AUREAE 6. subiuuge.

Foliorum superficies alveolis quibusdam minimis excavatur, intra quas floreae sunt glandulae liquidum quoddam fundentes, quod avidè surgunt minimae quaedam Muscae nigrae alis longis praeditae, quarum copiosum examen aestivo tempore plantam obsidet.

VIRGAE AUREAE 9. subiuuge.

Planta haec exotica climati nostro adeo assuevit, ut in diversis Etruriae partibus, praesertim fecus Arnum Fluvium in maxima copia sponte germinat.

VITI

VITI subiunge.

Flores huius Plantae non in botros, sed in umbellas dispositi sunt. Calyce donantur exiguo, obscure quinquefido, intra quem sita sunt petala quinque & viridi lutescentia, seu herbacea, sesquilineam longa, femilineam lata, eleganter reflexa, in summitate retusa, & cucullata. Stamina quinque iis respondent, erecta, alba, linearia, capillaria, apices biventres substantia, qui pulvisculum citrinum fundant. Embryo pyramidalis est, seu conicus, & nonnihil sulcatus, abique in baccam nigram, globosam retusam, Pisi magnitudine, parum succulentam, ingrati saporis, duobus seminibus crassis fetam.

2. Vitis Caroliniana. Elegantissimam hanc speciem Micheli ex ultimo suo itinere redux attulit, eoque nomine indigitatus: necdum autem compertum habeo cui nam dono accepta referenda sit, & an descripta adhuc dum fuerit. Puntula est, semper virens, sarmentisque emittit graciles. Folia non simplicia sunt, sed & pluribus composita, aut lobata, Aquilegiae, vel Apis denticis instar, lobis serratis & laciniatis, triplicique serie digestis. Flores in umbellas latiusculas, ex pluribus minoribus compositas dispositi sunt, & antequam expandantur globosi apparent. Eorum calyx exiguus in quinque obtusos dentes dividitur. Petala quinque sunt stellatim posita, externe viridia, interne & viridi lutescentia, linearia, & lato principio in acutum desinens, in margine contracta, seu cochlearis instar excavata. Petalis respondent totidem breviora stamina curvata, rubra, apices substantia bicapulares luteos, & stipantia Embryonem qui figura Ficis imitatur, estque viridis, lineam longus, limbo seu nectario per medium excurrente, & quo mel mucosum extillas. Delapsis petalis tuba in vertice Embryonis sita nonnihil prolongatur, Embryoque sensim crassescens abit in baccam superiori speciei similem, sed pyriformem.

ULMARIAE subiunge.

Petala florum candida sunt, linearia, rotunda, pedunculo donata; apices autem citrini.

URTICAE 3. subiunge.

Caulis striatus est; folia autem alterna, repanda, cava, & admodum rugosa sunt, spinulis praedita articulatis, tenuibus, non urentibus, pellucidis, intortis, & verrucis quibusdam pellucidis erumpentibus. Ex alis foliorum vtrum inferiorum prodeunt singuli, vel bini florum masculinorum, seu sterilium racemi, qui in umbellam quodammodo tortuosam & repandam sparguntur inter folia latentem. Flores in facie superiore racemi prodeunt, & sinu foliorum duorum acutorum, pentapetali, petalis externe viridibus, & in cornu, Paronychiae petalorum instar, desinentibus: referantur autem vi & ope flaminum quinque elasticorum apicibus albis didymis praeditorum, quemadmodum in Parietariae, Chenopodii, &c. floribus contingere diximus, nectariumque in centro fovens subrotundum ac viscosum. In summitate ramorum, & e sinu superiorum foliorum prodeunt ramusculi florum seminiferorum, baud dissimiles iis, qui flores steriles tantummodo gerunt. Eorum extremitates abeunt in foliola plerumque linguiformia, costata, & cordata, & quorum incisura pendet calyx constans foliolis duobus exiguis amplexantibus Embryonem compressum semicirculare, minutum rostrum incurvum & praelongum, qui tuba capillaris alba & cirrosa, sive pennata saerat.

Pag. 101.

URTICAE 10. subiunge.

Flores femininos, & masculinos in una eademque spica gerit. Masculini, vel steriles, e summitate spicarum seu racemorum prodeunt singulares vel bini, petiolo exiguo donati, calyce constantes pelvisiformi in quatuor lacinias cucullatas sello; flamina quatuor sovent elastica, ferme articulata, ac Parietariae flaminum prorsus similia, in quorum centro sedet nectarium columnatum, & in summitate concavum. Inferiorem spicae partem occupant 20. vel 25. flores feminini, seu Embryones ovati, compressi, tuba cirrosa instructi, clausi folliculo quodam mitrato constante foliolis duobus in basi cordatis, & calyci monophyllo naviculari adhaerentibus.

11. Urtica foliis profunde laciniosis, semine Lini, Amman Rarior. 173. Tab. 25. Semina ipse Cl. Ammannus mecum perhumaniter communicavit Ann. 1738. nomine Urticae Davuricae foliis laciniosis trididis. Flores masculini similes florum Urticae superioris sunt, herbacei, pallidi, in spicas dispositi, quae e duobus tantummodo nodis, seu verticillis foliorum prodeunt in ima caulis parte, utrinque binas: e superioribus enim 12. nodis prodeunt spicae seminiferae tantum.

XANTHIO 1. subiunge.

Est Xanthium Dod. Pempt. 439. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis C. B. Pin. 194. Xanthium sive Lappa minor I. B. 3. 572. Xanthium Fuchs Hist. 579. Xanthio ovvero Lappa minore Matth. 1263. ex Mich. Rar. Universa Plantae superficies albicans, vel dilate virescens est; sequentis autem rubra. In Xanthii 5. nomine pro subrotundo validioribus, scribe subrotundo, crassiore, validioribus, &c.


YUCAE 2. subiunge.

Tab. VII Exhibet Plantae huius folia, flores, & fructus. Spica florifera venustissima, quam An. 1740. examinavimus 307. floribus omnia erat, in ramulis 33. distributis.


F I N I S.



Act
1656099



TABII



TAB. III.



TAB IV



TAB.V



